＜表3＞ 水生生物調査 結果一覧（令和2年度）

	河川名	調査団体名	調査地点名	調査日時	天気	水温（℃）	川幅（m）	生物採取場所	水深（cm）	流れの速さ	川底の状態	水質階級	指標生物の出現状況																												
													Ⅰ きれいな水										Ⅱ ややきれいな水								Ⅲ きたない水						Ⅳ とてもきたない水				
													アミカ類	ナミウズムシ	カワゲラ類	サワガニ	ナガレトビケラ類	ヒラタカゲロウ類	ブユ類	ヘビトンボ	ヤマトビケラ類	ヨコエビ類	イシマキガイ※	オオシマトビケラ	カワニナ類	ゲンジボタル	コオニヤンマ	コガタシマトビケラ類	ヒラタドロムシ類	ヤマトシジミ※	イソコツブムシ類※	タニシ類	ニホンドロソコエビ※	シマイシビル	ミズカマキリ	ミズムシ	アメリカザリガニ	エラミミズ	サカマキガイ	ユスリカ類	チョウバエ類
1	鴨部川	さぬき北小	鴨部川大橋南測	10/1	晴	21.4	3.0	中心/右岸/左岸	30	速い	2,3	Ⅰ	○	○	○		●	●		○		○		○			○	○								○				○	○
2	春日川	高松市	元山橋	7/29	晴	26.0	1.0	中心	30	遅い	3	Ⅳ					○	○																						●	○
3	春日川	高松市	大亀新橋上流	7/29	晴	26.2	10.0	右岸	5	速い	1	Ⅰ						●			○															○					
4	吉田川	香大総研	丸吉橋南	8/9	晴	24.0	12.0	中心	10	遅い	2,5,7,8	Ⅱ													●																
5	氏の宮川	香大総研	打木新橋	8/9	晴	22.2	1.0	中心	10	遅い	1,3,4,6,7	Ⅰ		●	○																										
6	葛谷川	高松市	新葛谷橋	7/29	晴	23.0	2.0	中心	10	遅い	3	Ⅰ			○	○	○	●	○		○						○														
7	香東川	高松商業高	潜水橋付近	7/23	曇	25.0	13.0	右岸	30	遅い	3	Ⅰ		●	○			○					○				○							●		○			○	○	
8	内場川	香大総研	モモの広場北側	8/10	曇	21.2	10.0	右岸	10	遅い	2,3	Ⅰ		●																				○							
9	本津川	高松市	本津川橋上流	7/29	曇	29.2	50.0	右岸	50	遅い	2	Ⅳ									○																	○		●	○
10	本津川	高松市	悠悠香南前	7/29	晴	30.0	5.0	左岸	8	遅い	3	Ⅰ		○			●	○	○																				○		○
11	本津川	高松市	本津川上流	7/29	晴	25.8	0.5	中心	5	遅い	2	Ⅰ		●					●																			○		○	○
12	綾川	羽床小	宮武橋上流部	9/9	曇	22.5	2.0	右岸	25	普通	3	Ⅰ		●				●						○				○													
13	綾川	綾上小	綾上小学校東	9/11	曇・雨	23.5	2.5	左岸	15	普通	3	Ⅰ			●		○	●										○	○					●							
14	綾川	綾上中	綾上小学校東河川敷	8/3	曇	21.0	4.0	中心/左岸	35	普通	1,2	Ⅱ		○	●												●	●	○												
15	綾川	綾上中	柏原渓谷	8/3	曇	22.1	5.0	左岸	20	速い普通	1,2	Ⅱ		○	○	○		●						○	○		●	○	○												
16	綾川	府中小	府中町城山橋上流付近	8/28	晴	33.0	20.0	左岸	20	普通	2,3,5,6,7	Ⅲ																○						●							

＜表3＞ 水生生物調査 結果一覧（令和2年度）

	河川名	調査団体名	調査地点名	調査日時	天気	水温（℃）	川幅（m）	生物採取場所	水深（cm）	流れの速さ	川底の状態	水質階級	指標生物の出現状況																											
													Ⅰ きれいな水										Ⅱ ややきれいな水								Ⅲ きたない水						Ⅳ とてもきたない水				
													アミカ類	ナミウズムシ	カワゲラ類	サワガニ	ナガレトビケラ類	ヒラタカゲロウ類	ブユ類	ヘビトンボ	ヤマトビケラ類	ヨコエビ類	イシマキガイ※	オオシマトビケラ	カワニナ類	ゲンジボタル	コオニヤンマ	コガタシマトビケラ類	ヒラタドロムシ類	ヤマトシジミ※	イソコツブムシ類※	タニシ類	ニホンドロソコエビ※	シマイシビル	ミズカマキリ	ミズムシ	アメリカザリガニ	エラミミズ	サカマキガイ	ユスリカ類	チョウバエ類
17	大東川	宇多津小	富士見橋付近	9/24	曇	23.0	40.0	中心/右側	30	普通	2,4,5,	Ⅲ				○						●	○							○		○	●	○	○	○			○		○
18	土器川	城東小	丸亀橋付近	9/17 9/28	曇	22.5	20.0	中心	20	普通	2,6,7	Ⅲ																				●	○	○	○					
19		琴南小	ことなみ土器どきひろば	9/14	曇	21.5	2.0	左岸	20	速い	2	Ⅰ			○			○		○				○					●							●					
20	金倉川	豊原小	健康橋付近	6/26	晴	27.5	5.0	右側	30	遅い	3	Ⅲ		○		○			○	○	○								○			○	●	●	○			○			○
21		多度津高	金倉橋下	6/27	曇	24.2	9.6	中心	11	遅い	2	Ⅲ											●												○	●					
22	弘田川	四箇小	山階橋付近	6/12	曇	27.5	3.0	中心/左岸	30	遅い	2	Ⅲ	○			○							○							○	●	○	○			●			○		○

- 生物採取場所　：中心（川の中心）、 右岸（上流から見て右岸）、 左岸（上流から見て左岸）
- 流れの速さ　：速い（60cm以上/秒）、 普通（30～60cm/秒）、 遅い（30cm以下/秒）
- 川底の状態　：1（頭大の石が多い）、 2（こぶし大の石が多い）、 3（小石と砂）、4（コンクリート）、 5（砂と泥）、 6（泥）、 7（コケ）、 8（その他）
- 指標生物の出現状況　：○見つかった指標生物、 ●見つかった指標生物のうち、数が多かった上位から2種類
- 水質階級の判定方法　：Ⅰ～Ⅳの水質階級ごとに、○印と●印の数の合計（A）、●印だけの数の合計（B）を求める。
  合計（A）と合計（B）の合計（C）を求める。
  合計（C）が最も大きい水質階級を、その地点の水質階級と判定する。
- ※は、海水の少し混ざっている汽水域(きすいいき)の生物