

# 水稲のスクミリンゴガイ対策

田植え後 約3週間、「浅水管理」と「薬剤防除」等を組み合わせて被害を軽減！

(中央地区)令和8年6月  
東讃農業改良普及センター  
東讃農業改良普及協議会



成貝



卵塊(稲の株元や壁面などに産み付けられます)



食害を受けたほ場

- ★ スクミリンゴガイの食害防止は、田植え前から対策を！
- ★ 代かきは均平に行い、深水になる部分を減らそう！ 浅水管理がしやすくなり、食害の軽減につながります。
- ★ 被害が出る前に対策を始めよう！ 前年に被害が発生したほ場では、田植え後すぐに、薬剤散布！

浅水管理:水深4cm以下  
(理想は1cm)



貝殻が水の上に出るくらいになると、活動が鈍くなったり、土の中に潜ったりします。

## 薬剤防除

薬剤は、湛水状態にして全面均一散布することが基本ですが、貝が薬剤成分を食べたり触れたりすることで効果を発揮するので、入水口や水が深くなって貝が集まっている所に、基準の使用量内で多めに散布するのも効果的です。

| 薬剤       | 使用量       | 使用時期／回数       |
|----------|-----------|---------------|
| スクミノン    | 1～4kg/10a | 収穫60日前まで/2回以内 |
| スクミンバイト3 | 2～8kg/10a | 制限なし          |

※散布後7日間は落水やかけ流しをしない。

## 卵塊を水中に掻き落とす

貝は素手で触らない！畦畔などについていた卵塊を産卵後早いうち(濃いピンク色の時)に水中に落とすと孵化しません。

## 貝を集めて捕殺する

水の深いところに野菜くずを入れた餌を設置し、集まった貝を捕殺し埋却などの処分。

## 農作業中の 熱中症対策チェック



熱中症対策イラスト：農林水産省HPより

✓ 高温時の作業は避けましょう 朝夕の涼しい時を中心に！

✓ 単独作業は避けましょう なるべく2人以上で声をかけあって！

✓ 20分おきに休憩&水分補給をしましょう のどが渇く前に水を飲みましょう

