

「早期コシカリの水管理」と「農作業安全」

今月の目標 中干しを徹底しましょう！

●中干しの効果

排水して土壌を十分に乾かすことで

- 1 土壌の通気性を良くし、根の伸長を促す。
- 2 無効分げつ(穂にならない茎)の発生を抑え、穂揃いや稔実をよくする。
- 3 下位節間の伸びを抑え、倒れにくくする。

●開始時期

田植後**30日～35日** (1株当たり茎数 **18～20本**)。

●中干しの程度

- ・田面に小さいヒビ割れが入るまで干す。
- ・**亀裂幅1cm程度になれば走り水**を行い、中干しを継続する。

●終了時期

- ・**幼穂形成期** (出穂前**24日頃**)

中干し後は、**間断灌水** (湛水と土壌の黒湿りを繰り返す) を行い、根腐れを防ぐ。

<留意点>

過度な中干しは避ける!!

- ① 土壌が白乾きの状態。
- ② 田面に1cm以上の大きな亀裂が入る。



農作業安全について



機械に乗る際は必ず
ヘルメットを着用し、
草刈機を使用する際は
フェースシールドの装着、
長袖長スボンの着用など
服装に配慮し**安全第一**で
作業しましょう！

休憩と水分補給
も忘れずに！



田植日

中干し期間の目安

| | |
|-------|-------------|
| 4月25日 | 5月30日～6月21日 |
| 5月1日 | 6月5日～6月24日 |
| 5月10日 | 6月14日～6月28日 |