


カタクチイワシ卵稚仔出現状況

(2009. 7- 1)

香川県水産試験場 宮川

TEL: 087-843-6511



調査方法

調査日: 7月2日

調査方法: 丸特ネットによる鉛直曳

調査定点: 播磨灘11定点+備讃瀬戸2点+鳴門1点(中旬のみ)

(調査定点図参照)

【カタクチ卵】 定点別出現数

| 年 定点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | HK | T2 | T3 | K6 | 21 | 22 | NT | 11点平均値 | 14点平均値 |
|-----------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 2007.7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.3 | |
| 2008.7.2 | 3 | 58 | 7 | 2 | 44 | 37 | 2 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 509 | 16.0 | 48.9 |
| 2009.7.2 | 0 | 3 | 36 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.6 | 3.9 |
| 2010.7.2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 33 | 29 | 97 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19.3 | 17.4 |



【カタクチ稚仔】 定点別出現尾数

| 年 定点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | HK | T2 | T3 | K6 | 21 | 22 | NT | 11点平均値 | 14点平均値 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 2007.7.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.2 | |
| 2008.7.2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.8 |
| 2009.7.2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1.4 | 1.2 |
| 2010.7.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.8 |



* 表中の「-」は未測定を表す。

* 11点平均値: 播磨灘11定点の平均値を表す(備讃瀬戸および鳴門を除く)。

* 14点平均値: 播磨灘11点+備讃瀬戸2点+鳴門1点の平均値を表す。



* グラフの値は播磨灘11定点における平均値を表す。



播磨灘11定点における卵の平均出現数は約 19個となり、昨年同時期を上回った。卵は鳴門口から引田沖での出現数が多かった。

一方、稚仔の出現は平均で約 1.0尾となり、昨年同時期を下回った。稚仔の出現はわずかに認められる程度となり、播磨灘での稚仔の出現が少ない傾向を示した。

引田沖に設置した水温ブイ(午前9時)によると、6月中旬以降の水温はかなり低めから平年並みで推移している。

餌料生物として重要なかいあし類は、全域で少ない傾向であり、11点の平均は前回の2%に減少した。

【参考】





図 引田沖ブイロボットデータ

※カタクチイワシ卵稚仔情報は、「水産試験場ホームページ」の「情報提供」の「カタクチイワシ卵稚仔速報」でも公開しています。
<http://www.pref.kagawa.jp/suisanshiken/>