

白鳥病院医薬品集
2025年9月版



使い方
目的のセルをクリックするとリンクしています。

50音順索引 内用薬

50音順索引 外用薬

50音順索引 注射薬

薬効別索引

[1- 神経系及び感覚器官用医薬品](#)

[11- 中枢神経系用薬](#)

[12- 末梢神経用薬](#)

[13- 感覚器官用薬](#)

[131 眼科用剤](#)

[2- 個々の器官系用医薬品](#)

[21- 循環器官用薬](#)

[22- 呼吸器官用薬](#)

[23- 消化器官用薬](#)

[24- ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）](#)

[25- 泌尿生殖器官及び肛門用薬](#)

[26- 外皮用薬](#)

[264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤](#)

[3- 代謝性医薬品](#)

[31- ビタミン剤](#)

[32- 滋養強壮薬](#)

[325 たん白アミノ酸製剤\(経管栄養を含む\)](#)

[33- 血液・体液用薬](#)

[331 血液代用剤\(輸液類\)](#)

[39 その他の代謝性医薬品](#)

[396 糖尿病用剤](#)

[4- 組織細胞機能用医薬品](#)

[42- 腫瘍用薬](#)

[44- アレルギー用薬](#)

[5- 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品](#)

[6- 病原生物に対する医薬品](#)

[61- 抗生物質製剤](#)

[62- 化学療法剤](#)

[63- 生物学的製剤](#)

[7- 治療を主目的としない医薬品](#)

[721 X線造影剤](#)

[8- 麻薬](#)

[禁煙治療剤](#)

目次にもどる		
薬効	限定	【後】
採用薬品（院内・院外共通） 限定：必要時購入		規格
1- 神経系及び感覚器用医薬品		
11- 中枢神経系用薬		
111 全身麻酔剤		
1115	溶性バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤	
	0. 5 g イソゾール	500mg 1 管（溶解液付）
1116	亜酸化窒素製剤	
	液化亜酸化窒素	1 g
1119	その他の全身麻酔剤	
	プロポフォール静注 1 %20mL「マルイシ」（＝デゾフルタン）	200mg 20mL 1 管
	プロポフォール静注 1 %50mL「マルイシ」（＝デゾフルタン）	500mg 50mL 1 瓶
	1 %ディプリバン注キット500mg	500mg 50mL 1 キット
	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	250mL
	ドロレプタン注射液 25mg	10mL
112 催眠鎮静剤，抗不安剤		
1124	ベンゾジアゼピン系製剤	
	【後】 プロチゾラム錠 0. 25mg（＝レンドルミン）	0. 25mg 1 錠
	【後】 ジアゼパム錠 2「サワイ」（＝セリソ）	2mg 1 錠
	ジアゼパム注射液 5mg「NIG」	5mg 1 管
	ドルミカム注射液 10mg 2ml	10mg 2mL 1 管
	ダイアアップ坐剤 6	6mg 1 個
1129	その他の催眠鎮静剤，抗不安剤	
	【後】 デクスメトミジン静注液 200 μ g / 50mL シリンジ「ニプロ」（＝プレセデックス）	50mL 1 筒
	【後】 ゾルピデム酒石酸塩 OD 錠 5mg「サワイ」（＝マイスリー）	5mg 1 錠
	【後】 エスゾピクロン錠 1mg「ケミファ」（＝ルネスタ）	1mg 1 錠
113 抗てんかん剤		
1139	その他の抗てんかん剤	
	【後】 レベチラセタム錠 500mg「サワイ」（＝イーケブラ）	500mg 1 錠
	【後】 レベチラセタム点滴静注 500mg「明治」	500mg
	【後】 カルバマゼピン錠 200mg「フジカ」（＝テグレート）	200mg 1 錠
	バルプロ酸ナトリウム錠 200mg「DSP」	200mg 1 錠
	【後】 バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「DSP」	5% 120mL
	ランドセン錠 0. 5mg	0. 5mg 1 錠
114 解熱鎮痛消炎剤		
1141	アニリン系製剤	
	アセリオ静注液 1000mg バッグ	1000mg 100mL
	【後】 カロナール錠 500	500mg 1 錠
	アンヒバ坐剤小児用 100mg	100mg 1 個
	アンヒバ坐剤小児用 200mg	200mg 1 個
1147	フェニル酢酸系製剤	
	【後】 ジクロフェナクナトリウム坐剤 12. 5mg（＝ボルタレン坐）	12. 5mg 1 個
	【後】 ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg（＝ボルタレン坐）	25mg 1 個
	【後】 ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg（＝ボルタレン坐）	50mg 1 個
1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
	プロピオン酸系	
	【後】 ロキソプロフェン錠 60mg（＝ロキソニン）	60mg 1 錠
	ロビオン静注 50mg 5ml	50mg 5mL 1 管
	オキシカム系	
	COX2 阻害薬	
	【後】 セレコキシブ錠 100mg「ケミファ」（＝セロックス）	100mg 1 錠
	その他	
	ノイロトロピン錠 4 単位	4 単位 1 錠
	ネオビタカイン注シリンジ 5mL	5mL 1 筒
	非麻薬性鎮痛薬	
	ソセゴン注射液 15mg	15mg 1 管

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			【後】 トアラセット配合錠「ケミファ」（＝トラムセット）	1錠
116 抗パーキンソン剤				
1161			アマンタジン製剤	
		【後】	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」（＝シシメレル）	50mg 1錠
1169			その他の抗パーキンソン剤	
			抗コリン薬	
			ドパミン受容体刺激薬（麦角アルカロイド）	
			ドパミン受容体刺激薬（非麦角系）	
			ノルアドリナリン系	
			レボドパ類	
			ドパストン静注50mg	50mg 20mL
		【後】	ドパコール配合錠L100	1錠
117 精神神経用剤				
1172			フェノチアジン系製剤	
			ノバミン錠5mg	5mg 1錠
1179			その他の精神神経用剤	
			ブチロフェノン類	
			セレネース注5mg 1ml	0.5% 1mL 1管
			抗うつ薬	
			三環系	
			四環系	
			選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)	
		【後】	セルトラリン錠25mg「サワイ」（＝ジェイブ・ロフト）	25mg 1錠
			セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 (SNRI)	
		【後】	デュロキセチンカプセル20mg「KMP」（＝サインバルタ）	20mg 1cp
			ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤 (NaSSA)	
			5HT3受容体拮抗薬	
		【後】	トラゾドン塩酸塩錠50mg	50mg 1錠
			非定型抗精神病薬	
		【後】	リスベリドン内用液1mg/mL 0.5mL（＝リスパダール）	
		【後】	クエチアピン錠25mg「日新」（＝セロケル）	25mg 1錠
		【後】	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	3mg 1錠
			レキサルティOD錠0.5mg	0.5mg 1錠
			チエノジアゼピン類	
		【後】	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」（＝リーゼ）	5mg 1錠
		【後】	エチゾラム錠0.5mg「トワ」（＝デパス）	0.5mg 1錠
			その他	
			アタラックスP注射液（25mg/mL）	2.5% 1mL 1管
118 総合感冒剤				
1180			総合感冒剤	
			PL配合顆粒	1g 1包
119 その他の中枢神経系用薬				
1190			その他の中枢神経系用薬	
		【後】	チアブリド錠25mg「JG」（＝ケラマリール）	25mg 1錠
			帯状疱疹後神経痛治療剤	
		【後】	プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」	25mg 1錠
		【後】	プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」	75mg 1錠
			タリージェ錠5mg	5mg 1錠
			認知症用薬	
		【後】	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」（＝アリセプトD）	3mg 1錠
		【後】	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」（＝アリセプトD）	5mg 1錠
		【後】	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」（＝マリノ）	10mg 1錠
		【後】	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	4.5mg
		【後】	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	9mg
		【後】	リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	13.5mg

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		【後】	リバスチグミンテープ 18mg 「DSEP」	18mg
			脊髄小脳変性症治療剤	
			メラトニン受容体アゴニスト	
		【後】	ラメルテオン錠 8mg 「武田テバ」	8mg 1錠
			オレキシン受容体拮抗薬	
			デエビゴ錠 5mg	5mg 1錠
			抗活性酸素薬	
		【後】	エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「NP」（＝ラジカット）	30mg 100mL 1キット
			経口そう痒症改善剤	
12- 末梢神経用薬				
121 局所麻酔剤				
1214			キシリジン系製剤	
			キシロカインビスカス 2% 100mL	100mL 1本
			キシロカイン注射液「1%」E ^レ レシ(1:100,000) 20mL	1% 20mL バイアル
			キシロカイン注ポリアンプ 1% 10mL	1% 10mL
			キシロカイン注ポリアンプ 2% 5mL	2% 5mL
			アナペイン注 7.5mg/mL 0.75% 20mL	20mL 1管
			アナペイン注 2mg/mL 0.2% 100mL	100mL 1バッグ
			キシロカインゼリー 2% 30mL	2% 30mL
			キシロカイン液「4%」 20mL	4% 20mL
		【後】	キシロカインポンプスプレー 8%	80g
			マーカイン注脊麻用 0.5% 高比重	0.5% 4mL
			マーカイン注脊麻用 0.5% 等比重	0.5% 4mL
		【後】	リドカインテープ 18mg 「YP」（＝ペンシ）	(18mg) 30.5mm×50.0mm 1枚
1219			その他の局所麻酔剤	
122 骨格筋弛緩剤				
1229			その他の骨格筋弛緩剤	
			ダントリウム静注用 20mg	20mg 1瓶
			ボトックス注用 100単位	100単位 1瓶
			非脱分極性麻酔用筋弛緩剤	
		【後】	ロクロニウム臭化物静注液 50mg 1mL（＝イスラックス）	50mg 5mL 1瓶
123 自律神経剤				
1231			四級アンモニウム塩製剤	
			ベサコリン散 5%	5%
			ウブレチド錠 5mg	5mg 1錠
1232			アセチルコリン系製剤	
			オビスート注射用 0.1g	100mg 1管（溶解液 2mL 付）
124 鎮痙剤				
1242			アトロピン系製剤	
			ブスコパン錠 10mg	10mg 1錠
			ブスコパン注 20mg 1mL	2% 1mL 1管
		【後】	アトロピン注 0.05% シリンジ「テル」 1mL	0.05% 1mL 1管
1244			マグネシウム塩製剤	
			静注用マグネゾール 20mL	20mL 1管
1249			その他の鎮痙剤	
			中枢性筋弛緩薬	
		【後】	チザニジン錠 1mg 「日医工」（＝テルネリ）	1mg 1錠
13- 感覚器官用薬				
131 眼科用剤				
1311			散瞳剤	
			サイブレジン 1% 点眼液 10mL	1% 10mL
			ネオシネジンコーワ 5% 点眼液 10mL	5% 10mL
			ミドリリンM 点眼液 0.4% 5mL	0.4% 5mL
			ミドリリンP 点眼液 10mL	10mL
			日点アトロピン点眼液 1%	1% 5mL 1瓶

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
1312			縮瞳剤	
			サンピロ点眼液 2 %	2 % 5 m L 1 瓶
1313			眼科用局所麻酔剤	
			ベノキシール点眼液 0 . 4 %	0 . 4 % 2 0 m L
1315			眼科用コルチゾン製剤	
	【後】		フルオロメトロン点眼液 0 . 1 % 「NIT」 (=フルメロン)	0 . 1 % 5 m L
1319			その他の眼科用剤	
			眼科・耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	
			眼・耳科用リンデロンA軟膏	5g
			点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL
			緑内障用薬	
			β ー遮断剤	
	【後】		カルテオロール塩酸塩LA点眼液 2 % 「わかもと」 (=ミケラン)	2 % 5 m L
			$\alpha 1 \beta 1 \beta 2$ 遮断薬	
			$\alpha 2$ 受容体作動薬	
			炭酸脱水酵素阻害剤	
			炭酸脱水酵素阻害剤・β ー遮断剤配合剤	
			プロスタグランジン系	
	【後】		ラタノプロスト点眼液 0 . 005 % 「センジュ」 (=キサラン)	0 . 005 % 2 . 5 m L
			$\alpha 1$ 遮断薬	
			Rhoキナーゼ阻害薬	
			白内障用薬	
	【後】		ピレノキシン懸濁性点眼液 0 . 005 %	0 . 005 % 5 m L 1 瓶
			眼科手術用薬	
			マキュエイド眼注用 40 mg	40 mg 1 瓶
			非ステロイド性消炎鎮痛薬	
	【後】		フロムフェナクNa点眼液 0 . 1 % 「ニットー」 (=プロナック)	0 . 1 % 5 m L
			眼科用消炎薬	
	【後】		エピナスチン塩酸塩点眼液 0 . 05 % 「ニットー」	0 . 05 % 5 m L
			眼科用抗菌薬	
	【後】		レボフロキサシン点眼液 1 . 5 % 「ニットー」 (=クラビット)	0 . 5 % 5 m L
			エコリシン眼軟膏	3 . 5 g
			抗ヘルペス薬	
			ゾビラックス眼軟膏 3 %	3 % 5 g
			涙液補充薬	
	【後】		ヒアルロン酸Na点眼液 0 . 1 % 「ニットー」 (=ヒアレイン)	0 . 1 % 5 m L 1 瓶
			その他	
	【後】		シアノコバラミン点眼液 0 . 02 % 「日点」 (=サンコハ)	0 . 02 % 5 m L 1 瓶
			スコビゾル眼科用液	
132 耳鼻科用剤				
1324			耳鼻科用血管収縮剤	
			ブリビナ液 0 . 05 %	0 . 05 %
1329			その他の耳鼻科用剤	
	【後】		フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50 μ g 「DSP」 56 噴霧用 (=フルナーゼ*)	4 . 08 mg 8 m L 1 瓶
133 鎮静剤				
1339			その他の鎮静剤	
	【後】		ジフェニドール塩酸塩錠 25 mg 「NIG」 (=セファドール)	25 mg 1 錠
	【後】		ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「TSU」 (=メスロ)	6 mg 1 錠
			トラベルミン配合錠	1 錠
2- 個々の器官系用医薬品				
21- 循環器官用薬				
211 強心剤				
2113			ジギタリス製剤	
			ラニラピッド錠 0 . 05 mg	0 . 1 mg 1 錠
			ジギラノゲン注 0 . 4 mg	0 . 02 % 2 m L 1 管
2115			カフェイン系製剤	

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		ネオフィリン注PL250mg/10ml	2.5%10mL1管
2119		その他の強心剤	
		交感神経刺激薬（カテコールアミン類）	
		$\alpha \cdot \beta$ 刺激薬	
	【後】	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	0.3%200mL1袋
	【後】	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	0.3%50mL1筒
		エホチール注10mg	1%1mL1管
		エフェドリン「ナガサ」注射液	40mg1mL1管
		β 刺激薬	
		プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管
		ホスホジエステラーゼ(PDEⅢ) 阻害薬	
	【後】	ピモベンダン錠1.25mg「TE」（＝アカルディ）	1.25mg1錠
	【後】	ミルリノン注22.5mgバッグ「カカ」（＝ミルリノク）	22.5mg150mL1袋
212 不整脈用剤			
2123		β 遮断剤	
	【後】	ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg（＝メインテート）	2.5mg1錠
		ビソプロロールフル酸塩錠0.625mg（＝メインテート）	0.625mg
		インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管
	【後】	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	150mg1瓶
		コアベータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶
		$\alpha \cdot \beta$ 遮断薬	
	【後】	アロチノロール塩酸塩10mg錠「サワイ」	10mg1錠
2129		その他の不整脈用剤	
		I 群 Naチャンネル抑制薬	
		I a 群 活動電位持続時間延長	
	【後】	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」（＝シベンノール）	100mg1錠
		シベンノール静注70mg	70mg5mL1管
		I b 群 活動電位持続時間短縮	
	【後】	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」（＝メキシチル）	50mg1カプセル
	【後】	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒
	【後】	リドカイン点滴静注液1% 200mL	1%200mL1袋
		I c 群 活動電位持続時間不変	
	【後】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トワ」（＝サンリズム）	25mg1カプセル
	【後】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トワ」（＝サンリズム）	50mg1カプセル
		サンリズム注射液50 5mL	50mg5mL1管
	【後】	フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」（＝タンボール）	50mg1錠
	【後】	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」（＝プロノン）	150mg1錠
		Ⅲ群 Kチャンネル抑制	
	【後】	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	50mg1錠
	【後】	アミオダロン塩酸塩静注150mg	150mg3mL1管
		シンビット静注用50mg	50mg1瓶
		Ⅳ群 Ca拮抗薬	
		ワソラン静注5mg/2mL	0.25%2mL1管
	【後】	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg1錠
213 利尿剤			
2133		抗アルドステロン製剤	
	【後】	スピロラクトン錠25mg（＝アルダクトン）	25mg1錠
	【後】	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」（＝ソルダクトン）	200mg1管
2134		炭酸脱水酵素阻害剤	
		ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶
2139		その他の利尿剤	
		ループ利尿薬	
	【後】	フロセミド錠20mg（＝ラシックス）	20mg1錠
	【後】	フロセミド注20mg「NIG」（＝ラシックス）	20mg1管2mL
	【後】	トラセミド錠4mg「KO」（＝ルブラック）	4mg1錠

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		【後】	アゾセミド錠30mg	30mg1錠
			サイアザイド類似薬	
			ナトリックス錠1	1mg1錠
			浸透圧利尿薬	
			パソブレシンV2-受容体拮抗薬	
		【後】	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(=サムスカ)	7.5mg1錠
		【後】	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」(=サムスカ)	15mg1錠
			サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶
214 血圧降下剤				
2144			アンジオテンシン変換酵素阻害剤	
		【後】	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」(=コバシル)	4mg1錠
2145			メチルドパ製剤	
			メチルドパ錠(ツルハラ)250	250mg1錠
2149			その他の血圧降下剤	
			β遮断薬	
			ビソノテープ2mg	2mg1枚
			ビソノテープ4mg	4mg1枚
			α遮断薬	
		【後】	ドキサゾシン錠2mg「テバ」(=カルテリン)	2mg1錠
			エブランチルカプセル15mg	15mg1CP
			α・β遮断薬	
		【後】	カルベジロール錠10mg「トーワ」(=アチスト)	10mg1錠
			カルベジロール錠1.25mg(=アチスト)	1.25mg1錠
			アンジオテンシン受容体拮抗剤(ARB)	
		【後】	カンデサルタン錠8mg(=フロンテス)	8mg1錠
		【後】	テルミサルタン錠40mg(=ミカルディ)	40mg1錠
		【後】	イルベサルタン錠100mg「オーハラ」(=イルベタン)	100mg1錠
		【後】	アジルサルタン錠20mg「JG」(=アジルバ)	20mg1錠
			持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬/利尿薬配合剤	
			持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤	
			Ca拮抗薬	
		【後】	アゼルニジピン錠16mg「日医工」(=カルプルク)	16mg1錠
		【後】	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(=ヘルゾピン)	2mg2mL1管
			ベルジピン注射液10mg/10mL	10mg10mL1管
			抗アルドステロン薬	
		【後】	エプレレノン錠50mg「杏林」(=セウ)	50mg1錠
			レニン阻害剤	
216 血管収縮剤				
2160			血管収縮剤	
		【後】	ミドドリン塩酸塩錠2mg「NIG」(=メロジソン)	2mg1錠
			ネオシネジンコーワ注1mg	1mL1管
			5-HT _{1B/1D} 受容体作動型片頭痛治療剤	
217 血管拡張剤				
2171			冠血管拡張剤	
			Ca拮抗薬	
		【後】	アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」(=ルバスクOD)	2.5mg1錠
		【後】	アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」(=ルバスクOD)	5mg1錠
		【後】	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(=アタラートCR)	20mg1錠
		【後】	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」(=アタラートCR)	40mg1錠
		【後】	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(=アタラートカプセル)	5mg1カプセル
		【後】	シルニジピン錠10mg(=アテック)	10mg1錠
		【後】	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」(=ヘルベッサ-R)	100mg1カプセル
		【後】	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」(=ワソラン)	40mg1錠
			Kチャンネルオープナー	
		【後】	ニコランジル錠5mg「サワイ」(=シグマート)	5mg1錠

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		【後】	ニコランジル点滴静注用 2mg「サワイ」	2mg 1瓶
			シグマート注 12mg	12mg 1瓶
			ニトロ類	
		【後】	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」 (=アイソール)	20mg 1錠
		【後】	ニトロペン舌下錠 0.3mg	0.3mg 1錠
			ニトロール注 5mg/10ml	0.05% 10mL 1管
			ニトロール点滴静注 50mg バッグ	0.1% 50mL 1瓶
		【後】	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	40mg 1枚
			ミオコールスプレー 0.3mg	0.65% 7.2g 1缶
			その他	
2179			その他の血管拡張剤	
			心房性Na利尿ペプチド	
			ハンプ注射用 1000μg	1.000μg 1瓶
218 高脂血症用剤				
2183			クロフィブラート系製剤	
			バルモディアXR錠 0.2mg	0.2mg 1錠
2189			その他の高脂血症用剤	
			HMG-CoA還元酵素阻害薬	
		【後】	プラバスタチン錠 10 (=ハートン)	10mg 1錠
		【後】	アトルバスタチン錠 10mg「サワイ」 (=リットル)	10mg 1錠
		【後】	ロスバスタチン錠 2.5mg「サワイ」 (=クレストール)	2.5mg 1錠
			抗酸化薬	
			コレステロールトランスポーター阻害薬	
		【後】	エゼチミブ錠 10mg「ケミファ」	10mg 1錠
			その他	
			持続性Ca拮抗薬/HMG-CoA還元酵素阻害剤	
219 その他の循環器官用薬				
2190			その他の循環器官用薬	
			抗トロンビン薬	
		【後】	アルガトロバン注射液 10mg「サワイ」 (=スポンソリ)	10mg 20mL 1管
			K吸収抑制薬	
		【後】	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 20% 分包 25g「三和」	25% 1個
			カリメート散 (内用)	5g 1包
			カリメート経口液 20% 25g	25g 1包
			ロケルマ懸濁用散 分包 5g	5g 1包
			リン吸着薬	
			脳障害後遺症用薬	
		【後】	イフェンブロジル錠 20mg	20mg 1錠
			超急性期血栓溶解薬	
			脳浮腫用薬 浸透圧利尿薬	
			グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200ml (=グリオール)	200mL 1袋
			プロスタグランジン類	
		【後】	アルプロスタジル注 5μg シリンジ「サワイ」 (=リファル)	5μg 1mL 1シリンジ
			ニコチン酸類	
		【後】	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トワ」 (=トコナ)	100mg 1カプセル
			HCNチャネル遮断薬	
			コラン錠 2.5mg	2.5mg 1錠
			AT2受容体拮抗薬/RAAS阻害薬 (ARNI)	
			エンレスト錠 100mg	100mg 1錠
			可溶性G蛋白結合型 (sGC) 刺激剤	
			ベリキューボ錠 2.5mg	2.5mg 1錠
22- 呼吸器官用薬				
221 呼吸促進剤				
2219			その他の呼吸促進剤	
			麻薬拮抗薬	

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」	0. 2mg 1mL 1管
		ベンゾジアゼピン拮抗薬	
	【後】	フルマゼニル注射液0. 5mg「ニプロ」（＝アネキセート）	0. 5mg 5mL 1管
222 鎮咳剤			
2229		その他の鎮咳剤	
		フスタゾール糖衣錠 10mg	10mg 1錠
223 去痰剤			
2233		システイン系製剤	
		カルボシステイン錠 500mg（＝ムコダイン）	500mg 1錠
2234		ブロムヘキシン製剤	
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「トーワ」	4mg 1錠
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4mg	0. 2% 2mL 1管
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0. 2%	0. 2% 45mL 1本
2239		その他の去痰剤	
	【後】	アンブロキシオール塩酸塩徐放OD錠 45mg（＝ムコソルバン）	45mg 1カプセル
224 鎮咳去痰剤			
2242		コデイン系製剤	
		コデインリン酸塩錠 5mg「VTRS」	5mg 1錠
2249		その他の鎮咳去痰剤	
225 気管支拡張剤			
2251		キサンテン系製剤	
	【後】	テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」	100mg 1錠
2254		サルブタモール製剤	
		ベネトリン吸入液 0. 5%	0. 5% 30mL 1本
2259		その他の気管支拡張剤	
		β2刺激薬	
		メプチンエアー 10μg 吸入 100回	0. 0143% 5mL 1瓶
		メプチン吸入液ユニット 0. 01% 0. 3ml	0. 01% 0. 3ml
	【後】	ツロブテロールテープ 2mg「久光」（＝ネナリン）	2mg 1枚
		抗コリン薬	
		スピリーバ 2. 5μg レスピマット60吸入用	60吸入 1キット
		抗コリン薬配合剤・β2刺激薬吸入剤（COPD治療配合剤）	
		アノーロエリプタ30吸入用	30吸入 1キット
		抗アレルギー薬	
		インターール吸入液 1%	1% 2mL 1管
226 含嗽剤			
2260		含嗽剤	
		ポビドンヨードガーグル液 7%「明治」30mL（＝イソジンガーグル）	7% 30mL
		含嗽用ハチアズレ顆粒	0. 1% 2g 1包
229 その他の呼吸器官用薬			
2290		その他の呼吸器官用薬	
		ステロイド薬	
		ステロイド・β2刺激薬配合剤（喘息・COPD治療配合剤）	
		アドエア125エアゾール120吸入	12. 0g 1瓶
		シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入 1キット
		レルベア100エリプタ14吸入用	14吸入 1キット
23- 消化器官用薬			
231 止瀉剤，整腸剤			
2312		タンニン酸系製剤	
		タンニン酸アルブミン	
2316		活性生菌製剤	
		ミヤBM	1g 1包
2318		ジメチコン製剤	
	【後】	ジメチコン錠 40mg「YD」	40mg 1錠
	【後】	ジメチコン内用液 2%「ホリイ」（＝ガスコンドロップ）	2% 500mL

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
2319			その他の止瀉剤，整腸剤	
	【後】		ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(＝ロペミン)	1mg 1錠
			薬用炭(1包50gを救急室に保管)	
232			消化性潰瘍用剤	
2325			H2遮断剤	
	【後】		ファモチジンD錠20mg	20mg 1錠
	【後】		ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL (＝カスター)	20mg 20mL
2329			その他の消化性潰瘍用剤	
			プロトン・ポンプ阻害薬(PPI)	
			オメプラゾール注射用20mg (＝オメプラール)	20mg 1瓶
	【後】		ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」(＝タプロンOD)	15mg 1錠
	【後】		ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」(＝パリエット)	10mg 1錠
			タケキャブ錠10mg	10mg 1錠
			防御因子増強薬	
	【後】		スルピリド錠50mg「アメル」(＝トグマチール)	50mg 1錠
			レバミピド錠100mg (＝ムスコ)	100mg 1錠
	【後】		ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(＝プロマック)	75mg
			アルロイドG内用液5%	600mL
233			健胃消化剤	
2331			消化酵素製剤	
			リパクレオンカプセル150mg	150mg 1カプセル
2339			その他の健胃消化剤	
234			制酸剤	
2343			アルミニウム化合物製剤	
2344			無機塩製剤	
			酸化マグネシウム	
	【後】		マグミット錠330mg	330mg 1錠
			炭酸水素ナトリウム	
2349			その他の制酸剤	
235			下剤，浣腸剤	
2354			植物性製剤	
	【後】		センノシド錠12mg「サワイ」(＝フルベニド)	12mg 1錠
2357			グリセリン製剤	
			グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	30mL 15g 1個
			グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	50% 60mL 1個
			グリセリン浣腸「オヲタ」150	150mL 75g 1個
			グリセリンBC液「ヨシダ」	500mL
2359			その他の下剤，浣腸剤	
	【後】		ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	0.75% 10mL 1本
			テレミンソフト坐薬10mg	10mg 1個
			アミティーザカプセル12μg	12μg 1カプセル
			グーフィス錠5mg	5mg
			モビコール配合内用剤LD	6.8523g 1包
			スインブロイク錠0.2mg	0.2mg 1錠
236			利胆剤	
2362			胆汁酸製剤	
	【後】		ウルソデオキシコール酸錠100mg (＝ウルソ)	100mg 1錠
239			その他の消化器官用薬	
2391			鎮吐剤	
			5-HT3受容体拮抗型制吐剤	
			ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg 1錠
	【後】		グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」	1mg 50mL 1袋
	【後】		パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	0.75mg 5mL 1瓶
			選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	
	【後】		ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	150mg 1瓶

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
2399	他に分類されない消化器官用薬	
	消化管運動亢進薬	
	ブリンペラン錠 5	5mg 1錠
【後】	塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」（＝ブリンペラン）	0.5% 2mL 1管
【後】	ドンペリドン錠10mg「JG」（＝ナウゼリン）	10mg 1錠
【後】	ドンペリドン坐剤10mg「日新」	10mg 1個
【後】	ドンペリドン坐剤30mg「日新」	30mg 1個
	ナウゼリン坐剤60	60mg 1個
	モサブリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」（＝ガストリン）	5mg 1錠
	オピオイド受容体作用薬	
	潰瘍性大腸炎・クローン病用薬	
	抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	
	レミケード点滴静注用100	100mg 1瓶
	口腔用薬	
	副腎皮質ホルモン製剤	
【後】	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 5g「日医工」	0.1% 5g
	トローチ剤	
【後】	SPトローチ0.25mg 明治	0.25mg 1錠
	その他	
	シェーグレン症候群用薬	
24- ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）		
241 脳下垂体ホルモン剤		
2411	ACTH製剤	
2412	脳下垂体前葉ホルモン製剤	
2414	脳下垂体後葉ホルモン製剤	
	ピトレシン注射液20	20単位 1mL 1管
2419	その他の脳下垂体ホルモン剤	
243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤		
2431	甲状腺ホルモン製剤	
	チラーヂンS錠50	50 μ g 1錠
2432	抗甲状腺ホルモン剤	
	メルカゾール錠2.5mg	2.5mg 1錠
2439	その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
【後】	テリバラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	600 μ g 1キット
	テリボン皮下注用56.5 μ g	56.5 μ g 1瓶
244 たん白同化ステロイド剤		
2449	その他のたん白同化ステロイド剤	
245 副腎ホルモン剤		
2451	エピネフリン製剤	
	ボスミン注1mg	0.1% 1mL 1管
	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL	0.1% 1mL 1シリンジ
	ノルアドリナリン注1mg	0.1% 1mL 1管
2452	コルチゾン系製剤	
	ソル・コーテフ静注用100mg	100mg 1瓶（溶解液付）
2454	フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	
	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水性懸濁注40mg / 1mL	40mg 1mL 1瓶
【後】	デキサート注射液1.65mg	1.65mg 1管
【後】	デキサート注射液6.6mg	6.6mg 1管
【後】	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」（＝リンデロン）	0.5mg 1錠
	リンデロン注4mg (0.4%)	4mg 1mL 1管
2456	プレドニゾン系製剤	
	プレドニン錠5mg	5mg 1錠
	プレドニゾン錠1mg（旭化成）	1mg 1錠
	水溶性プレドニン10mg	10mg 1管
	ソル・メドロール静注用125mg	125mg 1瓶（溶解液付）

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			ソル・メドロール静注用 500mg	500mg 1瓶（溶解液付）
246 男性ホルモン剤				
2461			テストステロン製剤	
			エナルモンデポー筋注 250mg	250mg 1mL 1管
247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤				
2478			合成黄体ホルモン製剤	
249 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）				
2492			すい臓ホルモン剤	
			超速効型	
	【後】		インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」（＝ノボラピッド）	300単位 1キット
	【後】		インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」（＝ヒューマログ）	300単位 1キット
			超速効 混合型	
			ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300単位 1キット
			ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	300単位 2キット
			速効型	
			ヒューマリンR注 100単位/mL	100単位 1mL バイアル
			混合型	
			中間型	
			持続型	
	【後】		インスリングルガリンBS注ミリオペン「リリー」（＝ランタス注ソロスター）	300単位 3mL 1筒
			トレシーバ注フレックスタッチ	300単位 3mL 1筒
			GLP-1アナログ	
2499			他に分類されないホルモン剤（含抗ホルモン剤）	
	【後】		ジノプロスト注射液 1000μg「F」	1mg 1mL 1管
	【後】		オクトレオチド皮下注 100μg「あすか」	100μg 1mL 1管
			前立腺癌、閉経前乳癌	
			ゴナックス皮下注用 80mg	80mg 1瓶
			ゴナックス皮下注用 120mg	120mg 1瓶
			ゴナックス皮下注用 240mg	240mg 1瓶
			リユープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg 1筒
			5α還元酵素阻害薬	
	【後】		デュタステリド錠 0.5mg AV「DSEP」	0.5mg
25- 泌尿生殖器官及び肛門用薬				
255 痔疾用剤				
2559			その他の痔疾用剤	
			ジオン注無痛化剤付	10mL 1瓶（希釈液付）
	【後】		ヘモポリゾン軟膏	2g
			ボラザG坐剤	1個
			ボラザG軟膏 2.4g	
259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬				
2590			その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
			尿失禁・頻尿治療薬	
	【後】		イミダフェナシンOD錠 0.1mg「YD」（＝ステプラ）	0.1mg 1錠
			ベオーバ錠 50mg	50mg 1錠
			排尿困難・尿閉用薬	
	【後】		タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「トリ」（＝ハルナド）	0.2mg 1錠
	【後】		シロドシンOD錠 4mg「DSEP」（＝ユリフ）	4mg 1錠
	【後】		タダラフィル錠 5mgZA「シオエ」	5mg 1錠
26- 外皮用薬				
261 外皮用殺菌消毒剤				
2611			塩素酸塩製剤	
			次亜塩 0.05%液「ヨシダ」	
			次亜塩 0.1%液「ヨシダ」	
2612			ヨウ素化合物	
	【後】		ポピヨドン液 10%	10% 250mL

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
2614	過酸化物製剤	
2615	アルコール製剤	
	消毒用エタノール液	500mL
2616	石鹼類製剤	
	デアミトール消毒用液50W/V%	50%500mL
2619	その他の外皮殺菌消毒剤	
	クロルキシレンジン®ルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	1%250mL1本
	ヒビスコール液A1%	1%1L
	ステリクロンWエタノール液0.5	
	マスキンスクラブ	500ml
263 化膿性疾患用剤		
2633	外用サルファ製剤	
	ゲーベングリーム1%	1%100g
2634	外用抗生物質製剤	
	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg10g
	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm1枚
2639	その他の化膿性疾患用剤	
264 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤		
	アズノール軟膏0.033%	
2646	副腎皮質ホルモン製剤	
	I群 Strongest	
	II群 Very Strong	
	マイザー軟膏0.05%	0.05%5g
	III群 Strong	
	リンデロン-V軟膏0.12%	5g
	IV群 Mild	
	ロコイド軟膏0.1%	0.1%10g
	I群 Weak	
2647	抗生物質・副腎皮質ホルモン混合製剤	
2649	その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	
	亜鉛華軟膏	
	エキザルベ軟膏5g	
	非ステロイド性消炎鎮痛薬	
	【後】 フェルビナクパップ70mg「ユートク」（＝セルタチ）	10cm×14cm7枚1袋
	【後】 ケトプロフェンテープS20mg「テイク」	7cm×10cm7枚1袋
	【後】 フェルビナクローション3%「ラケル」（＝ナバゲルン）	3%100mL
	スチックゼノールA	40g
	止痒薬	
	オイラックスクリーム10%	10%
	その他	
265 寄生性皮膚疾患用剤		
2655	イミダゾール系製剤	
	エンベシドクリーム1%	1%10g
	ラミシール外用液1%	10g1本
266 皮膚軟化剤（腐食剤を含む）		
2661	有機酸製剤	
	スピール膏M	25cm2 1枚
2669	その他の皮膚軟化剤（腐食剤を含む）	
	【後】 尿素クリーム10%「SUN」 20g（＝ウルバール）	10%20g
269 その他の外皮用薬		
2699	他に分類されない外皮用薬	
	肉芽・表皮形成促進薬	
	オルセノン軟膏0.25%	0.25%30g
	プロスタンディン軟膏0.003%	0.003%30g
	フィブラストスプレー500	500μg1瓶（溶解液付）

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
抗菌・消毒外用薬				
	【後】	ネグミンシュガー軟膏	（＝ユハスタ）	100g1本
29- その他の個々の器官系用医薬品				
290 その他の個々の器官系用医薬品				
2900		その他の個々の器官系用医薬品		
		セファランチン注	10mg	0.5%2mL1管
3- 代謝性医薬品				
31- ビタミン剤				
311 ビタミンA及びD剤				
3112		合成ビタミンD製剤		
	【後】	アルファカルシドール錠	0.5μg「アメル」	0.5μg1錠
312 ビタミンB1剤				
3122		ビタミンB1誘導体製剤		
	【後】	フルスルチアミン錠	25mg「トーフ」（＝アリナミン）	25mg1錠
313 ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く）				
3131		ビタミンB2剤		
3133		パントテン酸系製剤		
	【後】	パンテチン錠	100mg「YD」	100mg1錠
		パントシン注	5%100mg	100mg2mL1管
3134		ビタミンB6剤		
	【後】	ピリドキサル錠	20mg「ツルハラ」（＝ピトキサール）	20mg1錠
3135		葉酸製剤		
		フォリアミン錠		5mg1錠
3136		ビタミンB12剤		
	【後】	メコバラミン錠	500μg	0.5mg1錠
	【後】	メコバラミン注	500μg「NP」	0.5mg1管
314 ビタミンC剤				
3140		ビタミンC剤		
	【後】	アスコルビン酸注	500mgPB「日新」	500mg1管
316 ビタミンK剤				
3160		ビタミンK剤		
		ケイツーN静注用	10mg	10mg2mL1管
317 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く）				
3179		その他の混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く）		
		ビタメジン静注用		1瓶
		ビタジェクト注キット		2筒1キット
32- 滋養強壮薬				
321 カルシウム剤				
3211		乳酸カルシウム製剤		
		乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末		10g
3213		グルコン酸カルシウム製剤		
		カルチコール注射液	8.5%5mL	8.5%5mL1管
3215		ハロゲン化カルシウム製剤		
322 無機質製剤				
3221		ヨウ素化合物製剤		
		ヨウ化カリウム（ルゴール液の調整に使用）		
3222		鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）		
		クエン酸第一鉄Na錠	50mg「サワイ」（＝フェリス）	鉄50mg1錠
		フェジン静注	40mg/2ml	40mg2mL1管
		フェインジェクト静注	500mg	500mg10mL
3229		その他の無機質製剤		
		カリウム製剤		
		アスパラカリウム錠	300mg	300mg1錠
		アスパラカリウム散	50%500mg/g	
微量元素				

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			【後】 エレジェクト注シリンジ2ml	2mL1管
323 糖類剤				
3231			ブドウ糖製剤	
			ブドウ糖注射液 5% 20ml	5%20mL1管
			大塚糖液 5% 50ml	5%50mL1瓶
			大塚糖液 5% 100ml	5%100mL1袋
			テルモ糖注 5% 250ml	5%250mL1袋
			大塚糖液 5% 500ml	5%500mL1袋
			大塚糖液 10% 500ml	10%500mL1袋
			大塚糖液 50% 20ml	50%20mL1管
			大塚糖液 50% 200ml	50%200mL1袋
			大塚糖液 70% 350ml	70%350mL1袋
3234			キシリトール製剤	
3239			その他の糖類剤	
			ハイカリックRF輸液 500ml	500mL1袋
325 たん白アミノ酸製剤				
3253			混合アミノ酸製剤	
			アミパレン輸液 200mL1袋	200mL1袋
			低アルブミン血症改善薬	
			リーバクト配合顆粒	4.15g1包
			肝性脳症用	
			アミノレバン点滴静注 200ml	200mL1瓶
			腎不全用	
			ネオアミュー輸液 200m l	200mL1袋
3259			その他のたん白アミノ酸製剤	
			血中アンモニア低下薬	
			アミノレバンEN配合散	50g1包
			経管栄養剤	
			成分栄養（アミノ酸系）	
			エレンタール配合内用剤	80g1包
			消化態栄養（蛋白質系）	
			半消化態栄養（蛋白質系）	
	限定		エンシュア・H	250mL
			ラコールNF配合経腸用液	400mLバッグ
			高カロリー用輸液（糖・アミノ酸・電解質輸液＋ビタミン＋微量元素）	
			エルネオバNF1号輸液 1000ml	1000mL1キット
			エルネオバNF1号輸液 1500ml	1500mL1キット
			エルネオバNF2号輸液 1000ml	1000mL1キット
			エルネオバNF2号輸液 1500ml	1500mL1キット
			糖・アミノ酸・電解質・ビタミン輸液	
			バレブラス輸液 500mL	500mL1キット
329 その他の滋養強壮薬				
3299			他に分類されない滋養強壮薬	
			脂肪乳剤	
			イントラリボス輸液20% 100ml	100mL1袋
33- 血液・体液用薬				
331 血液代用剤				
3311			生理食塩液類	
			大塚生食注 20ml	20mL1管
			大塚生食注 50ml	50mL1瓶
			テルモ生食 100m l	100mL1袋
			テルモ生食TK 100ml	100mL1キット
			大塚生食注 250m l	250mL1袋
			大塚生食注 500m l	500mL1袋
			大塚生食注 500m l（洗浄用）	500mL1瓶

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		テルモ生食 1L	1 L 1袋
		生理食塩液P L「フソー」 1L	1 L 1瓶
		生理食塩液P L「フソー」 2L	2 L 1瓶
		電解質補正液	
		大塚食塩注 10% 20ml	10% 20mL 1管
3319		その他の血液代用剤	
		電解質補正液	
		カリウム補正用（K）	
	【後】	KCL注 20mEqキット「テルモ」	1モル20mL 1キット
		磷酸・カリウム補正用	
		低張輸液（点滴開始液）	
		ソルデム1輸液 500ml	500mL 1袋
		ソルデム1輸液 200ml	200mL 1袋
		維持液	
		KN3号輸液 200ml	200mL 1瓶
		KN3号輸液 500ml	500mL 1瓶
		1/4 乳酸リンゲル液	
		KNMG3号輸液 500ml	500mL 1袋
		等張輸液	
		ラクテック注 500ml	500mL 1袋
		ラクテックD液 500ml	500mL 1瓶
		血漿増量剤 デキストラン輸液	
		ボルベン輸液 6% 500ml	500mL 1袋
		酢酸リンゲル液	
		フィジオ140輸液 500ml	500mL 1袋
332 止血剤			
3321		カルバゾクロム系製剤	
	【後】	カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg「YD」	30mg 1錠
	【後】	カルバゾクロムスルホン酸Na静注液 50mg（＝アドナ）	0.5% 10mL
3322		ゼラチン製剤	
3323		臓器性止血製剤	
		トロンビン液モチダソフトボトル 1万	10,000単位 10mL 1キット
3327		抗プラスミン剤	
	【後】	トランキサミン酸カプセル 250mg「ト-ワ」（＝トランサミン）	250mg 1カプセル
		トランサミン注 5% 5ml	5% 5mL 1管
3329		その他の止血剤	
		ヘパリン拮抗薬	
		プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」	1% 10mL バイアル
333 血液凝固阻止剤			
3332		ジクマロール系製剤	
		ワーファリン錠 1mg	1mg 1錠
3334		ヘパリン製剤	
		ヘパリンNa注 5千単位／5mL	5000単位 5mL 1瓶
		ヘパリンNa注 1万単位／10mL	10000単位 10mL 1瓶
	【後】	ヘパリンカルシウム皮下注 5千単位／0.2mLシリンジ「モチダ」	5,000単位 0.2ml
		ヘパリンNaロック用100単位/mlシリンジ10ml	1,000単位 10mL 1筒
		クレキササン皮下注キット2000IU	2000IU
3339		その他の血液凝固阻止剤	
	【後】	リバーロキサバンOD錠 10mg「バイエル」	10mg 1錠
	【後】	リバーロキサバンOD錠 15mg「バイエル」	15mg 1錠
		エリキユース錠 2.5mg	2.5mg 1錠
		エリキユース錠 5mg	5mg 1錠
		リクシアナOD錠 15mg	15mg 1錠
		リクシアナOD錠 30mg	30mg 1錠
	【後】	ヘパリン類似物質クリーム 0.3%「日医工」25g（＝ヒルトイト）	25g

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		リコモジュリン点滴静注用 12800	12800単位1瓶
339 その他の血液・体液用薬			
3399		他に分類されない血液・体液用薬	
		アルスロマチック関節手術用灌流液	3.000mL1バッグ
		血小板凝集抑制薬	
		シクロオキシゲナーゼCOX1阻害薬	
	【後】	バイアスピリン錠100mg	100mg1錠
		アデニルシクラーゼ受容体阻害薬	
	【後】	クロピドグレル錠25mg（＝プレックス）	25mg1錠
	【後】	クロピドグレル錠75mg（＝プレックス）	75mg1錠
		エフィエント錠3.75mg	3.75mg
		エフィエント錠5mg	5mg
		（プロスタンディン類）	
	【後】	ベラプロストNa錠20μg「トワ」（＝ドルナ）	20μg1錠
	【後】	リマプロストアルファ錠5μg「日医工」（＝バルモン）	5μg1錠
		ホスホジエステラーゼ阻害薬	
	【後】	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	100mg1錠
		トロンボキサンA2合成阻害薬	
	【後】	イコサペント酸Etil粒状カプセル900mg「TC」（＝エパテル）	900mg1包
		セロトニン5-HT2拮抗薬	
	【後】	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」（アソラーク）	100mg1錠
		体外循環用添加剤（溶血防止剤）	
		顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF製剤）	
		ノイトロジン注100μg	100μg1瓶
	【後】	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	3.6mg0.36mL1筒
34- 人工透析用薬			
341 人工腎臓透析用剤			
3410		人工腎臓透析用剤	
		サブラッド血液ろ過用補充液BSG	1010mL
39- その他の代謝性医薬品			
391 肝臓疾患用剤			
3919		その他の肝臓疾患用剤	
		強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	20mL1管
392 解毒剤			
3922		グルタチオン製剤	
3923		メルカプト酢酸系製剤（BALを含む）	
		バル筋注100mg「AFP」	10%1mL1管
3925		チオ硫酸ナトリウム製剤	
		デトキソール静注液2g	10%20mL1管
3929		その他の解毒剤	
		慢性腎不全用薬 老廃物吸着薬	
		クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠
		銅吸収阻害剤	
	【後】	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」（＝バルゾン）	50mg1錠
		抗薬酸代謝拮抗薬	
		アシドーシス改善薬	
		メイロン静注7% 20ml	7%20mL1管
		メイロン静注7% 250ml	7%250mL1瓶
		有機リン類系神経毒治療薬	
		活性型葉酸製剤	
		レボホリナート点滴静注用「ヤルト」25mg	25mg1瓶
		レボホリナート点滴静注用「ヤルト」100mg	100mg1瓶
	【後】	ホリナート錠25mg「サワイ」（＝ユゼル）	25mg1錠
		筋弛緩回復剤	
	【後】	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	200mg2mL1筒

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
394 痛風治療剤			
3941		コルヒチン製剤	
3943		アロプリノール製剤	
3949		その他の痛風治療剤	
	【後】	フェブキソスタット錠10mg「サワイ」	10mg 1錠
		ユリス錠1mg	1mg 1錠
395 酵素製剤			
3954		ウロキナーゼ製剤	
3959		その他の酵素製剤	
		血栓溶解剤 修飾型組織プラスミノゲンアクチベーター（t-PA）	
		クリアクター静注用80万	80万国際単位1瓶
		壊死組織溶解酵素剤	
		プロメライン軟膏5万単位/g（ジェイドルフ）	50,000単位1g 1本20g
396 糖尿病用剤			
3961		スルフォニル尿素系製剤	
	【後】	グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」（＝アマリール）	0.5mg 1錠
3962		ビグアナイド系製剤	
		メトホルミン塩酸塩錠250mgMT	250mg 1錠
3969		その他の糖尿病用剤	
		αグルコシダーゼ阻害薬	
	【後】	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」（＝ベイスンOD）	0.3mg 1錠
		速効型食後血糖降下剤	
	【後】	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」（＝シュアボスト）	0.25mg 1錠
		速効型インスリン分泌促進・食後過血糖改善配合薬	
		インスリン抵抗性改善薬 チアソリジン類	
	【後】	ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」（＝アクトス）	15mg 1錠
		選択的DPP-4阻害剤	
		ジャヌビア錠50mg	50mg 1錠
		トラゼンタ錠5mg	5mg 1錠
		選択的DPP-4阻害薬/ビグアナイド系薬配合剤	
		選択的SGLT2阻害剤	
		フォシーガ錠10mg	10mg 1錠
		ジャディアンス錠10mg	10mg 1錠
399 他に分類されない代謝性医薬品			
3992		アデノシン製剤	
		アデホスールコーワ注20mg	2mL 1管
3999		他に分類されないその他の代謝性医薬品	
		腸内アンモニア精製抑制薬	
		ラクツロースシロップ65%「NIG」	65%500mL 1本
		ポルトラック原末	6g 1包
	【後】	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	250mg 1錠
		腓酵素阻害薬	
	【後】	カモスタットメシル酸塩錠100mg（＝フォパソ）	100mg 1錠
		ガベキサートメシル酸塩注射用100mg（＝Iフォワイ）	100mg 1瓶
	【後】	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg（＝Iフォワイ）	500mg 1瓶
		ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」（＝フサン）	10mg 1瓶
		ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」（＝フサン）	50mg 1瓶
		免疫抑制薬	
		イムラン錠50mg	50mg 1錠
		抗リウマチ薬	
	【後】	メトトレキサート錠2mg（＝リウマトレックス）	2mg 1カプセル
		RANKL阻害薬	
		ランマーク皮下注120mg	120mg
		骨粗鬆症用薬	
		カルシトニン類（高Ca血症、骨ペーチェット治療薬）	

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
骨吸収抑制剤　ビスホスフォネート類				
【後】		アレンドロン酸錠 35mg「サワイ」（＝ボ [®] ナツ）		35mg 1錠
【後】		イバンドロン酸静注 1mg シリンジ「トーワ」		1mg 1mL 1筒
【後】		ゾレドロン酸点滴静注用 4mg　100mL		4mg 100mL
		リクラスト点滴静注液 5mg		5mg 100mL 1袋
		ブラリア皮下注 60mg シリンジ		60mg 1筒
骨形成促進・骨吸収抑制薬				
		イベニティ皮下注 105mg シリンジ		105mg
変形性膝関節症用薬				
【後】		ヒアルロン酸Na 関節注 25mg シリンジ「明治」		1% 2.5mL 1筒
糖尿病性神経障害改善薬　アルドース還元酵素阻害薬				
脳梗塞用薬　血小板凝集抑制薬				
【後】		オザグレルNa点滴静注 80mg バッグ「タカタ」(＝カタクロ [®] ト)		80mg 200mL
造血因子　エリスロポエチン				
【後】		ダルベポエチンアルファBS注 30μg シリンジ「三和」(＝ネス [®])		30μg
【後】		ダルベポエチンアルファBS注 60μg シリンジ「三和」(＝ネス [®])		60μg
		ミルセラ注シリンジ 100μg		100μg
急性肺障害用薬　好中球エラスターゼ阻害剤				
【後】		シベレスタットNa点滴静注用 100mg「ニプロ」(＝エラス [®] ホール)		100mg 1瓶
4- 組織細胞機能用医薬品				
42- 腫瘍用薬				
421 アルキル化剤				
4211		クロルエチルアミン系製剤		
422 代謝拮抗剤				
4223		フルオロウラシル系製剤		
		5-FU 注 1000mg	5-FU	1000mg 1管
	【後】	カペシタビン錠 300mg「サワイ」（＝セ [®] ロー [®] ダ [®] ）		300mg 1錠
4224		シトシン系製剤		
		ゲムシタビン点滴静注用 200mg (＝ジ [®] エムザ [®] ール)　GEM		200mg 1瓶
		ゲムシタビン点滴静注用 1g　(＝ジ [®] エムザ [®] ール)　GEM		1g 1瓶
4229		その他の代謝拮抗剤		
		ユーエフティ配合カプセル T100mg		100mg　1カプセル
	【後】	エスエーワン配合OD錠 T20（＝ティ [®] エスワン）　TS-1		20mg 1錠（カプセル相当量）
	【後】	エスエーワン配合OD錠 T25（＝ティ [®] エスワン）　TS-1		25mg 1錠（カプセル相当量）
	【後】	ペメトレキセド点滴静注液 100mg「トーワ」		100mg 4mL 1瓶
	【後】	ペメトレキセド点滴静注液 500mg「トーワ」		500mg 20mL 1瓶
423 抗腫瘍性抗生物質製剤				
4235		アントラサイクリン系抗生物質製剤		
	【後】	ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」（＝アド [®] リアシン）		10mg 1瓶
	【後】	ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」（＝アド [®] リアシン）		50mg 1瓶
	【後】	エピルビシン注射液 10mg / 5mL　(＝ファルモ [®] ルビ [®] シン)		10mg 1瓶
424 抗腫瘍性植物成分製剤				
4240		抗腫瘍性植物成分製剤		
		ビンカ・アルカロイド類		
		タキソ環類		
		パクリタキセル注射液 30mg 5ml　(＝タキ [®] ソール)		30mg 5mL 1瓶
	【後】	パクリタキセル注射液 100mg 16.7ml　(＝タキ [®] ソール)		100mg 16.7mL 1瓶
		アブラキサン点滴静注用 100mg		100mg 1瓶
	【後】	ドセタキセル点滴静注 20mg / 1mL「ニプロ」		20mg 1mL 1瓶
	【後】	ドセタキセル点滴静注 80mg / 4mL「ニプロ」		80mg 4mL 1瓶
		ジェブタナ点滴静注 60mg		60mg 1.5mL 1瓶 (溶解液付)
		DNAトポイソメラーゼ阻害薬		
	【後】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「NK」(＝ト [®] ポテンシン)		40mg 2mL 1瓶
	【後】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「NK」(＝ト [®] ポテンシン)		100mg 5mL 1瓶
		オニバイド点滴静注 43mg		43mg 10mL

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格	
429 その他の腫瘍用薬					
4291	その他の抗悪性腫瘍用剤				
	白金系抗癌薬				
	エルブラット点滴静注液	50mg	10mL	OHP	50mg 10mL 1瓶
	エルブラット点滴静注液	100mg	20mL	OHP	100mg 20mL 1瓶
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」（＝パ°ラ°ラチン）				50mg 5mL 1瓶
【後】	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」（＝パ°ラ°ラチン）				150mg 15mL 1瓶
【後】	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」（＝パ°ラ°ラチン）				450mg 45mL 1瓶
	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL（＝ランタ°）CDDP				10mg 20mL 1瓶
	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL（＝ランタ°）CDDP				50mg 100mL 1瓶
	肝細胞癌治療剤				
	乳癌用薬 抗エストロゲン剤				
	アロマターゼ阻害薬				
【後】	アナストロゾール錠 1mg「サント°」（＝アリミテ°ックス）				1mg 1錠
	その他				
【後】	エリブリンメシル酸塩静注液 1mg「ニプロ」				1mg 2mL 1瓶
	モノクローナル抗体				
【後】	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」（＝ハーセ°チン）				60mg 1瓶
【後】	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」（＝ハーセ°チン）				150mg 1瓶
	パージェタ点滴静注 420mg／14mL				420mg／14mL
【後】	ベバシズマブBS点滴静注 100mg「CTNK」				100mg／4mL
【後】	ベバシズマブBS点滴静注 400mg「CTNK」				400mg／16mL
	サイラムザ点滴静注液 100mg				100mg／10mL
	サイラムザ点滴静注液 500mg				500mg／50mL
	ベクティビックス点滴静注 100mg				100mg／5mL
	分子標的治療薬				
	免疫チェックポイント阻害薬				
	イミフィンジ点滴静注 500mg				500mg 10mL 1瓶
	オブジーボ点滴静注 120mg				120mg／12mL
	オブジーボ点滴静注 240mg				240mg／24mL
	経皮的エタノール注入療法用剤				
4299	他に分類されない腫瘍用薬				
	免疫賦活薬				
	ピシバニール注射用 5KE				5KE 1瓶
44- アレルギー用薬					
441 抗ヒスタミン剤					
4419	その他の抗ヒスタミン剤				
	ボララミン注 5mg				0.5% 1mL 1管
442 刺激療法剤					
4420	刺激療法剤				
	抗リウマチ薬				
449 その他のアレルギー用薬					
4490	その他のアレルギー用薬				
	抗ヒスタミン薬				
【後】	エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」（＝アレジ°オン）				20mg 1錠
	ロイコトリエン拮抗薬				
【後】	モンテルカスト錠 10mg（＝シング°レア）				10mg 1錠
5- 生薬及び漢方処方に基づく医薬品					
52- 漢方製剤					
520 漢方製剤					
5200	漢方製剤				
	ツムラ茵チン蒿湯エキス顆粒（医療用）				2.5g 1包
	ツムラ五苓散エキス顆粒				2.5g 1包
	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）				2.5g 1包
	ツムラ呉茱萸湯(31)エキス顆粒				2.5g 1包

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	ツムラ十全大補湯(48) 2. 5 g	2. 5 g 1包
	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	2. 5 g 1包
	ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)	2. 5 g 1包
	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	2. 5 g 1包
	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2. 5 g 1包
	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	2. 5 g 1包
	ツムラ抑肝散(54)エキス顆粒	2. 5 g 1包
6- 病原生物に対する医薬品		
61- 抗生物質製剤		
611 主としてグラム陽性菌に作用するもの		
6111	ペニシリン系抗生物質製剤	
	注射用ペニシリンGカリウム100万単位 PCG	100万単位1瓶
6112	リンコマイシン系抗生物質製剤	
	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」(=ダラシン)CLDM	600mg1管4ml
	ダラシнкаプセル150mg	150mg1カプセル
6113	バンコマイシン製剤	
	バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「明治」 VCM	500mg1瓶
	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「明治」 VCM	0. 5g1瓶
6119	その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
	【後】 テイコブラニン点滴静注用400mg「トーワ」	400mg1瓶
612 主としてグラム陰性菌に作用するもの		
6123	アミノ糖系抗生物質製剤	
	アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」 AMK	100mg1管1ml
613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの		
6131	ペニシリン系抗生物質製剤	
	アモキシシリンカプセル250mg (=アモシリン) AMPC	250mg1カプセル
	オーグメンチン配合錠250RS	250mg1錠
	ピクシリン注射用 ABPC	1g1瓶
	ピペラシリンNa注射用2g「テバ」 (=ペントシリン) PIPC	2g1瓶
6132	セフェム系抗生物質製剤	
	第一世代	
	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 100ml (=セファゾリン)	1g1キット
	ケフラールカプセル250mg CCL	250mg1カプセル
	第二世代	
	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g (=セフメタゾン)	1g1瓶
	第三世代	
	セフトラジウム静注用1g「VTRS」 (=セフトラジン) CAZ	1g1瓶
	セフトリアキソンNa静注用1g (=セフトリオン) CTRX	1g1瓶
	第四世代	
	【後】 セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	1g1瓶
6133	オキサセフェム系抗生物質製剤	
6134	アミノ糖系抗生物質製剤	
	ゲンタシン注60mg GM	60mg1. 5ml1管
6135	ホスホマイシン製剤	
	ホスホマイシンNa静注用2g (=ホスミンS注) FOM	2g1瓶
6139	その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
	スルバシリン静注用3g (=スバシン) ABPC/SBT	(3g) 1瓶
	スルペラゾン静注用1g SBT/CPZ	(1g) 1瓶
	【後】 タゾビベ配合静注 4. 5 (=ゾビシン)	4. 5g1瓶
	カルバペネム系抗生物質製剤	
	【後】 メロペネム点滴静注用1g「明治」	1g1瓶
614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		
6149	その他の主としてG陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	
	クラリスロマイシン錠200mg「NIG」 (=クレリス) CAM	200mg1錠

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			【後】 アジスロマイシン錠 500mg 「トワ」 (=ジスロマック)	500mg 1錠
			ジスロマック点滴静注用500mg	500mg
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの			
6152			テトラサイクリン系抗生物質製剤	
			ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg	100mg 1カプセル
			ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 MINO	100mg 1瓶
616	主として抗酸菌に作用するもの			
6164			リファンピシン製剤	
			リファンピシンカプセル150mg	150mg 1カプセル
617	主としてカビに作用するもの			
6173			アムホテリシンB製剤	
			ファンギゾンシロップ 100mg/mL AMPH	100mg 24mL 1本
6179			その他の主としてカビに作用するもの	
			【後】 ミカファンギンNa点滴静注用50mg (=ファンガード) MCFG	50mg 1瓶
62-	化学療法剤			
621	サルファ剤			
6219			その他のサルファ剤	
622	抗結核剤			
6222			イソニアジド系製剤	
			イスコチン錠 100mg INH	100mg 1錠
6223			ピラジナミド製剤	
6225			エタンブトール製剤	
624	合成抗菌剤			
6241			ピリドンカルボン酸系製剤（ニューキノロン系抗生物質）	
			【後】 レボフロキサシン錠500mg「陽進」 (=クレビット) LVFX	500mg 1錠
			【後】 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 LVFX	500mg 100mL
6249			その他の合成抗菌剤（オキサゾリジノン系合成抗菌剤）	
			【後】 リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 (=サイボックス)	600mg 1バッグ 300mL
625	抗ウイルス剤			
6250			抗ウイルス剤	
			抗ヘルペス薬	
			【後】 バラシクロビル錠 500mg (=バルトレックス)	500mg 1錠
			アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」 (=ゾビラックス)	250mg 1瓶
			【後】 ビダラビン軟膏 3% 「SW」 5g	3% 5g
			B型肝炎用薬	
			【後】 エンテカビル錠 0.5mg 「トワ」 (=バラクルード)	0.5mg
			C型肝炎用薬	
			インフルエンザ用薬	
			タミフルカプセル 75	75mg 1カプセル
			リレンザ	4ブリスター 5枚入
			ラピアクタ点滴用バック 300mg	300mg 60mL
			COVID-19治療薬	
			ラゲブリオカプセル 200mg	200mg
			ベクルリー点滴静注用 100mg	100mg 1瓶
629	その他の化学療法剤			
6290			その他の化学療法剤	
			抗真菌薬	
			フルコナゾールカプセル100mg「アメル」 (=ジフルカン) FCZ	100mg 1カプセル
			プロジフ静注液 200 F-FLCZ	200mg 1瓶
			【後】 イトラコナゾール内用液 1% 「VTRS」 (=イトリゾール)	1%
			スルファミン類 ST合剤	
			バクタ配合顆粒	1g
63-	生物学的製剤			
631	ワクチン類			
6311			細菌ワクチン類	

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			肺炎球菌ワクチン	
			ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL1瓶
			プレベナー20水性懸濁注	1シリンジ1回分：0.5mL
			BCGワクチン 結核予防	
			乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）	12mg1管（添付生食0.15ml）
			インフルエンザ菌b型による感染症（髄膜炎）の予防	
			アクトヒブ	1バイアル1本
6313			ウイルスワクチン類	
			沈降B型肝炎ワクチン	
			ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25mLシリンジ
			ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.5mLシリンジ
			その他	
			インフルエンザHAワクチン（ビケンHA）	1mL1瓶
			インフルエンザHAワクチン シリンジ	0.5mLシリンジ
			フルミスト点鼻液	0.2mL1筒
			乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	1瓶（添付水0.7ml溶解後）0.5ml
			乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	1瓶（添付水0.7ml溶解後）0.5ml
			ミールビック（乾燥弱毒生麻疹風しん混合ワクチン）	1瓶（添付水0.7ml溶解後）0.5ml
			コミナティ筋注シリンジ12歳以上用	シリンジ0.3mL：1本
			ジェービックV（乾燥培養日本脳炎ワクチン）	1本
			シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	
			シングリックス筋注用	1瓶（溶解液付）
			ロタテック内用液	2mL
			ロタリックス内用液	1.5mL1本
632			毒素及びトキソイド類	
6322			トキソイド類	
			沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL1キット
633			抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	
6331			抗毒素類	
			乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	6000単位
634			血液製剤類	
6343			血漿分画製剤	
			アルブミン製剤 高張製剤	
			献血アルブミン25%静注12.5/50mL「JB」	25%50mL1瓶
			アルブミン製剤 等張製剤	
			献血アルブミン5%静注250mL「JB」	250mL1瓶
			静注用人免疫グロブリン	
			献血グロベニン-I静注用2500mg 50ml	2.5g50mL1瓶（溶解液付）
			抗HBs人免疫グロブリン	
			ヘブスブリンIH静注 1000単位	1000単位5mL1瓶
			筋注用人免疫グロブリン	
			ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケダ」	150mg/1mL10mL
			濃縮人血液凝固第ⅩⅢ因子	
			乾燥濃縮アンチトロンビンⅢ（ATⅢ）	
			献血ノンスロン1500注射用	1.500単位1瓶（溶解液付）
			溶血ヘモグロビン処理薬	
			ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2.000単位100mL1瓶
			破傷風人免疫血清グロブリン 破傷風抗毒素	
			テタノブリン筋注用 250単位	250国際単位1瓶
			テタノブリンIH静注 1500単位	1.500国際単位1瓶
636			混合生物学的製剤	
6361			ワクチン・トキソイド混合製剤	
			百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合・ヘモフィルスb型ワクチン	
			ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL1シリンジ
			破傷風トキソイド	

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（ＤＴビック）	１瓶
639	その他の生物学的製剤		
6391	結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤		
	イムノブラダー膀胱注用	40mg	
64-	寄生動物に対する薬		
641	抗原虫剤		
6419	その他の抗原虫剤		
	アネメトロ点滴静注液	500mg 100mL	
	フラジール内服錠	250mg 1錠	
642	駆虫剤		
6429	その他の駆虫剤		
7-	治療を主目的としない医薬品		
71-	調剤用薬		
711	賦形剤		
7111	乳糖類		
	乳糖		
712	軟膏基剤		
7121	油脂性基剤		
	プロベト		
	オリーブ油		
7122	乳剤性基剤		
	吸水クリーム「ニッコー」		
7123	水溶性基剤		
	マクロゴール軟膏		
713	溶解剤		
7131	精製水類		
	注射用水 20mL	20mL 1管	
	注射用水 500mL（細口開栓・ブラボトル）	500mL 1瓶	
714	矯味、矯臭、着色剤		
7142	シロップ製剤		
	単シロップ		
719	その他の調剤用薬		
7190	その他の調剤用薬		
	塩化ナトリウム（内服用）		
	ヨウ素（ルゴール液の調整に使用）		
72-	診断用薬（体外診断用医薬品を除く）		
721	X線造影剤		
7211	ヨウ素化合物製剤		
	ガストログラフィン経口・注腸用		
7212	バリウム塩製剤		
	バリブライトP	300g	
	【後】エネマスター注腸散	350g 1瓶	
7213	造影補助剤		
	【後】バリエース発泡顆粒	2.5g 1包	
	マグコロール散	6.8%分包50g	
7214	配合製剤		
	ウログラフィン注	60% 20mL 1管	
7219	その他のX線造影剤		
	イオパミドール	300注20mL「F」（＝イパミドン）	20mL
	イオパミロン注	370 50mL	75.52%50mL 1瓶
	イオパミロン注	370 100mL	75.52%100mL 1瓶
	イオパミロン注	300シリンジ 80mL	61.24%80mL 1筒
	イオパミロン注	370シリンジ 100mL	75.52%80mL 1筒
	イソビスト注	240（脳槽・脊髄・関節造影剤）	10mL 1瓶
	オムニパーク	300シリンジ 100mL	64.71%100mL 1筒

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			オムニパーク 300 シリンジ 125m l	64.71% 125mL 1 筒
			ビリスコピン点滴静注 50	10.55% 100mL
722 機能検査用試薬				
7224			肝機能検査用試薬	
			ジアグノグリーン注射用 25mg	25mg 1 瓶（溶解液付）
7225			腎機能検査用試薬	
			インジゴカルミン注射液	0.4% 5mL 1 管
7229			その他の機能検査用試薬	
		【後】	ゲルカゴン注射用 1 単位「I L S」	1U.S.P. 単位 1 瓶（溶解液 1ml 付）
重症筋無力症診断薬 エドロホニウム塩化物製剤				
729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）				
7290			その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	
			経口糖忍容力試験用糖質液	
			トレーラン G 液 75g	225mL 1 瓶
			MRI 用経口消化管造影剤	
			フェリセルツ散 20%	600mg 1 包
			MRI 用造影剤	
			MRI 用肝臓造影剤	
			EOB・プリモビスト注シリンジ	10mL 1 シリンジ
			非イオン性 MRI 用造影剤	
			プロハンス 静注シリンジ 13mL	32.3% 15mL 1 筒
			超音波診断用造影剤	
			ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤	
			ユービット錠 100mg	100mg 1 錠
			蛍光眼底造影剤	
		【後】	フルオレサイト 静注 500mg	10% 5mL 1 瓶
			眼科検査用試験紙	
			フローレス眼検査用試験紙 0.7mg	1 枚 0.7mg
73- 公衆衛生用薬				
732 防疫用殺菌消毒剤				
7321			アルコール及びアルデヒド製剤	
			デイスオーバ消毒液 0.55%	0.55% 3.8L
			エスサイド消毒液 6%	6% 750mL
79- その他の治療を主目的としない医薬品				
799 他に分類されない他に分類されない治療を主目的としない医薬品				
7990			他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
			胃内粘液溶解除去剤 蛋白分解酵素	
			プロナーゼ MS	20,000 単位 0.5g
			腸管内容物洗浄薬	
			モビブレップ配合内用剤	1 袋
			局所接着薬	
			ベリプラス TP コンビセット組織接着用 3mL	
			タコシール組織接着用シート (4.8cm×4.8cm)	4.8cm×4.8cm 1 枚
			タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm)	9.5cm×4.8cm 1 枚
			医療用ガス	
			酸素	
			二酸化炭素	
8- 麻薬				
81- アルカロイド系麻薬（天然麻薬）				
811 アヘンアルカロイド系製剤				
8114			モルヒネ系製剤	
			オプソ内服液 5mg	5mg 2.5mL 1 包
			モルヒネ塩酸塩注射液 10mg 「第一三共」 1mL	1% 1mL 1 管 10mg
			モルヒネ塩酸塩注射液 50mg 「第一三共」 5mL	1% 5mL 1 管 50mg
8119			その他のあへんアルカロイド系麻薬	

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			オキシコドン徐放カプセル5mg（＝オキノン）	5mg 1錠
			オキシコドン徐放カプセル20mg（＝オキノン）	20mg 1錠
		【後】	オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」（＝オキノム）	2.5mg 1包
		【後】	オキシコドン内服液10mg「日本臓器」（＝オキノム）	10mg 1包
82- 非アルカロイド系麻薬				
821 合成麻薬				
8211			フェニルピペリジン系製剤	
			ペチジン塩酸塩注射液 35mg	3.5% 1mL 1管
8219			その他の合成麻薬	
		【後】	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005% 2mL 1管
		【後】	レミフェンタニル静注用2mg（＝アルパ）	2mg 1瓶
			フェントステープ0.5mg	0.5mg 1枚
		【後】	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」（＝フェントス）	1mg 1枚
		【後】	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」（＝フェントス）	2mg 1枚

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬 薬効分類	腎
【後】		アジスロマイシン錠500mg「トーワ」(＝ジスロマック)		
【後】		アジルサルタン錠20mg「JG」		△
		アスパラカリウム散50% 500mg/g		△
		アスパラカリウム錠300mg		△
【後】		アゼルニジピン錠16mg「日医工」(＝カルブロック)		
【後】		アゾセミド錠30mg (＝タイアト)		△
【後】		アトルバスタチン錠10mg「サワイ」(＝リピトール)		△
【後】	【危】	アナストロゾール錠1mg「サンド」(＝アリミテックス)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(＝シンメレル)		◎
【後】	【危】	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(＝アンカロン)	③不整脈用剤	
		アミティーザカプセル12μg		
		アミノレバンEN配合散 (50g/包)		
【後】		アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」(＝ノルバスクOD)		
【後】		アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」(＝ノルバスクOD)		
		アモキシシリンカプセル 250mg (＝サワシリン)		○
【後】	【危】	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」(＝エビリファイ)	⑨精神神経用剤	
【後】		アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」(＝ワンアルファ)		
		アルロイドG内用液5%		
【後】		アレンドロン酸錠35mg「サワイ」(＝ボナロン)		○
【後】	【危】	アロチノロール塩酸塩10mg錠「サワイ」	③不整脈用剤	
【後】		アンプロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」(＝ムコソルバン)		
【後】		イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」(＝エハデール)		
		イスコチン錠100mg		
【後】		一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(＝アイトロール)		
【後】		イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(＝イトリゾール)		
【後】		イフェンプロジル錠20mg (＝セロクール)		
【後】		イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」(＝ステープラ)		
	【危】	イムラン錠50mg	②免疫抑制剤	
【後】		イルベサルタン錠100mg「オーハラ」(＝イルベタン)		△
		ウブレチド錠5mg		◎
【後】		ウルソデオキシコール酸錠100mg (＝ウルソ)		
【後】	【危】	エスエーワン配合OD錠T20 (＝ティーエスワン)	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】	【危】	エスエーワン配合OD錠T25 (＝ティーエスワン)	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】		エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」(＝ルネスタ)		
【後】		エゼチミブ錠10mg「ケミファ」(＝ゼチーア)		
【後】	【危】	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(＝デパス)	⑨精神神経用剤	
【後】		エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」(＝アレジオン)		
	【危】	3.75mg エフィエント錠	⑤血液凝固阻止剤	
	【危】	5mg エフィエント錠	⑤血液凝固阻止剤	
		エブランチルカプセル15mg		
【後】		エプレレノン錠50mg「杏林」		○
	【危】	エリキウス錠2.5mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
	【危】	エリキウス錠5mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
		エレンタール配合内用剤 (80g/包)		
		塩化ナトリウム(内服用)		
		エンシュア・H 250ml		
【後】		エンテカビル錠0.5mg「トーワ」(＝バククルード)		◎
		エンレスト錠100mg		※△
		(麻)オキシコドン徐放カプセル5mg (＝オキシコンチン)		
		(麻)オキシコドン徐放カプセル20mg (＝オキシコンチン)		
【後】		(麻)オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」		
【後】		(麻)オキシコドン内服液10mg「日本臓器」		

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬 薬効分類	腎
		オーグメンチン配合錠250RS		
		(麻)オプソ内服液5mg		○
		ガストログラフィン経口・注腸用		
【後】	【危】	カペシタビン錠300mg「サワイ」(=セローダ)	①抗悪性腫瘍剤	○
【後】		カモスタットメシル酸塩錠100mg (=フオイパン)		
		カリメート経口液20%25g		
		カリメート散(5g/包)		
【後】		カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(=アドナ)		△
【後】	【危】	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」(=テグレート)	④抗てんかん剤	
		カルベジロール錠1.25mg (=アーチスト)		
【後】	【危】	カルベジロール錠10mg「トーフ」(=アーチスト)	③不整脈用剤	
		カルボシステイン錠500mg(=ムコダイン)		
【後】		カロナール錠500mg		○
【後】		カンデサルタン錠8mg (=プロプレス)		△
		キシロカインビスカス2%		
		グーフィス錠5mg		
【後】	【危】	クエチアピン錠25mg「日新」(=セロエル)	⑨精神神経用剤	
		クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(=フェロミア)		
		クラリスロマイシン錠200mg「NIG」(=クラリス)		○
【後】	【危】	グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」(=アマリール)	⑩糖尿病用剤	◎
		クレメジン速崩錠500mg		
【後】	【危】	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(=リーゼ)	⑨精神神経用剤	
【後】	【危】	クロピドグレル錠25mg (=プラビックス)	⑤血液凝固阻止剤	
【後】	【危】	クロピドグレル錠75mg (=プラビックス)	⑤血液凝固阻止剤	
		ケフラールカプセル250mg		○
		コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」		
		コララン錠2.5mg		
【後】		酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」		
【後】		サルポグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」(=アンプラーグ)		
		酸化マグネシウム		
【後】		ジアゼパム錠2「サワイ」(=セルシン)		△
【後】		ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(=セファドール)		
【後】	【危】	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(=シベノール)	③不整脈用剤	◎
【後】		ジメチコン錠40mg「YD」(=ガスコン)		
【後】		ジメチコン内用液2%「ホリイ」(=ガスコントロール)		
	【危】	ジャディアンス錠10mg	⑩糖尿病用剤	
	【危】	ジャヌビア錠50mg	⑩糖尿病用剤	◎
【後】		ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」(=ヘルベッサーR)		
【後】		シルニジピン錠10 (=アテック)		
【後】	【危】	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(=プレタル)	⑤血液凝固阻止剤	△
【後】		シロドシンOD錠4mg「DSEP」(=ユリーフ)		△
		スインブロイク錠0.2mg		※
【後】		スピロラクトン錠25mg(=アルダクソン)		○
【後】	【危】	スルピリド錠50mg「アメル」(=ドグマチール)	⑨精神神経用剤	◎
【後】	【危】	セルトラリン錠25mg「サワイ」(=ジェイゾロフト)	⑨精神神経用剤	
【後】		セレコキシブ錠100mg「ケミファ」(=セレコックス)		○
【後】		センノシド錠12mg「サワイ」(=プルゼント)		
【後】		ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(=マイスリー)		
		タケキャブ錠10mg		
【後】		タダラフィル錠5mgZA「シオエ」		◎
		タミフルカプセル75		◎
【後】		タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーフ」(=ハルナールD)		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
		ダラシカプセル150mg		
		タリージェ錠5mg		◎
		単シロップ		
		炭酸水素ナトリウム		
		タンニン酸アルブミン		
【後】		チアプリド錠25mg「JG」(＝グラマリール)		◎
【後】		チザニジン錠1mg「日医工」(＝テルネリン)		○
		チラーヂンS錠50μg		
		ツムラ牛車腎気丸(107)2.5g		
		ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)2.5g		
		ツムラ五苓散(17)2.5g		
		ツムラ呉茱萸湯(31)エキス顆粒2.5g		
		ツムラ十全大補湯(48)2.5g		
		ツムラ大建中湯(100)2.5g		
		ツムラ補中益気湯(41)2.5g		
		ツムラ抑肝散(54)エキス顆粒2.5g		
		ツムラ六君子湯(43)2.5g		
		ツムラ芍薬甘草湯(68)2.5g		
		ツムラ茵陈蒿湯(135)2.5g		
		デエビゴ錠5mg		
【後】	【危】	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	⑦テオフィリン製剤	
【後】		デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」		
【後】	【危】	デュロキセチンカプセル20mg「KMP」(＝サインバルタ)	⑨精神神経用剤	◎
【後】		テルミサルタン錠40mg(＝ミカルディス)		△
【後】		トアラセット配合錠「ケミファ」(＝トラムセット)		○
【後】		ドキサゾシン錠2mg「テバ」(＝カルデナリン)		
【後】		トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(＝ユベラン)		
【後】		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」(＝アリセプトD)		
【後】		ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(＝アリセプトD)		
【後】		ドパコール配合錠L100(＝ネオドパストン)		
【後】		トラセミド錠4mg「KO」(＝ルプラック)		△
	【危】	トラゼンタ錠5mg	⑩糖尿病用剤	
【後】	【危】	トラゾドン塩酸塩錠50mg(＝デジレル)	⑨精神神経用剤	
【後】		トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」(＝トランサミン)		○
		トラベルミン配合錠		
【後】		トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」(＝サムスカ)		
【後】		トルバブタンOD錠15mg「オーツカ」(＝サムスカ)		
		トレランG液75g 225ml		
【後】		ドンペリドン錠10mg「JG」(＝ナウゼリン)		
		ナゼアOD錠0.1mg		
		ナトリックス錠1		△
【後】		ニコランジル錠5mg「サワイ」(＝シグマート)		
【後】		ニトロペン舌下錠0.3mg		
【後】		ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(＝アダラートCR)		
【後】		ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」(＝アダラートCR)		
【後】		ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(＝アダラートカプセル)		
		乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末		
		乳糖		
		ノイロトロピン錠4単位		
	【危】	ノバミン錠5mg	⑨精神神経用剤	
【後】	【危】	バイアスピリン錠100mg	⑤血液凝固阻止剤	
		バクタ配合顆粒		◎

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】		バラシクロビル錠500mg（＝バルトレックス）		◎
【後】		バリエース発泡顆粒		
		バリブライトP		
【後】	【危】	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」（50mg/ml）（＝デパケン）	④抗てんかん剤	
	【危】	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」（＝デパケン）	④抗てんかん剤	
		パルモディアXR錠0.2mg		※◎
		バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」		○
【後】		パンテチン錠100mg「YD」		
		PL配合顆粒		
【後】	【危】	ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」（＝アクトス）	⑩糖尿病用剤	△
【後】		ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」10mL（＝ラキソベロン）		
	【危】	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg（＝メインテート）	③不整脈用剤	○
【後】	【危】	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」（＝メインテート）	③不整脈用剤	○
【後】		ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」（＝ピドキサル）		
【後】		ピモベンダン錠1.25mg「TE」（＝アカルディ）		
【後】	【危】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーフ」（＝サンリウム）	③不整脈用剤	◎
【後】	【危】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーフ」（＝サンリウム）	③不整脈用剤	◎
【後】		ファモチジンD錠20mg「EMEC」（＝ガスターD）		◎
		ファンギゾンシロップ100mg/ml		
【後】		フェブキソスタット錠10mg「サワイ」（＝フェブリカ）		
		フェリセルツ散20%		
	【危】	フォシーガ錠10mg	⑩糖尿病用剤	○
		フォリアミン錠5mg		
		ブスコパン錠10mg		
		フスタゾール糖衣錠10mg		
		フラジール内服錠250mg		○
【後】		ブラバスタチン錠10mg（＝マロチン）		△
		プリンペラン錠5		◎
		フルコナゾールカプセル100mg「アメル」（＝ジフルカン）		◎
【後】		フルスルチアミン錠25mg「トーフ」（＝アリナミンF）		
【後】	【危】	フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」（＝タンボール）	③不整脈用剤	△
【後】		プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」（＝リカ）		◎
【後】		プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」（＝リカ）		◎
	【危】（免疫の抑制）	プレドニゾン錠1mg（旭化成）	②免疫抑制剤	
	【危】（免疫の抑制）	プレドニン錠5mg	②免疫抑制剤	
【後】		フロセミド錠20mg（＝ラシックス）		△
【後】		プロチゾラム錠0.25mg（＝レンドルミン）		
		プロナーゼMS		
【後】	【危】	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」（＝プロノン）	③不整脈用剤	
【後】		プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーフ」（＝ピソルボン）		
		ベオーバ錠50mg		
		ベサコリン散5%（50mg/g）		
【後】		ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」（＝メスロン）		○
【後】	【危】（免疫の抑制）	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」（＝リンデロン）	②免疫抑制剤	
【後】	【危】	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	③不整脈用剤	
【後】	【危】	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」（＝ワソラン）	③不整脈用剤	△
【後】		ベラプロストNa錠20μg「トーフ」（＝ドルナー）		
		ベリキューボ錠2.5mg		
【後】		ベリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」（＝コバシル）		△
【後】	【危】	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」（＝ベイスンOD）	⑩糖尿病用剤	△
【後】		ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」（＝プロマック）		
【後】		ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」（＝アーガメイト）		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】	【危】	ホリナート錠25mg「サワイ」(＝ユーゼル)	①抗悪性腫瘍剤	
		ボルトラック原末(6g/包)		
		マグコロール散68%分包50g		
【後】		マグミット錠330mg		
【後】		ミドドリン塩酸塩錠2mg「NIG」(＝トリジン)		△
		ミノサイクリン塩酸塩錠100(＝ミノマイシンカプセル100mg)		
		ミヤBM細粒		
【後】	【危】	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(＝メキシール)	③不整脈用剤	△
【後】		メコバラミン錠500μg(＝メチコハール)		
		メチルドパ錠(ツルハラ)250		○
【後】	【危】	メトトレキサート錠2mg「タナヘ」(＝リウマトレックス)	②免疫抑制剤	◎
	【危】	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT	⑩糖尿病用剤	◎
【後】		メマンチン塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」(＝メマリー)		◎
		メルカゾール錠2.5mg		
		モサブリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」(＝カスモチン)		
		モビコール配合内用剤LD		
		モビブレップ配合内用剤		
【後】		モンテルカスト錠10mg(＝シングレア)		
		薬用炭(50g/本)		
	【危】	ユーエフティ配合カプセルT100mg	①抗悪性腫瘍剤	△
		ユービット錠100mg		
		ユリス錠1mg		※
		ラクツロースシロップ65%「NIG」		
		ラゲブリオカプセル200mg		
		ラコールNF配合経腸用液(400ml/バッグ)		
	【危】	ラニラピッド錠0.05mg	⑥ジギタリス製剤	◎
【後】		ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」(＝パリエット)		
【後】		ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(＝ロゼレム)		
【後】		ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」(＝タケプロンOD)		
	【危】	ランドセン錠0.5mg	⑨精神神経用剤	
	【危】	リクシアナOD錠15mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
	【危】	リクシアナOD錠30mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
【後】	【危】	リスペリドン内用液1mg/mL 0.1%(0.5mg/包)(＝リスパダール)	⑨精神神経用剤	◎
		リーバクト配合顆粒		
		リパクレオンカプセル150mg		
【後】	【危】	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	⑤血液凝固阻止剤	◎
【後】	【危】	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	⑤血液凝固阻止剤	◎
		リファンピシカプセル150mg		
【後】		リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」(＝オハルモン)		
	【危】	レキササルティOD錠0.5mg	⑨精神神経用剤	
【後】	【危】	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」(＝シュアポスト)	⑩糖尿病用剤	
		レバミピド錠100mg(＝ムコスタ錠100mg)		
【後】	【危】	レベチラセタム錠500mg「サワイ」(＝イクブラ)	④抗てんかん剤	◎
【後】		レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」(＝エルカルチン)		
【後】		レボフロキサシン錠500mg「陽進」(＝クレビット)		◎
【後】		ロキソプロフェン錠60mg(＝ロキソニン)		○
		ロケルマ懸濁用散分包5g		
【後】		ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」(＝クレストール)		○
		ロタテック内用液		
		ロタリックス内用液		
【後】		ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(＝ロペミン)		
	【危】	ワーファリン錠1mg	⑤血液凝固阻止剤	△

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬 薬効分類	腎
-----	---------------	------	----------------	---

腎：腎機能低下時の用量調節の重要度【◎:最重要, ○:重要, △:要注意】（「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」）

※:「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」に記載なし（添付文書より判断）

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬 薬効分類	腎
		亜鉛華軟膏		
		アズノール軟膏0.033%		
		アドエア125エアゾール120吸入		
		1%アトロピン点眼液5ml		
		アノーロエリプタ30吸入用		
		アルスロマチック関節手術用灌流液		
		アンヒバ坐薬100mg		
		アンヒバ坐薬200mg		
	【危】	イムノブラダー膀胱注用40mg	①抗悪性腫瘍剤	
		インターール吸入液1% 2ml		
		液化亜酸化窒素		
		エキザルベ軟膏5g		
		エコリシン眼軟膏 3.5g		
		エスサイド消毒液6%		
【後】		SPTローチ0.25mg「明治」		
		消毒用エタノール液		
【後】		エネマスター注腸散 350g		
【後】		エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 5mL		
		エンペシドクリーム1% 10g		
		オイラックスクリーム10%		
		オリブ油		
		オルセノン軟膏0.25% (30g)		
【後】		カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 5ml (=ミケラン)		
		キシロカインゼリー2% (30ml)		
【後】		8%キシロカインポンプスプレー80		
		4%キシロカイン液 20ml		
		吸水クリーム「ニッコー」		
		グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 50%		
		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL		
		グリセリン浣腸「オヲタ」150		
		グリセリンBC液「ヨシダ」		
		クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」250ml		
【後】		ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」7枚/袋 (=モーラス)		
		ゲーベッククリーム1%		
		ゲンタシン軟膏0.1% 10g		
		1%サイプレジン点眼液10ml		
		酸素		
		サンピロ点眼液2% 5ml		
		次亜塩0.05%液「ヨシダ」		
		次亜塩0.1%液「ヨシダ」		
【後】		シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5ml (=サンコハ)		
【後】		ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼリア」 (=ホルタレン)		
【後】		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」 (=ホルタレン)		
【後】		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 (=ホルタレン)		
		シムビコートタービューヘイラー60吸入		
【後】		硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 (=フランドルテープ)		
		スコピゾル眼科用液		
		スチックゼノールA40g		
		ステリクロンWエタノール液0.5		
		スピール膏M絆創膏25cm ²		
		スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 (150μg)		
		セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 (=セボフレノ)		
		ゾピラックス眼軟膏3% 5g		

		ソフラチュール貼付剤 10cm		
		ダイアップ坐剤6mg		
		タコシール組織接着用シート(4.8cm×4.8cm)		
		タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm)		
		デアミトール消毒用液50W/V%		
【後】		ツロブテロールテープ2mg「久光」(＝ホクナリンテープ)		
		デイスオーパ消毒液0.55%		
【後】		デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%5g「日医工」(＝アフタゾロン)		
		テレミンソフト坐剤10mg		
		トロンビン液ソフトボトル 1万/本10ml		
【後】		ドンペリドン坐剤10mg「日新」(＝ナウゼリン)		
【後】		ドンペリドン坐剤30mg「日新」(＝ナウゼリン)		
		ナウゼリン坐剤60mg		
		二酸化炭素		
【後】		尿素クリーム10%「SUN」 20g (＝ウレパール)		
		5%ネオシネジン点眼液10ml		
【後】		ネグミンシュガー軟膏 (＝ユーパスタ)		
		含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1% 2g		
【後】		ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 5mL (＝ヒアレイン)		
	【危】	ビソノテープ2mg	③不整脈用剤	○
	【危】	ビソノテープ4mg	③不整脈用剤	○
【後】		ビダラビン軟膏3%「SW」5g (＝アラセナ)		
		ヒビスコール液A1%		
【後】		ピレノキシリン懸濁性点眼液0.005%(5ml) (＝カリユニ)		
		フィブラストスプレー500μg		
【後】		フェルビナクパップ70mg「ユートク」(10cm×14cm) 7枚/袋 (＝セルタッチ)		
【後】		フェルビナクローション3%「ラクール」 100mL (＝ナバゲルン)		
		(麻)フェントステープ0.5mg (＝フェントス)		
【後】		(麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」(＝フェントス)		
【後】		(麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」(＝フェントス)		
		プリピナ液0.05%		
【後】		フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」 5mL (＝フルメロン)		
【後】		フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用(＝フルナーゼ)		
		フルミスト点鼻液		
		フローレス眼検査用試験紙0.7mg		
		プロスタンディン軟膏0.003%(30g)		
		プロベト		
【後】		ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 5ml (＝フロナック)		
【後】		ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% (＝ビソルボン)		
		ブロメライン軟膏5万単位/g (ジイドルフ) 20g		
		ベネトリン吸入液0.5% 30ml		
		0.4%ベノキシール眼科用液5ml		
【後】		ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 25g (＝ヒルトイト)		
【後】		ヘモポリゾン軟膏		
		ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL		
		ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 30mL (＝イソジンガーグル)		
【後】		ポビドン液10% (＝イソジン液)		
		ボラザG坐剤		
		ボラザG軟膏 2.4g		
		マイザー軟膏0.05% 5g		
		マクロゴール軟膏「ヨンダ」		
		マスキンスクラブ4%		
		ミオコールスプレー0.3mg(0.65% 7.2g)		
		ミドリンM点眼液0.4%(5ml)		
		ミドリンP点眼液10ml		

		メプチンエアー10 μ g吸入100回 0.0143% (5ml)		
		メプチン吸入液ユニット0.3mL		
		ヨウ化カリウム		
		ヨウ素		
【後】		ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 2.5ml (=キサラン)		
		ラミシール外用液1% 10g		
【後】		リドカインテープ18mg「YP」 (=ペンシル)		
【後】		リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」 (=リバスタッチ)		
【後】		リバスチグミンテープ9mg「DSEP」 (=リバスタッチ)		
【後】		リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」 (=リバスタッチ)		
【後】		リバスチグミンテープ18mg「DSEP」 (=リバスタッチ)		
		リレンザ 5mg(4ブリスター/枚)		
		点眼・点鼻用リンデロンA液		
		眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g		
		リンデロン-V軟膏 0.12% 5g		
【後】		レボフロキサシン点眼液1.5%「ニットー」 5ml (=クラビット)		
		レルペア100エリプタ14吸入用		
		ロコイド軟膏0.1% 10g		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		アクトヒブ		
		アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」(=ゾビラックス)		◎
【後】		アスコルビン酸注500mgPB「日新」		△
		アセリオ静注液1000mgバッグ		○
	【危】	アタラックス-P注射液(25mg/ml) 2.5%1ml	⑨精神神経用剤	
		アデホス-Lコーワ注20mg		
		アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL		
【後】		アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL		○
		アナペイン注2mg/ml 0.2%100ml		
		アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL		
		アネメトロ点滴静注液500mg		○
	【危】	アブラキサン点滴静注用100mg	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	アミオダロン塩酸塩静注150 150mg/3ml (=アンカロン)	③不整脈用剤	
		アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」		◎
		アミノレバン点滴静注 200ml		
		アミパレン輸液 200mL		
【後】		アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL (=スロンソHI)		
		献血アルブミン5%静注 250mL		
		献血アルブミン25%静注 12.5g/50ml「JB」		
【後】		アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」(=リファル)		
		EOB・プリモピスト注シリンジ 18.143%10mL1筒		
		イオパミドール300注20mL「F」(=イオパミロン)		◎
		イオパミロン注300シリンジ 61.24%80mL1筒		◎
		イオパミロン注370 75.52%100mL1瓶		◎
		イオパミロン注370 75.52%50mL1瓶		◎
		イオパミロン注370シリンジ 75.52%100mL1筒		◎
		イソゾール注射用0.5g		
		イソピスト注240		◎
【後】		イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」		◎
		イベニティ皮下注105mgシリンジ		
		イミフィンジ点滴静注500mg	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」2mL (=トボテン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」5mL (=トボテン)	①抗悪性腫瘍剤	
		インジゴカルミン静注20mg0.4%5ml		
【後】	【危】	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」(=ノボラピッド注フレクスタッチ)	⑪膵臓ホルモン剤	
【後】	【危】	インスリングルガリンBS注ミリオペン「リリー」(=ランタス注ソロスター)	⑪膵臓ホルモン剤	
【後】	【危】	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」(=ヒューマログ注ミリオペン)	⑪膵臓ホルモン剤	
		インデラル注射液2mg 0.1%2ml		
		イントラリポス輸液20% 100ml		
		インフルエンザHAワクチン (ビケンHA)		
		インフルエンザHAワクチンシリンジ 0.5mL (フルービックHAシリンジ)		
		ウログラフィン注60% 20mL1管		◎
【後】		エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」(=ラジカット)		
		NaCl注10% 20ml		
		エナルモンデポー筋注250mg		
		エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg 1mL		
【後】	【危】	エピルピシン注射液10mg/5mL (=ファルモルピシン)	①抗悪性腫瘍剤	
		エホチール注10mg 1%1ml		
【後】		エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	①抗悪性腫瘍剤	△

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬 薬効分類	腎
		エルネオパNF1号輸液 1000ml		
		エルネオパNF1号輸液 1500ml		
		エルネオパNF2号輸液 1000ml		
		エルネオパNF2号輸液 1500ml		
	【危】	エルプラット点滴静注液100mg 20ml	①抗悪性腫瘍剤	△
	【危】	エルプラット点滴静注液50mg 10ml	①抗悪性腫瘍剤	△
【後】		エレジェクト注シリンジ		
【後】		オクトレオチド皮下注100μg「あすか」(＝サントスタチン)		△
【後】		オザグレルNa点滴静注80mg/バッグ「タカタ」200mL (＝カタロット)		○
		おたふくかぜワクチン		
	【危】	オニバイド点滴静注43mg	①抗悪性腫瘍剤	
		オビソート注射用0.1g 100mg(溶解液付)		
	【危】	オブジーボ点滴静注120mg	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	オブジーボ点滴静注240mg	①抗悪性腫瘍剤	
		オムニパーク300注シリンジ100mL		◎
		オムニパーク300注シリンジ125mL		◎
		オメプラゾール注射用20mg (＝オメプラール)		
		ガベキサートメシル酸塩注射用100mg (＝エフォーワイ)		
【後】		ガベキサートメシル酸塩注射用500mg (＝エフォーワイ)		
		カルチコール注射液8.5%5ml		
【後】		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg(＝アドナ注)		△
【後】	【危】	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(＝パラプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】	【危】	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(＝パラプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
	【危】	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(＝パラプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
		ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケダ」		
【後】		カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(＝ソルダクソ)		○
		キシロカイン注ポリアンブ1% 10ml		
		キシロカイン注ポリアンブ2% 5ml		
		キシロカイン注射液「1%」Eヒレナミン		
		強力ネオミノファーゲンシー静注20ml		
【後】		グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」		
		クリアクター静注用80万国単位		
		グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200ml (＝グリセオール)		△
		クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」(＝ダラシン)		
【後】		グルカゴン注射用1単位「ILS」(溶解液付)		
		クレキサン皮下注キット2000IU (0.2ml)		◎
		献血グロベニン-I静注用2500mg/50ml		
【後】	【危】	KCL注20mEqキット「テルモ」1モル20ml	⑧カリウム製剤	◎
		KN3号輸液 200ml		○
		KN3号輸液 500ml		○
		KNMG3号輸液 500ml		○
		ケイツーN静注10mg		
		ケナコルトーA筋注用関節腔内用水性懸濁注40mg/1mL		
	【危】	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(＝ジエムザール)	①抗悪性腫瘍剤	△
	【危】	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(＝ジエムザール)	①抗悪性腫瘍剤	△
		ゲンタシン注60mg		◎
		ゴービック水性懸濁注シリンジ		
		コアベータ静注用12.5mg		
		ゴナックス皮下注用 80mg		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		ゴナックス皮下注用 120mg		
		ゴナックス皮下注用 240mg		
		コミナティ筋注シリンジ12歳以上用		
	【危】	サイラムザ点滴静注液100mg	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	サイラムザ点滴静注液500mg	①抗悪性腫瘍剤	
		サブラッド血液ろ過用補充液BSG 1010ml		
		サムタス点滴静注用8mg		
	【危】	サンリズム注射液50mg 5ml	③不整脈用剤	◎
		ジアグノグリーン注射用 25mg(溶解液付)		
		ジアゼパム注射液5mg「NIG」		△
	【危】	ジェブタナ点滴静注60mg	①抗悪性腫瘍剤	
		ジオン注無痛化剤付		
	【危】	ジギラノゲン注0.4mg 0.02%2ml	⑥ジギタリス製剤	◎
		シグマート注12mg		
	【危】	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL (=ランダ)	①抗悪性腫瘍剤	◎
	【危】	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL (=ランダ)	①抗悪性腫瘍剤	◎
		ジスロマック点滴静注用500mg		
【後】		ジノプロスト注射液1000μg「F」(1mg1ml)		
	【危】	シペノール静注70mg (70mg5ml)	③不整脈用剤	◎
【後】		シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(=エラスポール)		
		シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		
		シングリックス筋注用		
	【危】	シンビット静注用50mg	③不整脈用剤	
		水痘ワクチン		
【後】		スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」		
		スルバシリン静注用3g (=ユナシン)		○
		スルペラゾン静注用1g		
		生理食塩注 20ml		
		生理食塩注 50ml		
		生理食塩注 100ml		
		生理食塩注TK 100ml ★キット		
		生理食塩注 250ml		
		生理食塩注 500ml		
		生食注 洗浄用(500ml)		
		生理食塩注 1L(ソフトバッグ)		
		生理食塩注 1L(プラボトル)		
		生理食塩注 2L(ソフトバッグ)		
		セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」		○
		セファランチン注10mg 0.5%2ml		
【後】		セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(=マキシピーム)		○
		セフタジジム静注用1g「VTRS」(=モダシン)		○
		セフトリアキソンNa静注用1g「日医工」(=ロセフィン)		△
		セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g		○
	【危】	セレネース注5mg 0.5%1ml	⑨精神神経用剤	
		ソセゴン注射液15mg		
		ソル・コーテフ静注用100mg(溶解液付)		
		ソル・メドロール静注用125mg(溶解液付)		
		ソル・メドロール静注用500mg(溶解液付)		
		ソルデム1輸液 200ml		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		ソルデム1輸液 500ml		
【後】		ゾレドロン酸点滴静注用4mg 100ml (＝ゾメタ)		◎
		ダイアモックス注射用500mg		◎
【後】		タゾピペ配合静注 4. 5 (＝ゾシン)		△
【後】		ダルベポエチンアルファBS注30 μ gシリンジ「三和」(＝ネスフ)		
【後】		ダルベポエチンアルファBS注60 μ gシリンジ「三和」(＝ネスフ)		
		ダントリウム静注用20mg		
		注射用水 20ml		
		注射用水 500ml (細口開栓・プラボトル)		
【後】		テイコプラニン点滴静注用400mg「トーフ」		◎
		1%ディプリバン注キット500mg 50mL		
【後】		デキサート注射液1. 65mg		
【後】		デキサート注射液6. 6mg		
【後】		デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」(＝フレセデックス)		
		テタノブリンIH静注1500単位		
		テタノブリン筋注用250単位		
		デトキソール静注液2g		
【後】		テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」(＝フォルテオ)		△
		テリボン皮下注用56. 5 μ g		
【後】	【危】	ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(＝アドリアシン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(＝アドリアシン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	①抗悪性腫瘍剤	
		ドパストン静注50mg		
【後】		ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「NIG」 200mL		
【後】		ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」		
【後】	【危】	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	①抗悪性腫瘍剤	
		トランサミン注250mg 5% 5ml		○
		ドルミカム注射液10mg 2ml		
	【危】	トレシーバ注フレックスタッチ	⑪膵臓ホルモン剤	
		ドロレプタン注射液25mg		
		ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」(＝フサン)		
		ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」(＝フサン)		
		ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」1mL		
【後】		ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」2ml (＝ヘルシベン)		△
【後】		ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」(＝シグマート)		
		二種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風混合トキソイド) DTビック「田辺三菱」		
		ニトロール注5mg 0. 05%10ml		
		ニトロール点滴静注50mg/バッグ 100ml(0.05%)		
		日本脳炎ワクチン(ジェービックV)		
		ネオアミュー輸液 200ml		
		ネオシネジンコーワ注1mg		
		ネオビタカイン注シリンジ 5ml		
	【危】	ネオフィリン注250mg/10ml (2. 5%)	⑦テオフィリン製剤	
		ノイトロジン注100 μ g		
	【危】	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	⑪膵臓ホルモン剤	
	【危】	ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	⑪膵臓ホルモン剤	
		ノルアドリナリン注1mg 0. 1%1ml		△

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬 薬効分類	腎
		ノンスロン1500注射用〔献血〕 1, 500単位		
		肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNPシリンジ 0. 5ml)		
		ハイカリックRF輸液 500ml		
【後】	【危】	パクリタキセル注射液100mg 16.7ml (=タキソール)	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	パクリタキセル注射液30mg 5ml (=タキソール)	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	パージェタ点滴静注420mg/14mL	①抗悪性腫瘍剤	
		沈降破傷風トキソイド「生研」		
		ハプトグロビン静注2000単位「JB」100ml		
		バル筋注100mg「AFP」		
		パレプラス輸液 500mL		
【後】		パロノセトロン静注0. 75mg/5mL「タイホウ」 (=アロキシ)		△
		バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「明治」		◎
		パントシン注5% 100mg		
		ハンプ注射用1000 μ g		○
【後】		ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」		
		ピクシリン注射用 1g		○
		BCGワクチン		
	【危】	ピシバニール注射用5KE	①抗悪性腫瘍剤	
		ピタジェクト注キット		
		ピタメジン静注用		
		ピトレシン注射液20 20単位		
		ピペラシリンNa注射用2g「テバ」 (=ペントシリン)		○
	【危】	ヒューマリンR注 100単位/ml	⑪膵臓ホルモン剤	
		ビリスコピン点滴静注50		
	【危】	5-FU注1000mg	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		ファモチジン静注液20mg「サワイ」 20mL		◎
		フィジオ140輸液 500ml		
		フェインジェクト静注500mg 10mL		
		フェジン静注40mg 2ml		
【後】		(麻)フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」 2mL		
		ブスコパン注射液20mg 2%1ml		
		ブドウ糖注 5% 20ml		
		ブドウ糖注 5% 50ml		
		ブドウ糖注 5% 100ml		
		ブドウ糖注 5% 250ml		
		ブドウ糖注 5% 500ml		
		ブドウ糖注10% 500ml		
		ブドウ糖注50% 20ml		
		ブドウ糖注50% 200ml		
		ブドウ糖注 70% 350mL		
		ブラリア皮下注60mgシリンジ		◎
【後】		フルオレサイト静注500mg 10%5ml		
【後】		フルマゼニル注射液0. 5mg「ニプロ」 5ml (=アネキセト)		
		プレドニン10mg〔水溶性〕		
		プレベナー20水性懸濁注		
		プロジフ静注液200mg 8%2. 5ml		◎
【後】		フロセミド注20mg「NIG」 (=ラシックス)		△
		プロタノールL注0.2mg 0. 02%1ml		
		プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 10mL		

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬 薬効分類	腎
		プロハンス静注シリンジ13mL		
		プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」(＝デ「リハ」)		
		プロボフォール静注1%50mL「マルイシ」(＝デ「リハ」)		
【後】		ブロムヘキシソルム塩酸塩注射液4mg 0.2%2ml (＝「ソルホ」)		
	【危】	ベクティビックス点滴静注100mg 5mL	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」		
		ベクルリー点滴静注用		
		(麻)ペチジン塩酸塩注射液 35mg 1ml		
		ペニシリンGカリウム100万単位[注射用]		○
【後】	【危】	ペバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」(＝「アバ」)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ペバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」(＝「アバ」)	①抗悪性腫瘍剤	
		ヘパリンNaロック用シリンジ100単位/ml 10ml		
		ヘパリンNa注1万単位/10ml		
		ヘパリンNa注5千単位/5ml		
【後】		ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		
		ヘブスプリン－IH静注1,000単位 5ml		
		ヘプタバックス－II水性懸濁注シリンジ0.25mL		
		ヘプタバックス－II水性懸濁注シリンジ0.5mL		
【後】	【危】	ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】	【危】	ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」	①抗悪性腫瘍剤	◎
		ペルジピン注射液10mg 10ml		
【後】		ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」		
		ホスホマイシンNa静注用2g「NP」(＝「ホス」)		○
		ボスミン注1mg 0.1%1ml		
		ボトックス注用100単位		
		ポララミン注 5mg (1ml)		
		ボルベン輸液6% 500ml		◎
		マーカイン注脊麻用0.5%高比重		
		マーカイン注脊麻用0.5%等比重		
		マキュエイド眼注用40mg		
		マグネゾール20ml[静注用]		
		乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」		
【後】		ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(＝「ファン」)		
		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(＝「ミ」)		
		ミルセラ注シリンジ100μg		
		ミールビック(乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン)		
【後】		ミルリノン注22.5mg/バッグ「タカタ」150ml (＝「ミ」)		◎
		メイロン静注7% 20ml		
		メイロン静注7% 250ml		
【後】		メコバラミン注500μg「NP」		
【後】		塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」2ml		◎
【後】		メロペネム点滴静注用1g「明治」		○
		(麻)モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」1mL		○
		(麻)モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」5mL		○
		ラクテックD輸液 500ml		
		ラクテック注 500ml		
		ラピアクタ点滴用バッグ300mg (60ml)		◎
【後】	【危】	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	③不整脈用剤	
		ランマーク皮下注120mg		◎

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		リクラスト点滴静注液5mg		
		リコモジュリン点滴静注用12800		◎
【後】	【危】	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 5ml	③不整脈用剤	
【後】	【危】	リドカイン点滴静注液1% 200ml	③不整脈用剤	
【後】		リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 300ml (=ザイボックス)		○
		リュープリンPRO注射用キット22. 5mg		
		リンデロン注4mg(0. 4%)		
【後】	【危】	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	④抗てんかん剤	○
【後】		レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」(=クラビット)		◎
		レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」		
		レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」		
		レミケード点滴静注用100mg		
【後】		(麻)レミフェンタニル静注用2mg (=アルチバ)		
【後】		ロクロニウム臭化物静注液 50mg 1mL (=エスラックス)		○
		ロピオン静注50mg 5ml		○
	【危】	ワソラン静注用5mg 0. 25%2ml	③不整脈用剤	

腎：腎機能低下時の用量調節の重要度【◎：最重要，○：重要，△：要注意】（「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」）

※：「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」に記載なし（添付文書より判断）