



使い方  
目的のセルをクリックするとリンクしています。

50音順索引 内用薬

50音順索引 外用薬

50音順索引 注射薬

## 薬効別索引

### 1- 神経系及び感覚器官用医薬品

11- 中枢神経系用薬

12- 末梢神経用薬

13- 感覚器官用薬

131- 眼科用剤

### 2- 個々の器官系用医薬品

21- 循環器官用薬

22- 呼吸器官用薬

23- 消化器官用薬

24- ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)

25- 泌尿生殖器官及び肛門用薬

26- 外皮用薬

264- 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤

### 3- 代謝性医薬品

31- ビタミン剤

32- 滋養強壮薬

325- たんぱくアミノ酸製剤 (経管栄養を含む)

33- 血液・体液用薬

331- 血液代用剤 (輸液剤)

39- その他の代謝性医薬品

396- 糖尿病用剤

### 4- 組織細胞機能用医薬品

42- 腫瘍用薬

44- アレルギー用薬

### 5- 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

### 6- 病原生物に対する医薬品

61- 抗生物質製剤

62- 化学療法剤

63- 生物学的製剤

### 7- 治療を主目的としない医薬品

721- X線造影剤

### 8- 麻薬

目次にもとず		
薬効	限定	【後】
採用薬品（院内・院外共通）		限定：必要時購入
		規格
<b>1- 神経系及び感覚器用医薬品</b>		
<b>11- 中枢神経系用薬</b>		
<b>111 全身麻酔剤</b>		
1115	<b>溶性バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤</b>	
	0.5g イソゾール	500mg 1管（溶解液付）
1116	<b>亜酸化窒素製剤</b>	
	液化亜酸化窒素	1g
1119	<b>その他の全身麻酔剤</b>	
	プロポフォール静注1%20mL「マルイ」（=デブリアン）	200mg 20mL 1管
	プロポフォール静注1%50mL「マルイ」（=デブリアン）	500mg 50mL 1瓶
	1%ディプリバン注キット500mg	500mg 50mL 1キット
	セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	250mL
	ドロレプタン注射液25mg	10mL
<b>112 催眠鎮静剤，抗不安剤</b>		
1124	<b>ベンゾジアゼピン系製剤</b>	
	【後】プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」（=レドルミン）	0.25mg 1錠
	【後】ジアゼパム錠2「サワイ」（=セリソ）	2mg 1錠
	ジアゼパム注射液5mg「NIG」	5mg 1管
	ドルミカム注射液10mg 2ml	10mg 2mL 1管
	ダイアアップ坐剤6	6mg 1個
1129	<b>その他の催眠鎮静剤，抗不安剤</b>	
	【後】デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」（=プレセックス）	50mL 1筒
	【後】ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」（=マイスリー）	5mg 1錠
	【後】エスゾピクロン錠1mg「ケミア」（=ルネスタ）	1mg 1錠
<b>113 抗てんかん剤</b>		
1139	<b>その他の抗てんかん剤</b>	
	【後】レベチラセタム錠500mg「サワイ」（=イーケブラ）	500mg 1錠
	【後】レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	500mg
	【後】カルバマゼピン錠200mg「ワジカ」（=テグレート）	200mg 1錠
	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	200mg 1錠
	【後】バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	5% 120mL
	ランドセン錠0.5mg	0.5mg 1錠
<b>114 解熱鎮痛消炎剤</b>		
1141	<b>アニリン系製剤</b>	
	アセリオ静注液1000mg バッグ	1000mg 100mL
	【後】カロナール錠500	500mg 1錠
	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg 1個
	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg 1個
1147	<b>フェニル酢酸系製剤</b>	
	【後】ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg（=ボルタレン坐）	12.5mg 1個
	【後】ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg（=ボルタレン坐）	25mg 1個
	【後】ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg（=ボルタレン坐）	50mg 1個
1149	<b>その他の解熱鎮痛消炎剤</b>	
	<b>プロピオン酸系</b>	
	【後】ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」（=ロキソニン）	60mg 1錠
	ロビオン静注50mg	50mg 5mL 1管
	<b>オキシカム系</b>	
	<b>COX2阻害薬</b>	
	【後】セレコキシブ錠100mg「ケミア」（=セレコクス）	100mg 1錠
	<b>その他</b>	
	ノイロトロピン錠4単位	4単位 1錠
	ネオビタカイン注シリンジ 5mL	5mL 1筒
	<b>非麻薬性鎮痛薬</b>	
	ソセゴン注射液15mg	15mg 1管

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	【後】	トアラセット配合錠「ケミア」（＝トアラセット）	1錠
<b>116 抗パーキンソン剤</b>			
1161		<b>アマンタジン製剤</b>	
	【後】	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」（＝シムトレル）	50mg 1錠
1169		<b>その他の抗パーキンソン剤</b>	
		<b>抗コリン薬</b>	
		<b>ドパミン受容体刺激薬（麦角アルカロイド）</b>	
	トロンピン液77 <sup>ホク</sup> ト	<b>ドパミン受容体刺激薬（非麦角系）</b>	
		<b>ノルアドリナリン系</b>	
		<b>レボドパ類</b>	
		ドパストン静注50mg	50mg 20mL
	【後】	ドパコール配合錠L100	1錠
<b>117 精神神経用剤</b>			
1172		<b>フェノチアジン系製剤</b>	
		ノバミン錠5mg	5mg 1錠
1179		<b>その他の精神神経用剤</b>	
		<b>ブチロフェノン類</b>	
		セレネース注5mg 1ml	0.5% 1mL 1管
		<b>抗うつ薬</b>	
		<b>三環系</b>	
		<b>四環系</b>	
		<b>選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)</b>	
	【後】	セルトラリン錠25mg「サワイ」（＝ジエイブ <sup>®</sup> 07）	25mg 1錠
		<b>セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)</b>	
	【後】	デュロキセチンカプセル20mg「KMP」（＝サインバルタ）	20mg 1cp
		<b>ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)</b>	
		<b>5HT3受容体拮抗薬</b>	
	【後】	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」（＝デジ <sup>®</sup> レル）	50mg 1錠
		<b>非定型抗精神病薬</b>	
	【後】	リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」0.1%（0.5mg/包）（＝リスバ <sup>®</sup> タール）	
	【後】	クエチアピン錠25mg「日新」（＝セロケル）	25mg 1錠
	【後】	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	3mg 1錠
		レキササルティOD錠0.5mg	0.5mg 1錠
		<b>チエノジアゼピン類</b>	
	【後】	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」（＝リゼ <sup>®</sup> ）	5mg 1錠
	【後】	エチゾラム錠0.5mg「トウ」（＝デ <sup>®</sup> パス）	0.5mg 1錠
		<b>その他</b>	
		アタラックスP注射液（25mg/mL）	2.5% 1mL 1管
<b>118 総合感冒剤</b>			
1180		<b>総合感冒剤</b>	
		PL配合顆粒	1g 1包
<b>119 その他の中枢神経系用薬</b>			
1190		<b>その他の中枢神経系用薬</b>	
	【後】	チアプリド錠25mg「JG」（＝ケ <sup>®</sup> ラマリール）	25mg 1錠
		<b>帯状疱疹後神経痛治療剤</b>	
	【後】	プレガバリンOD錠25mg「サワイ」	25mg 1錠
	【後】	プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」	75mg 1錠
		タリージェ錠5mg	5mg 1錠
		<b>認知症用薬</b>	
	【後】	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」（＝アリセ <sup>®</sup> 7D）	3mg 1錠
	【後】	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」（＝アリセ <sup>®</sup> 7D）	5mg 1錠
	【後】	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」（＝マリ <sup>®</sup> ）	10mg 1錠
	【後】	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	4.5mg
	【後】	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	9mg
	【後】	リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	13.5mg

薬効 限定	【後】 採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
	【後】 リバステグミンテープ18mg「DSEP」	18mg
	<b>脊髄小脳変性症治療剤</b>	
	<b>メラトニン受容体アゴニスト</b>	
	【後】 ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg1錠
	<b>オレキシン受容体拮抗薬</b>	
	デエビゴ錠5mg	5mg1錠
	<b>抗活性酸素薬</b>	
	【後】 エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 (=ラジカット)	30mg100mL1キット
	<b>経口そう痒症改善剤</b>	
<b>12-末梢神経用薬</b>		
<b>121 局所麻酔剤</b>		
1214	<b>キシリジン系製剤</b>	
	キシロカインビスカス2% 100mL	100mL1本
	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000) 1%20mLバイアル	1%20mLバイアル
	キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL	1%10mL
	キシロカイン注ポリアンプ2% 5mL	2%5mL
	アナペイン注7.5mg/mL 0.75% 20mL	20mL1管
	アナペイン注2mg/mL 0.2% 100mL	100mL1バッグ
	キシロカインゼリー2% 30mL	2%30mL
	キシロカイン液「4%」 20mL	4%20mL
	【後】 キシロカインポンプスプレー8%	80g
	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL
	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL
	【後】 リドカインテープ18mg「YP」 (=ペニス)	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
1219	<b>その他の局所麻酔剤</b>	
<b>122 骨格筋弛緩剤</b>		
1229	<b>その他の骨格筋弛緩剤</b>	
	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶
	ボトックス注用100単位	100単位1瓶
	<b>非脱分極性麻酔用筋弛緩剤</b>	
	【後】 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」(=エスラックス)	50mg5mL1瓶
<b>123 自律神経剤</b>		
1231	<b>四級アンモニウム塩製剤</b>	
	ベサコリン散5%	5%
	ウブレチド錠5mg	5mg1錠
1232	<b>アセチルコリン系製剤</b>	
	オビソート注射用0.1g	100mg1管(溶解液2mL付)
<b>124 鎮痙剤</b>		
1242	<b>アトロピン系製剤</b>	
	ブスコパン錠10mg	10mg1錠
	ブスコパン注20mg 1mL	2%1mL1管
	【後】 アトロピン注0.05%シリンジ「テル」 1mL	0.05%1mL1管
1244	<b>マグネシウム塩製剤</b>	
	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	0.5モル20mL1管
1249	<b>その他の鎮痙剤</b>	
	<b>中枢性筋弛緩薬</b>	
	【後】 チザニジン錠1mg「日医工」 (=テルネリ)	1mg1錠
<b>13-感覚器官用薬</b>		
<b>131 眼科用剤</b>		
1311	<b>散瞳剤</b>	
	サイブレジン1%点眼液 10mL	1%10mL
	ネオシネジンコーワ5%点眼液 10mL	5%10mL
	ミドリンM点眼液0.4% 5mL	0.4%5mL
	ミドリンP点眼液 10mL	10mL
	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶

薬効 限定 【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
1312	<b>縮瞳剤</b> サンピロ点眼液2%	2%5mL1瓶
1313	<b>眼科用局所麻酔剤</b> ベノキシール点眼液0.4%	0.4%20mL
1315	<b>眼科用コルチゾン製剤</b> 【後】フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」(=フルトロン)	0.1%5mL
1319	<b>その他の眼科用剤</b> <b>眼科・耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤</b> 眼・耳科用リンデロンA軟膏 点眼・点鼻用リンデロンA液 <b>緑内障用薬</b> <b>β-遮断剤</b> 【後】カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(=ミケラン) <b>α1β1β2遮断薬</b> <b>α2受容体作動薬</b> <b>炭酸脱水酵素阻害剤</b> <b>炭酸脱水酵素阻害剤・β-遮断剤配合剤</b> <b>プロスタグランジン系</b> 【後】ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」(=キサラン) <b>α1遮断薬</b> <b>Rhoキナーゼ阻害薬</b> <b>白内障用薬</b> 【後】ピレノキシン懸濁性点眼液0.005% <b>眼科手術用薬</b> マキュエイド眼注用40mg <b>非ステロイド性消炎鎮痛薬</b> 【後】ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニト-」(=プロナック) <b>眼科用消炎薬</b> 【後】エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「わかもと」 <b>眼科用抗菌薬</b> 【後】レボフロキサシン点眼液1.5%「ニト-」(=クラビット) エコリシン眼軟膏 <b>抗ヘルペス薬</b> ゾビラックス眼軟膏3% <b>涙液補充薬</b> 【後】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニト-」(=ヒアレイン) <b>その他</b> 【後】シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」(=サンコハ) スコビゾル眼科用液	5g 5mL 2%2.5mL 0.005%2.5mL 40mg1瓶 0.1%5mL 0.05%5mL 0.5%5mL 3.5g 3%5g 0.1%5mL1瓶 0.02%5mL1瓶
132	<b>耳鼻科用剤</b>	
1324	<b>耳鼻科用血管収縮剤</b> プリピナ液0.05%	0.05%
1329	<b>その他の耳鼻科用剤</b> 【後】フルチゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用(=フルナーゼ*)	4.08mg8mL1瓶
133	<b>鎮痛剤</b>	
1339	<b>その他の鎮痛剤</b> 【後】ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(=セファドール) 【後】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」(=メリスロ) トラベルミン配合錠	25mg1錠 6mg1錠 1錠
<b>2- 個々の器官系用医薬品</b>		
<b>21- 循環器官用薬</b>		
<b>211 強心剤</b>		
2113	<b>ジギタリス製剤</b> ラニラピッド錠0.05mg ジギラノゲン注0.4mg	0.1mg1錠 0.02%2mL1管
2115	<b>カフェイン系製剤</b>	

薬効 限定	【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
		ネオフィリン注PL250mg	2.5%10mL1管
2119		<b>その他の強心剤</b>	
		<b>交感神経刺激薬 (カテコールアミン類)</b>	
		<b>α・β刺激薬</b>	
	【後】	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	0.3%200mL1袋
	【後】	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	0.3%50mL1筒
		エホチール注10mg	1%1mL1管
		エフェドリン「ナガサ」注射液	40mg1mL1管
		<b>β刺激薬</b>	
		プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管
		<b>ホスホジエステラーゼ(PDEⅢ)阻害薬</b>	
	【後】	ピモバンダン錠1.25mg「TE」(=アカルディ)	1.25mg1錠
	【後】	ミルリノン注22.5mgバッグ「タカタ」(=ミルリ-ラK)	22.5mg150mL1袋
<b>212 不整脈用剤</b>			
2123		<b>β遮断剤</b>	
	【後】	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」(=メインテト)	2.5mg1錠
		ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」(=メインテト)	0.625mg
		インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管
	【後】	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	150mg1瓶
		コアベータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶
		<b>α・β遮断薬</b>	
	【後】	アロチノロール塩酸塩10mg錠「サワイ」	10mg1錠
2129		<b>その他の不整脈用剤</b>	
		<b>I群 Naチャンネル抑制薬</b>	
		<b>Ia群 活動電位持続時間延長</b>	
	【後】	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(=シベンノール)	100mg1錠
		シベンノール静注70mg	70mg5mL1管
		<b>Ib群 活動電位持続時間短縮</b>	
	【後】	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(=メキシチール)	50mg1カプセル
	【後】	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒
	【後】	リドカイン点滴静注液1% 200mL	1%200mL1袋
		<b>Ic群 活動電位持続時間不変</b>	
	【後】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トワ」(=サンリズム)	25mg1カプセル
	【後】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トワ」(=サンリズム)	50mg1カプセル
		サンリズム注射液50 5mL	50mg5mL1管
	【後】	フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」(=タンボール)	50mg1錠
	【後】	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」(=プロノン)	150mg1錠
		<b>Ⅲ群 Kチャンネル抑制</b>	
	【後】	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	50mg1錠
	【後】	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg3mL1管
		シンビット静注用50mg	50mg1瓶
		<b>Ⅳ群 Ca拮抗薬</b>	
		ワソラン静注5mg	0.25%2mL1管
	【後】	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg1錠
<b>213 利尿剤</b>			
2133		<b>抗アルドステロン製剤</b>	
	【後】	スピロラクトン錠25mg「NP」(=アルダクトン)	25mg1錠
	【後】	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(=ソルダクトン)	200mg1管
2134		<b>炭酸脱水酵素阻害剤</b>	
		ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶
2139		<b>その他の利尿剤</b>	
		<b>ループ利尿薬</b>	
	【後】	フロセミド錠20mg「NP」(=ラシックス)	20mg1錠
	【後】	フロセミド注20mg「NIG」(=ラシックス)	20mg1管2mL
	【後】	トラセミド錠4mg「KO」(=ルブラック)	4mg1錠

薬効 限定	【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
	【後】	アゾセミド錠 30mg	30mg 1錠
		<b>サイアザイド類似薬</b>	
		ナトリックス錠 1	1mg 1錠
		<b>浸透圧利尿薬</b>	
		<b>バソプレシンV2-受容体拮抗薬</b>	
	【後】	トルバプタンOD錠 7.5mg「オーツカ」 (=サムスカ)	7.5mg 1錠
	【後】	トルバプタンOD錠 15mg「オーツカ」 (=サムスカ)	15mg 1錠
		サムタス点滴静注用 8mg	8mg 1瓶
<b>214 血圧降下剤</b>			
2144		<b>アンジオテンシン変換酵素阻害剤</b>	
	【後】	ペリンドプリルエルブミン錠 4mg「サワイ」 (=コバシル)	4mg 1錠
2145		<b>メチルドパ製剤</b>	
		メチルドパ錠 (ツルハラ) 250	250mg 1錠
2149		<b>その他の血圧降下剤</b>	
		<b>β遮断薬</b>	
		ビソノテープ 2mg	2mg 1枚
		ビソノテープ 4mg	4mg 1枚
		<b>α遮断薬</b>	
	【後】	ドキサゾシン錠 2mg「テバ」 (=加テ <sup>レ</sup> ナリ)	2mg 1錠
		エブランチルカプセル 15mg	15mg 1CP
		<b>α・β遮断薬</b>	
	【後】	カルベジロール錠 10mg「トーワ」 (=ア <sup>レ</sup> チスト)	10mg 1錠
		カルベジロール錠 1.25mg「サワイ」 (=ア <sup>レ</sup> チスト)	1.25mg 1錠
		<b>アンジオテンシン受容体拮抗剤 (ARB)</b>	
	【後】	カンデサルタン錠 8mg「あすか」 (=ブ <sup>レ</sup> ロ <sup>レ</sup> ス)	8mg 1錠
	【後】	テルミサルタン錠 40mg「ケミファ」 (=ミカル <sup>レ</sup> ス)	40mg 1錠
	【後】	イルベサルタン錠 100mg「サワイ」 (=イルベ <sup>レ</sup> タ)	100mg 1錠
	【後】	アジルサルタン錠 20mg「JG」 (=ア <sup>レ</sup> ルバ <sup>レ</sup> )	20mg 1錠
		<b>持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬配合剤</b>	
		<b>持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤</b>	
		<b>Ca拮抗薬</b>	
	【後】	アゼルニジピン錠 16mg「日医工」 (=加 <sup>レ</sup> ブ <sup>レ</sup> ック)	16mg 1錠
	【後】	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」 (=ベ <sup>レ</sup> ルジ <sup>レ</sup> ピン)	2mg 2mL 1管
		ベルジピン注射液 10mg/10mL	10mg 10mL 1管
		<b>抗アルドステロン薬</b>	
	【後】	エプレレノン錠 50mg「杏林」 (=セ <sup>レ</sup> ラ)	50mg 1錠
		<b>レニン阻害剤</b>	
<b>216 血管収縮剤</b>			
2160		<b>血管収縮剤</b>	
	【後】	ミドドリン塩酸塩錠 2mg「NIG」 (=メ <sup>レ</sup> リ <sup>レ</sup> ソ)	2mg 1錠
		ネオシネジコワ注 1mg	1mL 1管
		<b>5-HT<sub>1B/1D</sub>受容体作動型片頭痛治療剤</b>	
<b>217 血管拡張剤</b>			
2171		<b>冠血管拡張剤</b>	
		<b>Ca拮抗薬</b>	
	【後】	アムロジピンOD錠 2.5mg「ケミファ」 (=ルバ <sup>レ</sup> スクOD)	2.5mg 1錠
	【後】	アムロジピンOD錠 5mg「ケミファ」 (=ルバ <sup>レ</sup> スクOD)	5mg 1錠
	【後】	ニフェジピンCR錠 20mg「サワイ」 (=ア <sup>レ</sup> タ <sup>レ</sup> ートCR)	20mg 1錠
	【後】	ニフェジピンCR錠 40mg「サワイ」 (=ア <sup>レ</sup> タ <sup>レ</sup> ートCR)	40mg 1錠
	【後】	ニフェジピンカプセル 5mg「サワイ」 (=ア <sup>レ</sup> タ <sup>レ</sup> ートカプセル)	5mg 1カプセル
	【後】	シルニジピン錠 10mg「サワイ」 (=ア <sup>レ</sup> レック)	10mg 1錠
	【後】	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「日医工」 (=ベ <sup>レ</sup> ルバ <sup>レ</sup> ッサー-R)	100mg 1カプセル
	【後】	ベラパミル塩酸塩錠 40mg「タイヨ」 (=ワ <sup>レ</sup> ラン)	40mg 1錠
		<b>Kチャンネルオープナー</b>	
	【後】	ニコランジル錠 5mg「サワイ」 (=シ <sup>レ</sup> グ <sup>レ</sup> マ <sup>レ</sup> ト)	5mg 1錠

薬効 限定	【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
	【後】	ニコランジル点滴静注用 2mg 「サワイ」	2mg 1瓶
		シグマート注 12mg	12mg 1瓶
		<b>ニトロ類</b>	
	【後】	一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」 (=アイトール)	20mg 1錠
	【後】	ニトロペン舌下錠 0.3mg	0.3mg 1錠
		ニトロール注 5mg/10ml	0.05% 10mL 1管
		ニトロール点滴静注 50mg バッグ	0.1% 50mL 1瓶
	【後】	硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」	40mg 1枚
		ミオコールスプレー 0.3mg	0.65% 7.2g 1缶
		<b>その他</b>	
2179		<b>その他の血管拡張剤</b>	
		<b>心房性Na利尿ペプチド</b>	
		ハンブ注射用 1000μg	1.000μg 1瓶
<b>218 高脂血症用剤</b>			
2183		<b>クロフィブラート系製剤</b>	
		バルモディアXR錠 0.2mg	0.2mg 1錠
2189		<b>その他の高脂血症用剤</b>	
		<b>HMG-CoA還元酵素阻害薬</b>	
	【後】	プラバスタチンNa錠 10mg 「NS」 (=ハ <sup>o</sup> ロソ)	10mg 1錠
	【後】	アトルバスタチン錠 10mg 「サワイ」 (=リ <sup>o</sup> トル)	10mg 1錠
	【後】	ロスバスタチン錠 2.5mg 「サワイ」 (=クレストール)	2.5mg 1錠
		<b>抗酸化薬</b>	
		<b>コレステロールトランスポーター阻害薬</b>	
	【後】	エゼチミブ錠 10mg 「ケミファ」	10mg 1錠
		<b>その他</b>	
		<b>持続性Ca拮抗薬/HMG-CoA還元酵素阻害剤</b>	
<b>219 その他の循環器官用薬</b>			
2190		<b>その他の循環器官用薬</b>	
		<b>抗トロンビン薬</b>	
	【後】	アルガトロバン注射液 10mg 「サワイ」 (=スロソノHI)	10mg 20mL 1管
		<b>K吸収抑制薬</b>	
	【後】	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 20% 分包 25g 「三和」	25% 1個
		カリメート散 (内用)	5g 1包
		カリメート経口液 20% 25g	25g 1包
		ロケルマ懸濁用散 分包 5g	5g 1包
		<b>リン吸着薬</b>	
		<b>脳障害後遺症用薬</b>	
	【後】	イフェンプロジル錠 20mg	20mg 1錠
		<b>超急性期血栓溶解薬</b>	
		<b>脳浮腫用薬 浸透圧利尿薬</b>	
		グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200ml (=グ <sup>o</sup> リセオール)	200mL 1袋
		<b>プロスタグランジン類</b>	
	【後】	アルプロスタジル注 5μg シリンジ「サワイ」 (=リア <sup>o</sup> ル)	5μg 1mL 1シリンジ
		<b>ニコチン酸類</b>	
	【後】	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg 「ト <sup>o</sup> ワ」 (=ト <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ン)	100mg 1カプセル
		<b>HCNチャネル遮断薬</b>	
		コラン錠 2.5mg	2.5mg 1錠
		<b>AT<sub>2</sub> 受容体拮抗薬/RAAS阻害薬 (ARNI)</b>	
		エンレスト錠 100mg	100mg 1錠
		<b>可溶性β<sub>2</sub>受容体刺激薬 (sGC) 刺激剤</b>	
		ベリキューボ錠 2.5mg	2.5mg 1錠
<b>22- 呼吸器官用薬</b>			
<b>221 呼吸促進剤</b>			
2219		<b>その他の呼吸促進剤</b>	
		<b>麻薬拮抗薬</b>	

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg 1mL 1管
		ベンゾジアゼピン拮抗薬	
	【後】	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」(=アネキセト)	0.5mg 5mL 1管
<b>222 鎮咳剤</b>			
2229		その他の鎮咳剤	
		フスタゾール糖衣錠10mg	10mg 1錠
<b>223 去痰剤</b>			
2233		システイン系製剤	
		カルボシステイン錠500mg「トーワ」(=ムコダイン)	500mg 1錠
2234		ブロムヘキシン製剤	
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	4mg 1錠
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg	0.2% 2mL 1管
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%	0.2% 4.5mL 1本
2239		その他の去痰剤	
	【後】	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg(=ムコソルバン)	45mg 1カプセル
<b>224 鎮咳去痰剤</b>			
2242		コデイン系製剤	
		コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」	5mg 1錠
2249		その他の鎮咳去痰剤	
<b>225 気管支拡張剤</b>			
2251		キサントゲン系製剤	
	【後】	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg 1錠
2254		サルブタモール製剤	
		ベネトリン吸入液0.5%	0.5% 30mL 1本
2259		その他の気管支拡張剤	
		<b>β2刺激薬</b>	
		メプチンエアー10μg吸入100回	0.0143% 5mL 1瓶
		メプチン吸入液ユニット0.01% 0.3ml	0.01% 0.3ml
	【後】	ツロブテロールテープ2mg「久光」(=ネブリン)	2mg 1枚
		<b>抗コリン薬</b>	
		スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	60吸入1キット
		<b>抗コリン薬配合剤・β2刺激薬吸入剤（COPD治療配合剤）</b>	
		アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット
		<b>抗アレルギー薬</b>	
		インターール吸入液1%	1% 2mL 1管
<b>226 含嗽剤</b>			
2260		含嗽剤	
		ポビドンヨードガーグル液7%「明治」30mL(=イソジンガーグル)	7% 30mL
		含嗽用ハチアズレ顆粒	0.1% 2g 1包
<b>229 その他の呼吸器官用薬</b>			
2290		その他の呼吸器官用薬	
		<b>ステロイド薬</b>	
		<b>ステロイド・β2刺激薬配合剤（喘息・COPD治療配合剤）</b>	
		アドエア125エアゾール120吸入用	12.0g 1瓶
		シムビコートタービューハイラー60吸入	60吸入1キット
		レルベア100エリプタ14吸入用	14吸入1キット
<b>23- 消化器官用薬</b>			
<b>231 止瀉剤、整腸剤</b>			
2312		タンニン酸系製剤	
		タンニン酸アルブミン	
2316		活性生菌製剤	
		ミヤBM	1g 1包
2318		ジメチコン製剤	
	【後】	ジメチコン錠40mg「YD」	40mg 1錠
	【後】	ジメチコン内用液2%「ホリイ」(=ガスコットロフ)	2% 500mL

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
2319	<b>その他の止瀉剤，整腸剤</b>	
【後】	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(=ロペミン)	1mg1錠
	薬用炭(1包50gを救急室に保管)	
232 消化性潰瘍用剤		
2325	<b>H2遮断剤</b>	
【後】	ファモチジンD錠20mg	20mg1錠
【後】	ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL (=ガスター)	20mg20mL
2329	<b>その他の消化性潰瘍用剤</b>	
	<b>プロトン・ポンプ阻害薬(PPI)</b>	
	オメプラゾール注射用20mg「日医工」(=オメプ <sup>®</sup> ラール)	20mg1瓶
【後】	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」(=タプ <sup>®</sup> ロンOD)	15mg1錠
【後】	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」(=パ <sup>®</sup> リエット)	10mg1錠
	タケキャブ錠10mg	10mg1錠
	<b>防御因子増強薬</b>	
【後】	スルピリド錠50mg「アメル」(=ト <sup>®</sup> グマチール)	50mg1錠
	レバミピド錠100mg「EMEC」(=ムコスタ)	100mg1錠
【後】	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(=プロマック)	75mg
	アルロイドG内用液5%	600mL
233 健胃消化剤		
2331	<b>消化酵素製剤</b>	
	リパクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル
2339	<b>その他の健胃消化剤</b>	
234 制酸剤		
2343	<b>アルミニウム化合物製剤</b>	
2344	<b>無機塩製剤</b>	
	酸化マグネシウム	
【後】	マグミット錠330mg	330mg1錠
	炭酸水素ナトリウム	
2349	<b>その他の制酸剤</b>	
235 下剤，洗腸剤		
2354	<b>植物性製剤</b>	
【後】	センノシド錠12mg「サワイ」(=フル <sup>®</sup> レニド)	12mg1錠
2357	<b>グリセリン製剤</b>	
	グリセリン洗腸「オオタ」小児用30	30ml15g1個
	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」60mL	50%60mL1個
	グリセリン洗腸「オオタ」150	150ml75g1個
	グリセリンBC液「ヨシダ」	500mL
2359	<b>その他の下剤，洗腸剤</b>	
【後】	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	0.75%10mL1本
	テレミンソフト坐薬10mg	10mg1個
	アミティーザカプセル12μg	12μg1カプセル
	ゲーフィス錠5mg	5mg
	モビコール配合内用剤LD	6.8523g1包
	スインブロイク錠0.2mg	0.2mg1錠
236 利胆剤		
2362	<b>胆汁酸製剤</b>	
【後】	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(=ウルソ)	100mg1錠
239 その他の消化器官用薬		
2391	<b>鎮吐剤</b>	
	<b>5-HT3受容体拮抗型制吐剤</b>	
	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠
【後】	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」	1mg50mL1袋
【後】	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	0.75mg5mL1瓶
	<b>選択的NK1受容体拮抗型制吐剤</b>	
【後】	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
2399	他に分類されない消化器官用薬	
	消化管運動亢進薬	
	プリンペラン錠5	5mg 1錠
	プリンペラン注射液10mg	0.5% 2mL 1管
【後】	ドンペリドン錠10mg「JG」（=ナウゼリン）	10mg 1錠
【後】	ドンペリドン坐剤10mg「日新」	10mg 1個
【後】	ドンペリドン坐剤30mg「日新」	30mg 1個
	ナウゼリン坐剤60	60mg 1個
	モサブリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」（=ガストロン）	5mg 1錠
	オピオイド受容体作用薬	
	潰瘍性大腸炎・クローン病用薬	
	抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤	
【後】	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg 1瓶
	口腔用薬	
	副腎皮質ホルモン製剤	
【後】	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%5g「日医工」	0.1% 5g
	トローチ剤	
【後】	SPトローチ0.25mg 明治	0.25mg 1錠
	その他	
	シェーグレン症候群用薬	
24- ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）		
241 脳下垂体ホルモン剤		
2411	ACTH製剤	
2412	脳下垂体前葉ホルモン製剤	
2414	脳下垂体後葉ホルモン製剤	
	ピトレシン注射液20	20単位 1mL 1管
2419	その他の脳下垂体ホルモン剤	
243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤		
2431	甲状腺ホルモン製剤	
	チラーヂンS錠50	50 $\mu$ g 1錠
2432	抗甲状腺ホルモン剤	
	メルカゾール錠2.5mg	2.5mg 1錠
2439	その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
【後】	テリバラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」	600 $\mu$ g 1キット
	テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g	56.5 $\mu$ g 1瓶
244 たん白同化ステロイド剤		
2449	その他のたん白同化ステロイド剤	
245 副腎ホルモン剤		
2451	エピネフリン製剤	
	ボスミン注1mg	0.1% 1mL 1管
	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL	0.1% 1mL 1シリンジ
	ノルアドリナリン注1mg	0.1% 1mL 1管
2452	コルチゾン系製剤	
	ソル・コーテフ静注用100mg	100mg 1瓶（溶解液付）
2454	フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	
	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水性懸濁注40mg / 1mL	40mg 1mL 1瓶
【後】	デキサート注射液1.65mg	1.65mg 1管
【後】	デキサート注射液6.6mg	6.6mg 1管
【後】	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」（=リゾロン）	0.5mg 1錠
	リンデロン注4mg (0.4%)	4mg 1mL 1管
2456	プレドニゾン系製剤	
	プレドニン錠5mg	5mg 1錠
	プレドニゾン錠1mg（旭化成）	1mg 1錠
	水溶性プレドニン10mg	10mg 1管
	ソル・メドロール静注用125mg	125mg 1瓶（溶解液付）

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	ソル・メドロール静注用500mg	500mg1瓶（溶解液付）
<b>246 男性ホルモン剤</b>		
2461	テストステロン製剤 エナルモンデポー筋注250mg	250mg1mL1管
<b>247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤</b>		
2478	合成黄体ホルモン製剤	
<b>249 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）</b>		
2492	すい臓ホルモン剤 超速効型 【後】 インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サファイ」（＝ホラビッド）	300単位1キット
	超速効 混合型 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300単位1キット
	速効型 ヒューマリンR注100単位/mL	100単位1mLバイアル
	混合型 中間型 持続型 【後】 インスリングルルギンBS注リオペン「リリー」（＝ランタス注ソロスター）	300単位3mL1筒
	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位3mL1筒
2499	他に分類されないホルモン剤（含抗ホルモン剤） 【後】 ジノプロスト注射液1000μg「F」 【後】 オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	1mg1mL1管 100μg1mL1管
	前立腺癌、閉経前乳癌 ゴナックス皮下注用 80mg ゴナックス皮下注用 120mg ゴナックス皮下注用 240mg リュープリンPRO注射用キット22.5mg	80mg1瓶 120mg1瓶 240mg1瓶 22.5mg1筒
	5α還元酵素阻害薬 【後】 デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	0.5mg
	GIP/GLP-1受容体作動薬 マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL1キット
<b>25- 泌尿生殖器官及び肛門用薬</b>		
<b>255 痔疾用剤</b>		
2559	その他の痔疾用剤 ジオン注無痛化剤付 【後】 ヘモポリゾン軟膏 ボラザG坐剤 ボラザG軟膏 2.4g	1.0mL1瓶（希釈液付） 2g 1個
<b>259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬</b>		
2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 尿失禁・頻尿治療薬 【後】 イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」（＝ステプラ） ベオーバ錠50mg 排尿困難・尿閉用薬 【後】 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トワ」（＝ハルナールD） 【後】 シロドシンOD錠4mg「DSEP」（＝ユリーフ） 【後】 タダラフィル錠5mgZA「シオエ」	0.1mg1錠 50mg1錠 0.2mg1錠 4mg1錠 5mg1錠
<b>26- 外皮用薬</b>		
<b>261 外皮用殺菌消毒剤</b>		
2611	塩素酸塩製剤 次亜塩0.05%液「ヨシダ」 次亜塩0.1%液「ヨシダ」	
2612	ヨウ素化合物 【後】 ポピヨドン液10%	10%250mL
2614	過酸化剤製剤	

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
2615	<b>アルコール製剤</b> 消毒用エタノール液	500mL
2616	<b>石鹼類製剤</b> ジアミトール消毒用液50W/V%	50%500mL
2619	<b>その他の外皮殺菌消毒剤</b> カハキジソノグルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ヒビスコール液A1% ステリクロンWエタノール液0.5 マスクンスクラブ	1%250mL1本 1%1L 500ml
<b>263 化膿性疾患用剤</b>		
2633	<b>外用サルファ製剤</b> ゲーベックリーム1%	1%100g
2634	<b>外用抗生物質製剤</b> ゲンタシン軟膏0.1% ソフラチュール貼付剤10cm	1mg10g (10.8mg)10cm×10cm1枚
2639	<b>その他の化膿性疾患用剤</b>	
<b>264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤</b>		
2646	アズノール軟膏0.033% <b>副腎皮質ホルモン製剤</b> I群 Strongest II群 Very Strong III群 Strong IV群 Mild I群 Weak	0.05%5g 5g 0.1%10g
2647	<b>抗生物質・副腎皮質ホルモン混合製剤</b>	
2649	<b>その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤</b> 亜鉛華軟膏 エキザルベ軟膏5g 非ステロイド性消炎鎮痛薬 【後】フェルピナクパップ70mg「ユートク」（=セルタッチ） 【後】ケトプロフェンテープS20mg「テイク」 【後】フェルピナクローション3%「ラケル」（=ハゲル） スチックゼノールA 止痒薬 オイラックスクリーム10% その他	10cm×14cm7枚1袋 7cm×10cm7枚1袋 3%100mL 40g 10%
<b>265 寄生性皮膚疾患用剤</b>		
2655	<b>イミダゾール系製剤</b> エンベシドクリーム1% ラミシール外用液1%	1%10g 10g1本
<b>266 皮膚軟化剤（腐食剤を含む）</b>		
2661	<b>有機酸製剤</b> スピール膏M	25cm2 1枚
2669	<b>その他の皮膚軟化剤（腐食剤を含む）</b> 【後】尿素クリーム10%「SUN」20g（=ウパール）	10%20g
<b>269 その他の外皮用薬</b>		
2699	<b>他に分類されない外皮用薬</b> 肉芽・表皮形成促進薬 フィブラストスプレー500 抗菌・消毒外用薬 【後】ネグミンシュガー軟膏（=ユパスタ）	0.003%30g 500μg1瓶（溶解液付） 100g1本

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
29- その他の個々の器官系用医薬品		
290 その他の個々の器官系用医薬品		
2900	その他の個々の器官系用医薬品 セファランチン注10mg	0.5%2mL1管
3- 代謝性医薬品		
31- ビタミン剤		
311 ビタミンA及びD剤		
3112	合成ビタミンD製剤 【後】 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	0.5μg1錠
312 ビタミンB1剤		
3122	ビタミンB1誘導体制剤 【後】 フルスルチアミン錠25mg「トーフ」（=アリナミン）	25mg1錠
313 ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く）		
3131	ビタミンB2剤	
3133	パントテン酸系製剤 【後】 パンテチン錠100mg「YD」 パントシン注5% 100mg	100mg1錠 100mg2mL1管
3134	ビタミンB6剤 【後】 ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」（=ピトキサール）	20mg1錠
3135	葉酸製剤 フォリアミン錠	5mg1錠
3136	ビタミンB12剤 【後】 メコバラミン錠500μg「SW」（=メコバル） 【後】 メコバラミン注500μg「NP」	0.5mg1錠 0.5mg1管
314 ビタミンC剤		
3140	ビタミンC剤 【後】 アスコルビン酸注500mgPB「日新」	500mg1管
316 ビタミンK剤		
3160	ビタミンK剤 ケイツーN静注用10mg	10mg2mL1管
317 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く）		
3179	その他の混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く） ビタメジン静注用 ビタジェクト注キット	1瓶 2筒1キット
32- 滋養強壮薬		
321 カルシウム剤		
3211	乳酸カルシウム製剤 乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g
3213	グルコン酸カルシウム製剤 カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%5mL1管
3215	ハロゲン化カルシウム製剤	
322 無機質製剤		
3221	ヨウ素化合物製剤 ヨウ化カリウム（ルゴール液の調整に使用）	
3222	鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む） クエン酸第一鉄Na錠50mg「サリ」（=フェロミア） フェジン静注40mg/2mL フェインジェクト静注500mg	鉄50mg1錠 40mg2mL1管 500mg10mL
3229	その他の無機質製剤 カリウム製剤 アスパラカリウム錠300mg アスパラカリウム散50% 500mg/g 微量元素 【後】 エレジェクト注シリンジ2mL	300mg1錠 2mL1管
323 糖類剤		

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
3231	<b>ブドウ糖製剤</b>	
	ブドウ糖「フソー」	10g
	ブドウ糖注射液 5% 20ml	5% 20mL 1管
	大塚糖液 5% 50ml	5% 50mL 1瓶
	大塚糖液 5% 100ml	5% 100mL 1袋
	テルモ糖注 5% 250ml	5% 250mL 1袋
	大塚糖液 5% 500ml	5% 500mL 1袋
	大塚糖液 10% 500ml	10% 500mL 1袋
	大塚糖液 50% 20ml	50% 20mL 1管
	大塚糖液 50% 200ml	50% 200mL 1袋
	大塚糖液 70% 350ml	70% 350mL 1袋
3234	<b>キシリトール製剤</b>	
3239	<b>その他の糖類剤</b>	
	ハイカリックRF輸液 500ml	500mL 1袋
<b>325 たん白アミノ酸製剤</b>		
3253	<b>混合アミノ酸製剤</b>	
	アミパレン輸液 200mL 1袋	200mL 1袋
	<b>低アルブミン血症改善薬</b>	
	リーバクト配合顆粒	4.15g 1包
	<b>肝性脳症用</b>	
	アミノレバン点滴静注 200ml	200mL 1瓶
	<b>腎不全用</b>	
	ネオアミュー輸液 200ml	200mL 1袋
3259	<b>その他のたん白アミノ酸製剤</b>	
	<b>血中アンモニア低下薬</b>	
	アミノレバンEN配合散	50g 1包
	<b>経管栄養剤</b>	
	<b>成分栄養（アミノ酸系）</b>	
	エレンタール配合内用剤	80g 1包
	<b>消化態栄養（蛋白質系）</b>	
	<b>半消化態栄養（蛋白質系）</b>	
限定	エンシュア・H	250mL
	ラコールNF配合経腸用液	400mL パック
	<b>高カロリー用輸液（糖・アミノ酸・電解質輸液＋ビタミン＋微量元素）</b>	
	エルネオバNF1号輸液 1000ml	1000ml 1キット
	エルネオバNF1号輸液 1500ml	1500ml 1キット
	エルネオバNF2号輸液 1000ml	1000ml 1キット
	エルネオバNF2号輸液 1500ml	1500ml 1キット
	<b>糖・アミノ酸・電解質・ビタミン輸液</b>	
	パレプラス輸液 500mL	500mL 1キット
<b>329 その他の滋養強壮薬</b>		
3299	<b>他に分類されない滋養強壮薬</b>	
	<b>脂肪乳剤</b>	
	イントラリポス輸液 20% 100ml	100mL 1袋
<b>33- 血液・体液用薬</b>		
<b>331 血液代用剤</b>		
3311	<b>生理食塩液類</b>	
	大塚生食注 20ml	20mL 1管
	大塚生食注 50ml	50mL 1瓶
	テルモ生食 100ml	100ml 1袋
	テルモ生食TK 100ml	100mL 1キット
	大塚生食注 250ml	250mL 1袋
	大塚生食注 500ml	500mL 1袋
	大塚生食注 500ml（洗浄用）	500mL 1瓶
	テルモ生食 1L	1L 1袋

薬効 限定	【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
		生理食塩液 P L 「フソー」 1L	1 L 1 瓶
		生理食塩液 P L 「フソー」 2L	2 L 1 瓶
		<b>電解質補正液</b>	
		大塚食塩注 1 0 % 20ml	1 0 % 2 0 m L 1 管
3319		<b>その他の血液代用剤</b>	
		<b>電解質補正液</b>	
		<b>カリウム補正用 (K)</b>	
	【後】	K C L 注 2 0 m E q キット 「テルモ」	1 モル 2 0 m L 1 キット
		<b>磷酸・カリウム補正用</b>	
		<b>低張輸液 (点滴開始液)</b>	
		ソルデム 1 輸液 500ml	5 0 0 m L 1 袋
		ソルデム 1 輸液 200ml	2 0 0 m L 1 袋
		<b>維持液</b>	
		KN 3 号輸液 2 0 0 m L	2 0 0 m L 1 瓶
		KN 3 号輸液 5 0 0 m L	5 0 0 m L 1 瓶
		<b>1/4 乳酸リンゲル液</b>	
		KNMG 3 号輸液 5 0 0 m L	5 0 0 m L 1 袋
		<b>等張輸液</b>	
		ラクテック注 500m l	5 0 0 m L 1 袋
		ラクテック D 液 500ml	5 0 0 m L 1 瓶
		<b>血漿増量剤 デキストラン輸液</b>	
		ホルベン輸液 6 % 5 0 0 ml	5 0 0 m L 1 袋
		<b>酢酸リンゲル液</b>	
		フィジオ 1 4 0 輸液 500m l	5 0 0 m L 1 袋
332		<b>止血剤</b>	
3321		<b>カルバゾクロム系製剤</b>	
	【後】	カルバゾクロムスルホン酸 N a 錠 3 0 m g 「Y D」	3 0 m g 1 錠
	【後】	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 5 0 m g 「日医工」 ( 0 . 5 % 1 0 m L	
3322		<b>ゼラチン製剤</b>	
3323		<b>臓器性止血製剤</b>	
		トロンビン液モチダソフトボトル 1 万	1 0 , 0 0 0 単位 1 0 m L 1 キット
3327		<b>抗プラスミン剤</b>	
	【後】	トランキサミン酸カプセル 2 5 0 m g 「トワ」 (=トランサミン)	2 5 0 m g 1 カプセル
		トランサミン注 5 % 5 ml	5 % 5 m L 1 管
3329		<b>その他の止血剤</b>	
		<b>ヘパリン拮抗薬</b>	
		プロタミン硫酸塩静注 1 0 0 m g 「モチダ」	1 % 1 0 m L バイアル
333		<b>血液凝固阻止剤</b>	
3332		<b>ジクマロール系製剤</b>	
		ワーファリン錠 1 m g	1 m g 1 錠
3334		<b>ヘパリン製剤</b>	
		ヘパリン N a 注 5 千単位 / 5 m L 「モチダ」	5 0 0 0 単位 5 m L 1 瓶
		ヘパリン N a 注 1 万単位 / 1 0 m L 「モチダ」	1 0 0 0 0 単位 1 0 m L 1 瓶
	【後】	ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0 . 2 m L シリンジ 「モチダ」	5 , 0 0 0 単位 0 . 2 ml
		ヘパリン N a ロック用 1 0 0 単位 / m L シリンジ 「オーツカ」 1 ( 1 . 0 0 0 単位 1 0 m L 1 筒	
		クレキササン皮下注キット 2 0 0 0 I U	2 0 0 0 単位 0 . 2 m L 1 筒
3339		<b>その他の血液凝固阻止剤</b>	
	【後】	リバーロキサバン OD 錠 1 0 m g 「バイエル」	1 0 m g 1 錠
	【後】	リバーロキサバン OD 錠 1 5 m g 「バイエル」	1 5 m g 1 錠
		エリキユース錠 2 . 5 m g	2 . 5 m g 1 錠
		エリキユース錠 5 m g	5 m g 1 錠
		リクシアナ OD 錠 1 5 m g	1 5 m g 1 錠
		リクシアナ OD 錠 3 0 m g	3 0 m g 1 錠
	【後】	ヘパリン類似物質クリーム 0 . 3 % 「日医工」 2 5 g (=ヒルト'イト)	2 5 g
		リコモジュリン点滴静注用 1 2 8 0 0	1 2 8 0 0 単位 1 瓶

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通） 限定：必要時購入	規格
<b>339 その他の血液・体液用薬</b>		
<b>3399</b>	<b>他に分類されない血液・体液用薬</b>	
	アルスロマチック関節手術用灌流液	3,000mL1バッグ
	<b>血小板凝集抑制薬</b>	
	<b>シクロオキシゲナーゼCOX1阻害薬</b>	
【後】	バイアスピリン錠100mg	100mg1錠
	<b>アデニルシクラーゼ受容体阻害薬</b>	
【後】	クロピドグレル錠25mg「SANIK」（=プロピックス）	25mg1錠
【後】	クロピドグレル錠75mg「SANIK」（=プロピックス）	75mg1錠
	エフィエント錠3.75mg	3.75mg
	エフィエント錠5mg	5mg
	<b>（プロスタンディン類）</b>	
【後】	ベラプロストNa錠20μg「トワ」（=ドルナー）	20μg1錠
【後】	リマプロストアルファ錠5μg「日医工」（=ホルモン）	5μg1錠
	<b>ホスホジエステラーゼ阻害薬</b>	
【後】	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	100mg1錠
	<b>トロンボキサンA2合成阻害薬</b>	
【後】	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」（=エパデール）	900mg1包
	<b>セロトニン5-HT2拮抗薬</b>	
【後】	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」（アソラーク）	100mg1錠
	<b>体外循環用添加剤（溶血防止剤）</b>	
	<b>顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF製剤）</b>	
	ノイトロジン注100μg	100μg1瓶
【後】	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	3.6mg0.36mL1筒
<b>34-人工透析用薬</b>		
<b>341 人工腎臓透析用剤</b>		
<b>3410</b>	<b>人工腎臓透析用剤</b>	
	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	1010mL
<b>39-その他の代謝性医薬品</b>		
<b>391 肝臓疾患用剤</b>		
<b>3919</b>	<b>その他の肝臓疾患用剤</b>	
	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	20mL1管
<b>392 解毒剤</b>		
<b>3922</b>	<b>グルタチオン製剤</b>	
<b>3923</b>	<b>メルカプト酢酸系製剤（BALを含む）</b>	
	バル筋注100mg「AFPJ」	10%1mL1管
<b>3925</b>	<b>チオ硫酸ナトリウム製剤</b>	
	デトキソール静注液2g	10%20mL1管
<b>3929</b>	<b>その他の解毒剤</b>	
	<b>慢性腎不全用薬 老廃物吸着薬</b>	
	クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠
	<b>銅吸収阻害剤</b>	
【後】	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」（=ノベルジン）	50mg1錠
	<b>抗葉酸代謝拮抗薬</b>	
	<b>アシドーシス改善薬</b>	
	メイロン静注7% 20ml	7%20mL1管
	メイロン静注7% 250ml	7%250mL1瓶
	<b>有機リン類系神経毒治療薬</b>	
	<b>活性型葉酸製剤</b>	
	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	25mg1瓶
	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg1瓶
【後】	ホリナート錠25mg「サワイ」（=ユセル）	25mg1錠
	<b>筋弛緩回復剤</b>	
【後】	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	200mg2mL1筒
<b>394 痛風治療剤</b>		

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
3941		コルヒチン製剤	
3943		アロプリノール製剤	
3949		その他の痛風治療剤	
	【後】	フェブキソスタット錠10mg「サワイ」	10mg 1錠
		ユリス錠1mg	1mg 1錠
<b>395 酵素製剤</b>			
3954		ウロキナーゼ製剤	
3959		その他の酵素製剤	
		血栓溶解剤 修飾型組織プラスミノゲンアクチベーター（t-PA）	
		クリアクター静注用80万	80万国際単位1瓶
		壊死組織溶解酵素剤	
		プロメライン軟膏5万単位/g（ジェイドルフ）	50,000単位1g 1本20g
<b>396 糖尿病用剤</b>			
3961		スルフォニル尿素系製剤	
	【後】	グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」（=アマリール）	0.5mg 1錠
3962		ビグアナイド系製剤	
		メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	250mg 1錠
3969		その他の糖尿病用剤	
		αグルコシダーゼ阻害薬	
	【後】	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」（=ベイスノD）	0.3mg 1錠
		速効型食後血糖降下剤	
	【後】	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」（=シュアホスト）	0.25mg 1錠
		速効型インスリン分泌促進・食後過血糖改善配合薬	
		インスリン抵抗性改善薬 チアソリジン類	
	【後】	ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」（=アクトス）	15mg 1錠
		選択的DPP-4阻害剤	
		ジャヌビア錠50mg	50mg 1錠
		トラゼンタ錠5mg	5mg 1錠
		選択的DPP-4阻害薬/ビグアナイド系薬配合剤	
		選択的SGLT2阻害剤	
		フォシーガ錠10mg	10mg 1錠
		ジャディアンス錠10mg	10mg 1錠
		インスリン分泌低下・抵抗性亢進改善薬	
		ツイミーグ錠500mg	500mg 1錠
<b>399 他に分類されない代謝性医薬品</b>			
3992		アデノシン製剤	
		アデホスールコーワ注20mg	2mL 1管
3999		他に分類されないその他の代謝性医薬品	
		腸内アンモニア精製抑制薬	
		ラクツロースシロップ65%「NIG」	65%500mL 1本
		ポルトラック原末	6g 1包
	【後】	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	250mg 1錠
		膵酵素阻害薬	
	【後】	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（=オパソ）	100mg 1錠
		ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」（=エフォワ）	100mg 1瓶
	【後】	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」（=エフォワ）	500mg 1瓶
		ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」（=フサン）	10mg 1瓶
		ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」（=フサン）	50mg 1瓶
		免疫抑制薬	
		イムラン錠50mg	50mg 1錠
		抗リウマチ薬	
	【後】	メトトレキサート錠2mg（=リウマトレックス）	2mg 1カプセル
		RANKL阻害薬	
		ランマーク皮下注120mg	120mg
		骨粗鬆症用薬	

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	<b>カルシトニン類（高Ca血症、骨ベテット治療薬）</b>	
	<b>骨吸収抑制剤 ビスホスフォネート類</b>	
【後】	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」（=ボナロ）	35mg1錠
【後】	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」	1mg1mL1筒
【後】	ゾレドロン酸点滴静注用4mg 100mL	4mg100mL
	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1袋
	ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	60mg0.5mL1筒
	<b>骨形成促進・骨吸収抑制薬</b>	
	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg
	<b>変形性膝関節症用薬</b>	
【後】	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	1%2.5mL1筒
	<b>糖尿病性神経障害改善薬 アルドース還元酵素阻害薬</b>	
	<b>脳梗塞用薬 血小板凝集抑制薬</b>	
【後】	オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」(=カクロト)	80mg200mL
	<b>造血因子 エリスロポエチン</b>	
【後】	ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「三和」(=ネスフ)	30μg
【後】	ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「三和」(=ネスフ)	60μg
	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg
	<b>急性肺障害用薬 好中球エラスターゼ阻害剤</b>	
【後】	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(=エラスホール)	100mg1瓶
<b>4- 組織細胞機能用医薬品</b>		
<b>42- 腫瘍用薬</b>		
<b>421 アルキル化剤</b>		
4211	<b>クロルエチルアミン系製剤</b>	
<b>422 代謝拮抗剤</b>		
4223	<b>フルオロウラシル系製剤</b>	
	5-FU注1000mg 5-FU	1000mg1瓶
【後】	カペシタビン錠300mg「サワイ」（=ゼロタ）	300mg1錠
4224	<b>シトシン系製剤</b>	
	ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」(=ジエムザール) GEM	200mg1瓶
	ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」(=ジエムザール) GEM	1g1瓶
4229	<b>その他の代謝拮抗剤</b>	
	ユーエフティ配合カプセルT100mg	100mg 1カプセル
【後】	エスエワン配合OD錠T20(=ティエスワン) TS-1	20mg1錠(カプセル相当量)
【後】	エスエワン配合OD錠T25(=ティエスワン) TS-1	25mg1錠(カプセル相当量)
【後】	ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」	100mg4mL1瓶
【後】	ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」	500mg20mL1瓶
<b>423 抗腫瘍性抗生物質製剤</b>		
4235	<b>アントラサイクリン系抗生物質製剤</b>	
【後】	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(=アドリアン)	10mg1瓶
【後】	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(=アドリアン)	50mg1瓶
【後】	エピルビシン注射液10mg/5mL(=ファルルピシン)	10mg1瓶
<b>424 抗腫瘍性植物成分製剤</b>		
4240	<b>抗腫瘍性植物成分製剤</b>	
	<b>ビンカ・アルカロイド類</b>	
	<b>タキソ環類</b>	
	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(=タキール)	30mg5mL1瓶
【後】	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(=タキール)	100mg16.7mL1瓶
	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶
【後】	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg1mL1瓶
【後】	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg4mL1瓶
	ジェブタナ点滴静注60mg	60mg1.5mL1瓶 (溶解液付)
	<b>DNAトポイソメラーゼ阻害薬</b>	
【後】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」(=トポテン)	40mg2mL1瓶
【後】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(=トポテン)	100mg5mL1瓶

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL
<b>429 その他の腫瘍用薬</b>		
<b>4291</b>	<b>その他の抗悪性腫瘍用剤</b>	
	<b>白金系抗癌薬</b>	
	エルブラット点滴静注液 50mg 10mL OHP	50mg10mL1瓶
	エルブラット点滴静注液 100mg 20mL OHP	100mg20mL1瓶
	カルボプラチン点滴静注液 50mg 「NK」 (=ハ°ラ°ラチン)	50mg5mL1瓶
【後】	カルボプラチン点滴静注液 150mg 「NK」 (=ハ°ラ°ラチン)	150mg15mL1瓶
【後】	カルボプラチン点滴静注液 450mg 「NK」 (=ハ°ラ°ラチン)	450mg45mL1瓶
	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL(=ランタ)CDDP	10mg20mL1瓶
	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL(=ランタ)CDDP	50mg100mL1瓶
	<b>肝細胞癌治療剤</b>	
	<b>乳癌用薬 抗エストロゲン剤</b>	
	<b>アロマターゼ阻害薬</b>	
【後】	アナストロゾール錠 1mg 「サド」 (=アリミテックス)	1mg1錠
	<b>その他</b>	
【後】	エリブリンメシル酸塩静注液 1mg 「ニプロ」	1mg2mL1瓶
	<b>モノクローナル抗体</b>	
【後】	トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」 (=ハ-セブチン)	60mg1瓶
【後】	トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」 (=ハ-セブチン)	150mg1瓶
	パーゼタ点滴静注 420mg/14mL	420mg/14mL
【後】	ベバシズマブBS点滴静注 100mg 「CTNK」	100mg/4mL
【後】	ベバシズマブBS点滴静注 400mg 「CTNK」	400mg/16mL
	サイラムザ点滴静注液 100mg	100mg/10mL
	サイラムザ点滴静注液 500mg	500mg/50mL
	ベクティビックス点滴静注 100mg	100mg/5mL
	<b>分子標的治療薬</b>	
	<b>免疫チェックポイント阻害薬</b>	
	イミフィンジ点滴静注 500mg	500mg10mL1瓶
	オブジーボ点滴静注 120mg	120mg/12mL
	オブジーボ点滴静注 240mg	240mg/24mL
	<b>経皮的エタノール注入療法用剤</b>	
<b>4299</b>	<b>他に分類されない腫瘍用薬</b>	
	<b>免疫賦活薬</b>	
	ピシバニール注射用 5KE	5KE1瓶
<b>44- アレルギー用薬</b>		
<b>441 抗ヒスタミン剤</b>		
<b>4419</b>	<b>その他の抗ヒスタミン剤</b>	
	ボララミン注 5mg	0.5%1mL1管
<b>442 刺激療法剤</b>		
<b>4420</b>	<b>刺激療法剤</b>	
	<b>抗リウマチ薬</b>	
<b>449 その他のアレルギー用薬</b>		
<b>4490</b>	<b>その他のアレルギー用薬</b>	
	<b>抗ヒスタミン薬</b>	
【後】	エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トワ」 (=アレジオン)	20mg1錠
	<b>ロイコトリエン拮抗薬</b>	
【後】	モンテルカスト錠 10mg 「ケミファ」 (=シングレア)	10mg1錠
<b>5- 生薬及び漢方処方に基づく医薬品</b>		
<b>52- 漢方製剤</b>		
<b>520 漢方製剤</b>		
<b>5200</b>	<b>漢方製剤</b>	
	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g1包
	ツムラ五苓散エキス顆粒	2.5g1包
	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)	2.5g1包

薬効 限定 【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
	ツムラ呉茱萸湯(31)エキス顆粒	2.5g 1包
	ツムラ十全大補湯(48) 2.5g	2.5g 1包
	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g 1包
	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	2.5g 1包
	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g 1包
	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g 1包
	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	2.5g 1包
	ツムラ抑肝散(54)エキス顆粒	2.5g 1包
<b>6- 病原生物に対する医薬品</b>		
<b>61- 抗生物質製剤</b>		
<b>611 主としてグラム陽性菌に作用するもの</b>		
<b>6111</b>	<b>ペニシリン系抗生物質製剤</b>	
	注射用ペニシリンGカリウム100万単位 PCG	100万単位1瓶
<b>6112</b>	<b>リンコマイシン系抗生物質製剤</b>	
	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」(=ダラシ)CLDM	600mg 1管4ml
	ダラシカプセル150mg	150mg 1カプセル
<b>6113</b>	<b>バンコマイシン製剤</b>	
	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 VCM	500mg 1瓶
	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 VCM	0.5g 1瓶
<b>6119</b>	<b>その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの</b>	
	【後】 テイコプラニン点滴静注用400mg 「トーワ」	400mg 1瓶
<b>612 主としてグラム陰性菌に作用するもの</b>		
<b>6123</b>	<b>アミノ糖系抗生物質製剤</b>	
	アミカシン硫酸塩注射液100mg 「明治」 AMK	100mg 1管1ml
<b>613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの</b>		
<b>6131</b>	<b>ペニシリン系抗生物質製剤</b>	
	アモキシシリンカプセル250mg (=アモシリン) AMPC	250mg 1カプセル
	オーグメンチン配合錠250RS	250mg 1錠
	ピクシリン注射用 ABPC	1g 1瓶
	ピペラシリンNa注射用2g 「テバ」 (=ペントシリン) PIPC	2g 1瓶
<b>6132</b>	<b>セフェム系抗生物質製剤</b>	
	<b>第一世代</b>	
	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」100ml (=セファゾリン)	1g 1キット
	ケフラルカプセル250mg CCL	250mg 1カプセル
	<b>第二世代</b>	
	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g (=セフメゾリン)	1g 1瓶
	<b>第三世代</b>	
	セフトラジウム静注用1g 「VTRS」 (=セフトラジウム) CAZ	1g 1瓶
	セフトリアキソンNa静注用1g (=セフトリアキソン) CTRX	1g 1瓶
	<b>第四世代</b>	
	【後】 セフェピム塩酸塩静注用1g 「サンド」	1g 1瓶
<b>6133</b>	<b>オキサセフェム系抗生物質製剤</b>	
<b>6134</b>	<b>アミノ糖系抗生物質製剤</b>	
	ゲンタシン注60mg GM	60mg 1.5ml 1管
<b>6135</b>	<b>ホスホマイシン製剤</b>	
	ホスホマイシンNa静注用2g 「NP」 (=ホスホマイシン注) FOM	2g 1瓶
<b>6139</b>	<b>その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの</b>	
	<b>β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤</b>	
	スルバシリン静注用3g (=1ナシ) ABPC/SBT	(3g) 1瓶
	スルベラゾン静注用1g SBT/CPZ	(1g) 1瓶
	【後】 タゾピベ配合静注 4.5 (=ゾピベ)	4.5g 1瓶
	<b>カルバペネム系抗生物質製剤</b>	
	【後】 メロベネム点滴静注用1g 「明治」	1g 1瓶
<b>614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの</b>		
<b>6149</b>	<b>その他の主としてG陽性菌、マイコプラズマに作用するもの</b>	

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		クラリスロマイシン錠200mg「NIG」（=クリス） CAM	200mg1錠
	【後】	アジスロマイシン錠500mg「トワ」（=ジスロマック）	500mg1錠
		ジスロマック点滴静注用500mg	500mg
615 主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの			
6152		テトラサイクリン系抗生物質製剤	
		ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」MINO	100mg1カプセル
		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」MINO	100mg1瓶
616 主として抗酸菌に作用するもの			
6164		リファンピシン製剤	
		リファンピシнкаプセル150mg「サンド」	150mg1カプセル
617 主としてカビに作用するもの			
6173		アムホテリシンB製剤	
		ファンギゾンシロップ100mg/mL AMPH	100mg24mL1本
6179		その他の主としてカビに作用するもの	
	【後】	ミカファンギンNa点滴静注用50mg(=ファンガード) MCFG	50mg1瓶
62- 化学療法剤			
621 サルファ剤			
6219		その他のサルファ剤	
622 抗結核剤			
6222		イソニアジド系製剤	
		イスコチン錠100mg INH	100mg1錠
6223		ピラジナミド製剤	
6225		エタンブトール製剤	
624 合成抗菌剤			
6241		ピリドンカルボン酸系製剤（ニューキノロン系抗生物質）	
	【後】	レボフロキサシン錠500mg「陽進」（=クレビット） LVFX	500mg1錠
	【後】	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 LVFX	500mg100mL
6249		その他の合成抗菌剤（オキサゾリジノン系合成抗菌剤）	
	【後】	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」（=ザイボックス）	600mg1バッグ300mL
625 抗ウイルス剤			
6250		抗ウイルス剤	
		抗ヘルペス薬	
	【後】	バラシクロビル錠500mg「NP」（=バルトレックス）	500mg1錠
		アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」（=ゾビラックス）	250mg1瓶
	【後】	ピダラビン軟膏3%「SW」 5g	3%5g
		B型肝炎用薬	
	【後】	エンテカビル錠0.5mg「トワ」（=パラルド）	0.5mg
		C型肝炎用薬	
		インフルエンザ用薬	
		タミフルカプセル75	75mg1カプセル
		リレンザ	4ブリスター5枚入
		ラピアクタ点滴用バック 300mg	300mg60mL
		COVID-19治療薬	
		ラゲブリオカプセル200mg	200mg
		ベクルリー点滴静注用100mg	100mg1瓶
629 その他の化学療法剤			
6290		その他の化学療法剤	
		抗真菌薬	
		フルコナゾールカプセル100mg「アムル」（=ジフルカン） FCZ	100mg1カプセル
		プロジフ静注液200 F-FLCZ	200mg1瓶
	【後】	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」（=イトリゾール）	1%
		スルファミン類 ST合剤	
		バクタ配合顆粒	1g
63- 生物学的製剤			
631 ワクチン類			

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
6311	<b>細菌ワクチン類</b>	
	<b>肺炎球菌ワクチン</b>	
	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL1瓶
	プレバナー20水性懸濁注	1シリンジ1回分：0.5mL
	<b>BCGワクチン 結核予防</b>	
	乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）	12mg1管（添付生食0.15ml）
	<b>インフルエンザ菌b型による感染症（髄膜炎）の予防</b>	
6313	<b>ウイルスワクチン類</b>	
	<b>沈降B型肝炎ワクチン</b>	
	ヘプタボックスⅡ水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25mLシリンジ
	ヘプタボックスⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.5mLシリンジ
	<b>その他</b>	
	インフルエンザHAワクチン（ビケンHA）	1mL1瓶
	インフルエンザHAワクチン シリンジ	0.5mLシリンジ
	フルミスト点鼻液	0.2mL1筒
	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	1瓶（添付水0.7ml溶解後）0.5ml
	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	1瓶（添付水0.7ml溶解後）0.5ml
	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用	シリンジ0.3mL：1本
	ジェービックV（乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン）	1本
	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	
	シングリックス筋注用	1瓶（溶解液付）
	ロタテック内用液	2mL
	ロタリックス内用液	1.5mL1本
632	<b>毒素及びトキソイド類</b>	
6322	<b>トキソイド類</b>	
	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL1キット
633	<b>抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類</b>	
6331	<b>抗毒素類</b>	
	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	6000単位
634	<b>血液製剤類</b>	
6343	<b>血漿分画製剤</b>	
	<b>アルブミン製剤 高張製剤</b>	
	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	25%50mL1瓶
	<b>アルブミン製剤 等張製剤</b>	
	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	5%250mL1瓶
	<b>静注用人免疫グロブリン</b>	
	献血グロベニン-I静注用2500mg 50ml	2.5g50mL1瓶（溶解液付）
	<b>抗HBs人免疫グロブリン</b>	
	ヘプスブリンIH静注1000単位	1000単位5mL1瓶
	<b>筋注用人免疫グロブリン</b>	
	ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケダ」	1500mg/1mL10mL
	<b>濃縮人血液凝固第XIII因子</b>	
	乾燥濃縮アンチトロンビンIII（ATIII）	
	献血ノンスロン1500注射用	1.500単位1瓶（溶解液付）
	<b>溶血ヘモグロビン処理薬</b>	
	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2.000単位100mL1瓶
	<b>破傷風人免疫血清グロブリン 破傷風抗毒素</b>	
	テタノブリン筋注用 250単位	250国際単位1瓶
	テタノブリンIH静注 1500単位	1.500国際単位1瓶
636	<b>混合生物学的製剤</b>	
6361	<b>ワクチン・トキソイド混合製剤</b>	
	百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合・ヘモフィルスb型ワクチン	
	ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL1シリンジ
	<b>破傷風トキソイド</b>	
	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（DTビック）	1瓶

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
6369	その他の混合生物学的製剤 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン ミールビック I I 皮下注用	1瓶（添付水0.7ml溶解後）0.5ml
639	その他の生物学的製剤	
6391	結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤 イムノブラダー勝注用 40mg	40mg
64-	寄生動物に対する薬	
641	抗原虫剤	
6419	その他の抗原虫剤 アネメトロ点滴静注液 500mg フラジール内服錠 250mg	500mg 1.0mL 250mg 1錠
642	駆虫剤	
6429	その他の駆虫剤	
7-	治療を主目的としない医薬品	
71-	調剤用薬	
711	賦形剤	
7111	乳糖類 乳糖	
712	軟膏基剤	
7121	油脂性基剤 プロペト オリーブ油	
7122	乳剤性基剤 吸水クリーム「ニッコー」	
7123	水溶性基剤 マクロゴール軟膏	
713	溶解剤	
7131	精製水類 注射用水 20ml 注射用水 500ml（細口開栓・ブラボトル）	20mL 1管 500mL 1瓶
714	矯味、矯臭、着色剤	
7142	シロップ製剤 単シロップ	
719	その他の調剤用薬	
7190	その他の調剤用薬 塩化ナトリウム（内服用） ヨウ素（ルゴール液の調整に使用）	
72-	診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	
721	X線造影剤	
7211	ヨウ素化合物製剤 ガストログラフィン経口・注腸用	
7212	バリウム塩製剤 バリブライトP	300g
7213	造影補助剤 【後】 バリエース発泡顆粒 マグコロール散 6.8%分包 50g	2.5g 1包 50g 1包
7214	配合製剤 ウログラフィン注 60% 20ml	60% 20mL 1管
7219	その他のX線造影剤 イオバミドール 300注 20mL「F」（=イバミロン） イオバミロン注 370 50ml イオバミロン注 370 100ml イオバミロン注 300 シリンジ 80ml イオバミロン注 370 シリンジ 100ml イソビスト注 240（脳槽・脊髄・関節造影剤） 10ml	20mL 75.52% 50mL 1瓶 75.52% 100mL 1瓶 61.24% 80mL 1筒 75.52% 80mL 1筒 10mL 1瓶

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	オムニパーク300シリンジ 100m l	64.71%100mL1筒
	オムニパーク300シリンジ 125m l	64.71%125mL1筒
	ピリスコピン点滴静注50	10.55% 100mL
<b>722 機能検査用試薬</b>		
<b>7224</b>	<b>肝機能検査用試薬</b>	
	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶（溶解液付）
<b>7225</b>	<b>腎機能検査用試薬</b>	
	インジゴカルミン注射液	0.4%5mL1管
<b>7229</b>	<b>その他の機能検査用試薬</b>	
	【後】 グルカゴン注射用1単位「ILS」	1U.S.P.単位1瓶（溶解液1ml付）
<b>重症筋無力症診断薬 エドロホニウム塩化物製剤</b>		
<b>729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）</b>		
<b>7290</b>	<b>その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）</b>	
	<b>経口糖耐容力試験用糖質液</b>	
	トレーランG液75g	225mL1瓶
	<b>MRI用経口消化管造影剤</b>	
	フェリセルツ散20%	600mg1包
	<b>MRI用造影剤</b>	
	<b>MRI用肝臓造影剤</b>	
	EOB・プリモビスト注シリンジ	10mL1シリンジ
	<b>非イオン性MRI用造影剤</b>	
	プロハンス静注シリンジ13mL	32.3%15mL1筒
	<b>超音波診断用造影剤</b>	
	ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤	
	ユービット錠100mg	100mg1錠
	<b>蛍光眼底造影剤</b>	
	【後】 フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶
	<b>眼科検査用試験紙</b>	
	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚0.7mg
<b>73- 公衆衛生用薬</b>		
<b>732 防疫用殺菌消毒剤</b>		
<b>7321</b>	<b>アルコール及びアルデヒド製剤</b>	
	ディスオーパ消毒液0.55%	0.55%3.8L
	エスサイド消毒液6%	6% 750mL
<b>79- その他の治療を主目的としない医薬品</b>		
<b>799</b>	<b>他に分類されない他に分類されない治療を主目的としない医薬品</b>	
<b>7990</b>	<b>他に分類されない治療を主目的としない医薬品</b>	
	<b>胃内粘液溶解除去剤 蛋白分解酵素</b>	
	プロナーゼMS	20,000単位0.5g
	<b>腸管内容物洗浄薬</b>	
	モビブレップ配合内用剤	1袋
	<b>局所接着薬</b>	
	ベリプラスPコンビセット組織接着用 3mL	
	タコシール組織接着用シート（4.8cm×4.8cm）	4.8cm×4.8cm1枚
	タコシール組織接着用シート（9.5cm×4.8cm）	9.5cm×4.8cm1枚
	<b>医療用ガス</b>	
	酸素	
	二酸化炭素	
<b>8- 麻薬</b>		
<b>81- アルカロイド系麻薬（天然麻薬）</b>		
<b>811 アヘンアルカロイド系製剤</b>		
<b>8114</b>	<b>モルヒネ系製剤</b>	
	オプソ内服液5mg	5mg 2.5mL1包
	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 1mL	1%1mL1管10mg
	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」 5mL	1%5mL1管50mg

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
8119	<b>その他のあへんアルカロイド系麻薬</b>	
	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」（＝オキソチン）	5mg 1錠
	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」（＝オキソチン）	20mg 1錠
【後】	オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」（＝オキノム）	2.5mg 1包
【後】	オキシコドン内服液10mg「日本臓器」（＝オキノム）	10mg 1包
<b>82- 非アルカロイド系麻薬</b>		
<b>821 合成麻薬</b>		
8211	<b>フェニルピペリジン系製剤</b>	
	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	3.5% 1mL 1管
8219	<b>その他の合成麻薬</b>	
【後】	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005% 2mL 1管
【後】	レミフェンタニル静注用2mg（＝アルハ）	2mg 1瓶
	フェントステープ0.5mg	0.5mg 1枚
【後】	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」（＝フェントス）	1mg 1枚
【後】	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」（＝フェントス）	2mg 1枚

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】		アジスロマイシン錠500mg「トーワ」(=ジスロマック)		
【後】		アジルサルタン錠20mg「JG」		△
		アスパラカリウム散50% 500mg/g		△
		アスパラカリウム錠300mg		△
【後】		アゼルニジピン錠16mg「日医工」(=カルプロック)		
【後】		アゾセミド錠30mg(=ダイアト)		△
【後】		アトルバスタチン錠10mg「サワイ」(=リビートル)		△
【後】	【危】	アナストロゾール錠1mg「サンド」(=アリミテックス)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(=シントレル)		◎
【後】	【危】	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(=アンカロン)	③不整脈用剤	
		アミティーザカプセル12μg		
		アミノレバンEN配合散(50g/包)		
【後】		アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」(=ノルバスクOD)		
【後】		アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」(=ノルバスクOD)		
		アモキシシリンカプセル250mg(=サワリン)		○
【後】	【危】	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」(=エビリアイ)	⑨精神神経用剤	
【後】		アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」(=ワンアルファ)		
		アルロイドG内用液5%		
【後】		アレンドロン酸錠35mg「サワイ」(=ホナロン)		○
【後】	【危】	アロチノロール塩酸塩10mg錠「サワイ」	③不整脈用剤	
【後】		アンプロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」(=ムソルバン)		
【後】		イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」(=エパデール)		
		イスコチン錠100mg		
【後】		一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(=アイトール)		
【後】		イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(=イトリゾール)		
【後】		イフェンプロジル錠20mg(=セロケール)		
【後】		イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」(=ステープラ)		
	【危】	イムラン錠50mg	②免疫抑制剤	
【後】		イルベサルタン錠100mg「サワイ」(=イルベタン)		△
		ウブレチド錠5mg		◎
【後】		ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(=ウルソ)		
【後】	【危】	エスエーワン配合OD錠T20(=ティーエスワン)	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】	【危】	エスエーワン配合OD錠T25(=ティーエスワン)	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】		エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」(=ルネスタ)		
【後】		エゼチミブ錠10mg「ケミファ」(=ゼチーア)		
【後】	【危】	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(=テパス)	⑨精神神経用剤	
【後】		エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」(=アレジオン)		
	【危】	3.75mg エフィエント錠	⑤血液凝固阻止剤	
	【危】	5mg エフィエント錠	⑤血液凝固阻止剤	
		エブランチルカプセル15mg		
【後】		エプレレノン錠50mg「杏林」		○
	【危】	エリキユース錠2.5mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
	【危】	エリキユース錠5mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
		エレンタール配合内用剤(80g/包)		
		塩化ナトリウム(内服用)		
		エンシュア・H 250ml		
【後】		エンテカビル錠0.5mg「トーワ」(=バラクルド)		◎
		エンレスト錠100mg		※△
		(麻)オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」(=オキシコドン)		
		(麻)オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」(=オキシコドン)		
【後】		(麻)オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」		
【後】		(麻)オキシコドン内服液10mg「日本臓器」		
		オーグメンチン配合錠25ORS		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
		(麻)オプソ内服液5mg		○
		ガストログラフィン経口・注腸用		
【後】	【危】	カペシタビン錠300mg「サワイ」(=ゼロダ)	①抗悪性腫瘍剤	○
【後】		カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(=フォイパン)		
		カリメート経口液20%25g		
		カリメート散(5g/包)		
【後】		カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(=アドナ)		△
【後】	【危】	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」(=テグレート)	④抗てんかん剤	
		カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(=アチスト)		
【後】	【危】	カルベジロール錠10mg「トーワ」(=アチスト)	③不整脈用剤	
		カルボシステイン錠500mg「トーワ」(=ムコダイン)		
【後】		カロナール錠500mg		○
【後】		カンデサルタン錠8mg「あすか」(=フロレス)		△
		キシロカインビスカス2%		
		グーフイス錠5mg		
【後】	【危】	クエチアピン錠25mg「日新」(=セロキエル)	⑨精神神経用剤	
		クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(=フェロミア)		
		クラリスロマイシン錠200mg「NIG」(=クラリス)		○
【後】	【危】	グリペリドOD錠0.5mg「日医工」(=アマール)	⑩糖尿病用剤	◎
		クレメジン速崩錠500mg		
【後】	【危】	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(=リーゼ)	⑨精神神経用剤	
【後】	【危】	クロピドグレル錠25mg「SANIK」(=プラビックス)	⑤血液凝固阻止剤	
【後】	【危】	クロピドグレル錠75mg「SANIK」(=プラビックス)	⑤血液凝固阻止剤	
		ケフラールカプセル250mg		○
		コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」		
		コララン錠2.5mg		
【後】		酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」		
【後】		サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」(=アンブラーグ)		
		酸化マグネシウム		
【後】		ジアゼパム錠2「サワイ」(=セルシン)		△
【後】		ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(=セファドール)		
【後】	【危】	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(=シベノール)	③不整脈用剤	◎
【後】		ジメチコン錠40mg「YD」(=ガスコン)		
【後】		ジメチコン内用液2%「ホリイ」(=ガスコンドロープ)		
	【危】	ジャディアンス錠10mg	⑩糖尿病用剤	
	【危】	ジャヌビア錠50mg	⑩糖尿病用剤	◎
【後】		ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」(=ヘルベッサーR)		
【後】		シルニジピン錠10mg「サワイ」(=アテレル)		
【後】	【危】	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(=プレタル)	⑤血液凝固阻止剤	△
【後】		シロドシンOD錠4mg「DSEP」(=ユリーフ)		△
		スインブロイク錠0.2mg		※
【後】		スピロラクトン錠25mg「NP」(=アルダクトン)		○
【後】	【危】	スルピリド錠50mg「アメル」(=ドクマチール)	⑨精神神経用剤	◎
【後】	【危】	セルトラリン錠25mg「サワイ」(=ジェイゾロフト)	⑨精神神経用剤	
【後】		セレコキシブ錠100mg「ケミファ」(=セレコックス)		○
【後】		センノシド錠12mg「サワイ」(=プルゼニド)		
【後】		ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(=マイスリー)		
		タケキャブ錠10mg		
【後】		タダラフィル錠5mgZA「シオエ」		◎
		タミフルカプセル75		◎
【後】		タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」(=ハルナルD)		
		ダラシンカプセル150mg		
		タリージェ錠5mg		◎

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
		炭酸水素ナトリウム		
		単シロップ		
		タンニン酸アルブミン		
【後】		チアプリド錠25mg「JG」(=グラマール)		◎
【後】		チザニジン錠1mg「日医工」(=テルネリン)		○
		チラーゼンS錠50μg		
	【危】	ツイミーグ錠500mg	⑩糖尿病用剤	
		ツムラ牛車腎気丸(107)2.5g		
		ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)2.5g		
		ツムラ五苓散(17)2.5g		
		ツムラ呉茱萸湯(31)エキス顆粒2.5g		
		ツムラ十全大補湯(48)2.5g		
		ツムラ大建中湯(100)2.5g		
		ツムラ補中益気湯(41)2.5g		
		ツムラ抑肝散(54)エキス顆粒2.5g		
		ツムラ六君子湯(43)2.5g		
		ツムラ芍薬甘草湯(68)2.5g		
		ツムラ茵ちん蒿湯(135)2.5g		
		デエビゴ錠5mg		
【後】	【危】	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	⑦テオフィリン製剤	
【後】		デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」		
【後】	【危】	デュロキセチンカプセル20mg「KMP」(=サインバルタ)	⑨精神神経用剤	◎
【後】		テルミサルタン錠40mg「ケミファ」(=ミカルデイス)		△
【後】		トアラセット配合錠「ケミファ」(= ترامセット)		○
【後】		ドキサゾシン錠2mg「テバ」(=カルテナリン)		
【後】		トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トローワ」(=ユベラン)		
【後】		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」(=アリセプトD)		
【後】		ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(=アリセプトD)		
【後】		ドパコール配合錠L100(=ネオトパストン)		
【後】		トラセミド錠4mg「KO」(=ルプラック)		△
	【危】	トラゼンタ錠5mg	⑩糖尿病用剤	
【後】	【危】	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」(=テジレル)	⑨精神神経用剤	
【後】		トラネキサム酸カプセル250mg「トローワ」(=トランサミン)		○
		トラベルミン配合錠		
【後】		トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」(=サムスカ)		
【後】		トルバブタンOD錠15mg「オーツカ」(=サムスカ)		
		トレーランG液75g 225ml		
【後】		ドンペリドン錠10mg「JG」(=ナウゼリン)		
		ナゼアOD錠0.1mg		
		ナトリックス錠1		△
【後】		ニコランジル錠5mg「サワイ」(=シグマート)		
【後】		ニトロペン舌下錠0.3mg		
【後】		ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(=アダラートCR)		
【後】		ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」(=アダラートCR)		
【後】		ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(=アダラートカプセル)		
		乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末		
		乳糖		
		ノイロトロピン錠4単位		
	【危】	ノバミン錠5mg	⑨精神神経用剤	
【後】	【危】	バイアスピリン錠100mg	⑤血液凝固阻止剤	
		バクタ配合顆粒		◎
【後】		バラシクロビル錠500mg「NP」(=バルトレックス)		◎
【後】		バリエース発泡顆粒		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
		バリブライトP		
	【危】	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」(=デパケン)	④抗てんかん剤	
【後】	【危】	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」(50mg/ml)(=デパケン)	④抗てんかん剤	
		パルモディアXR錠0.2mg		※◎
		バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」		○
【後】		パンテチン錠100mg「YD」		
		PL配合顆粒		
【後】	【危】	ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」(=アクトス)	⑩糖尿病用剤	△
【後】		ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」10mL(=ラキソベロン)		
	【危】	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」(=メインテート)	③不整脈用剤	○
【後】	【危】	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」(=メインテート)	③不整脈用剤	○
【後】		ピモベンダン錠1.25mg「TE」(=アカルデイ)		
【後】		ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」(=ピドキサル)		
【後】	【危】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーフ」(=サンリズム)	③不整脈用剤	◎
【後】	【危】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーフ」(=サンリズム)	③不整脈用剤	◎
【後】		ファモチジンD錠20mg「EMEC」(=ガスターD)		◎
		ファンギゾンシロップ100mg/mL		
【後】		フェブキソスタット錠10mg「サワイ」(=フェアリク)		
		フェリセルツ散20%		
	【危】	フォシーガ錠10mg	⑩糖尿病用剤	○
		フォリアミン錠5mg		
		ブスコパン錠10mg		
		フスタゾール糖衣錠10mg		
		ブドウ糖「フソー」		
		フラジール内服錠250mg		○
【後】		プラバスタチンNa錠10mg「NS」(=マロチン)		△
		プリンペラン錠5		◎
		フルコナゾールカプセル100mg「アメル」(=ジフルカン)		◎
【後】		フルスルチアミン錠25mg「トーフ」(=アリナミンF)		
【後】	【危】	フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」(=タンボール)	③不整脈用剤	△
【後】		プレガバリンOD錠25mg「サワイ」(=リカ)		◎
【後】		プレガバリンOD錠75mg「サワイ」(=リカ)		◎
	【危】(免疫の抑制)	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	②免疫抑制剤	
	【危】(免疫の抑制)	ブレドニン錠5mg	②免疫抑制剤	
【後】		フロセミド錠20mg「NP」(=ラシックス)		△
【後】		プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」(=レンドルミン)		
		プロナーゼMS		
【後】	【危】	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」(=プロノン)	③不整脈用剤	
【後】		プロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「トーフ」(=ピソルボン)		
		ベオーバ錠50mg		
		ベサコリン散5%(50mg/g)		
【後】		ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」(=メスロン)		○
【後】	【危】(免疫の抑制)	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(=リンデロン)	②免疫抑制剤	
【後】	【危】	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	③不整脈用剤	
【後】	【危】	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」(=ワゾラン)	③不整脈用剤	△
【後】		ベラプロストNa錠20μg「トーフ」(=トルナー)		
		ベリキューボ錠2.5mg		
【後】		ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」(=コバシル)		△
【後】	【危】	ポグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」(=ペインOD)	⑩糖尿病用剤	△
【後】		ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」(=プロマック)		
【後】		ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(=アガメイト)		
【後】	【危】	ホリナート錠25mg「サワイ」(=ユーセル)	①抗悪性腫瘍剤	
		ポルトラック原末(6g/包)		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
		マグコロール散68%分包50g		
【後】		マグミット錠330mg		
【後】		ミドドリン塩酸塩錠2mg「NIG」(=マトリジン)		△
		ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(=ミマイシンカプセル100mg)		
		ミヤBM細粒		
【後】	【危】	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(=メキシール)	③不整脈用剤	△
【後】		メコバラミン錠500μg「SW」(=メコバル)		
		メチルドパ錠(ツルハラ)250		○
【後】	【危】	メトトレキサート錠2mg「タハ」(=リウマトレックス)	②免疫抑制剤	◎
	【危】	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	⑩糖尿病用剤	◎
【後】		メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」(=マリー)		◎
		メルカゾール錠2.5mg		
		モサプリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」(=ガスモチン)		
		モビコール配合内用剤LD		
		モビプレップ配合内用剤		
【後】		モンテルカスト錠10mg「ケミファ」(=シングレア)		
		薬用炭(50g/本)		
	【危】	ユーエフティ配合カプセルT100mg	①抗悪性腫瘍剤	△
		ユービット錠100mg		
		ユリス錠1mg		※
		ラクツロースシロップ65%「NIG」		
		ラゲブリオカプセル200mg		
		ラコールNF配合経腸用液(400ml/バッグ)		
	【危】	ラニラピッド錠0.05mg	⑥ジギタリス製剤	◎
【後】		ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」(=パリエット)		
【後】		ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(=ロゼレム)		
【後】		ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」(=タケプロンOD)		
	【危】	ランドセン錠0.5mg	⑨精神神経用剤	
	【危】	リクシアナOD錠15mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
	【危】	リクシアナOD錠30mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
【後】	【危】	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」0.1%(0.5mg/包)(=リスパダール)	⑨精神神経用剤	◎
		リーバクト配合顆粒		
		リパクレオンカプセル150mg		
【後】	【危】	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	⑤血液凝固阻止剤	◎
【後】	【危】	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	⑤血液凝固阻止剤	◎
		リファンピシカプセル150mg「サンド」		
【後】		リマプロスタアルファデクス錠5μg「日医工」(=オハルモン)		
	【危】	レキササリOD錠0.5mg	⑨精神神経用剤	
【後】	【危】	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」(=シュアポスト)	⑩糖尿病用剤	
		レバミピド錠100mg「EMEC」(=ムコスタ)		
【後】	【危】	レベチラセタム錠500mg「サワイ」(=イーケブラ)	④抗てんかん剤	◎
【後】		レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」(=エルカルチン)		
【後】		レボフロキサシン錠500mg「陽進」(=クレビット)		◎
【後】		ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」(=ロキソニン)		○
		ロケルマ懸濁用散分包5g		
【後】		ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」(= Crestor)		○
		ロタテック内用液		
		ロタリックス内用液		
【後】		ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(=ロペミン)		
	【危】	ワーファリン錠1mg	⑤血液凝固阻止剤	△

腎：腎機能低下時の用量調節の重要度【◎：最重要，○：重要，△：要注意】（「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」）

※：「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」に記載なし（添付文書より判断）

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
		亜鉛華軟膏		
		アズノール軟膏0.033% 20g		
		アドエア125エアゾール120吸入用		
		日点アトロピン点眼液1%5mL		
		アノーロエリプタ30吸入用		
		アルスロマチック関節手術用灌流液		
		アンヒバ坐剤小児用100mg		
		アンヒバ坐剤小児用200mg		
	【危】	イムノブラダー膀胱注用40mg	①抗悪性腫瘍剤	
		インターール吸入液1% 2mL		
		液化亜酸化窒素		
		エキザルベ軟膏5g		
		エコリシン眼軟膏 3.5g		
		エスサイド消毒液6%		
【後】		SPTローチ0.25mg「明治」		
		消毒用エタノール液		
【後】		エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「わかもと」 5mL		
		エンペシドクリーム1% 10g		
		オイラックスクリーム10%		
		オリブ油		
【後】		カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 2.5mL(=ミケラン)		
		キシロカインゼリー2% (30mL)		
【後】		8%キシロカインポンプスプレー80g		
		4%キシロカイン液 20mL		
		吸水クリーム「ニッコー」		
		グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 50%		
		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL		
		グリセリン浣腸「オヲタ」150		
		グリセリンBC液「ヨシダ」		
		クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」250mL		
【後】		ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」7枚/袋 (=モーラス)		
		ゲーベンクリーム1%		
		ゲンタシン軟膏0.1% 10g		
		1%サイブレジン点眼液10mL		
		酸素		
		サンピロ点眼液2% 5mL		
		次亜塩0.05%液「ヨシダ」		
		次亜塩0.1%液「ヨシダ」		
【後】		シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5ml (=サンコバ)		
【後】		ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼリア」 (=ホルタレン)		
【後】		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」 (=ホルタレン)		
【後】		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 (=ホルタレン)		
		シムビコートタービュヘイラー60吸入		
【後】		硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 (=フロントールテープ)		
		スコピゾル眼科用液		
		スチックゼノールA40g		
		ステリクロンWエタノール液0.5		
		スピール膏M絆創膏25cm <sup>2</sup>		
		スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入		
		セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 (=セボフルン)		
		ゾビラックス眼軟膏3% 5g		
		ソフラチュール貼付剤 10cm		
		ダイアアップ坐剤6mg		
		タコシール組織接着用シート(4.8cm×4.8cm)		

	タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm)		
	チアミール消毒用液50W/V%		
【後】	ツオブテロールテープ2mg「久光」(=ホクナリテープ)		
	ディスオーパ消毒液0.55%		
【後】	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%5g「日医工」(=アファゾロン)		
	テレミンソフト坐剤10mg		
	トロンピン液ソフトボトル 1万/本10mL		
【後】	ドンペリドン坐剤10mg「日新」(=ナウゼリン)		
【後】	ドンペリドン坐剤30mg「日新」(=ナウゼリン)		
	ナウゼリン坐剤60mg		
	二酸化炭素		
【後】	尿素クリーム10%「SUN」 20g (=ウレパール)		
	5%ネオシネジン点眼液10mL		
【後】	ネグミンシュガー軟膏 (=ユーバスタ)		
	含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1% 2g		
【後】	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 5mL (=ヒアレイン)		
	【危】 ビソノテープ2mg	③不整脈用剤	○
	【危】 ビソノテープ4mg	③不整脈用剤	○
【後】	ビダラビン軟膏3%「SW」5g (=アラセナ)		
	ヒビスコール液A1%		
【後】	ピレノキシリン懸濁性点眼液0.005%(5ml) (=カリエニ)		
	フィブラストスプレー500μg		
【後】	フェルピナクパップ70mg「ユートク」(10cmX14cm) 7枚/袋 (=セルタッチ)		
【後】	フェルピナクローション3%「ラクール」 100mL (=ナバゲルン)		
	(麻)フェントステープ0.5mg (=フェントス)		
【後】	(麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」 (=フェントス)		
【後】	(麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」 (=フェントス)		
	プリピナ液0.05%		
【後】	フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」 5mL (=フルメロン)		
【後】	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用(=フルナーゼ)		
	フルミスト点鼻液		
	フローレス眼検査用試験紙0.7mg		
	プロスタンディン軟膏0.003%(30g)		
	プロベト		
【後】	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 5mL(=プロナック)		
【後】	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%(=ビソルボン)		
	ブロメライン軟膏5万単位/g (ジイドルフ) 20g		
	ベネトリン吸入液0.5% 30mL		
	0.4%ベノキシール眼科用液5ml		
【後】	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 25g (=ヒルトイド)		
【後】	ヘモポリゾン軟膏		
	ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL		
	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 30mL (=イソジンガーグル)		
【後】	ポビドン液10% (=イソジン液)		
	ボラザG坐剤		
	ボラザG軟膏 2.4g		
	マイザー軟膏0.05% 5g		
	マクロゴール軟膏「ヨシダ」		
	マスキンスクラブ4%		
	ミオコールスプレー0.3mg(0.65% 7.2g)		
	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)		
	ミドリンP点眼液10mL		
	メプチンエア-10μg吸入100回 0.0143% (5ml)		
	メプチン吸入液ユニット0.3mL		
	ヨウ化カリウム		
	ヨウ素		

【後】	ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 2.5ml (=キサラン)		
	ラミシール外用液1% 10g		
【後】	リドカインテープ18mg「YP」 (=ペンルス)		
【後】	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」 (=リバスタッチ)		
【後】	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」 (=リバスタッチ)		
【後】	リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」 (=リバスタッチ)		
【後】	リバスチグミンテープ18mg「DSEP」 (=リバスタッチ)		
	リレンザ 5mg(4プリスター/枚)		
	点眼・点鼻用リンデロンA液		
	眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g		
	リンデロン-V軟膏 0.12% 5g		
【後】	レボフロキサシン点眼液1.5%「ニットー」 5ml (=クラビット)		
	レルベア100エリプタ14吸入用		
	ロコイド軟膏0.1% 10g		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」(=ゾビラックス)		◎
【後】		アスコルビン酸注500mgPB「日新」		△
		アセリオ静注液1000mg/バッグ		○
	【危】	アタラックス-P注射液(25mg/ml) 2.5%1mL	⑨精神神経用剤	
		アデホス-Lコーワ注20mg		
		アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL		
【後】		アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL		○
		アナペイン注2mg/ml 0.2%100mL		
		アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL		
		アネメトロ点滴静注液500mg		○
	【危】	アブラキサン点滴静注用100mg	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」3mL(=アンカロン)	③不整脈用剤	
		アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」		◎
		アミノレバン点滴静注 200mL		
		アミパレン輸液 200mL		
【後】		アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL(=スロノンHI)		
		献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」		
		献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」		
【後】		アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」(=リプル)		
		EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%10mL1筒		
		イオパミドール300注20mL「F」(=イオパミロン)		◎
		イオパミロン注300シリンジ 61.24%80mL1筒		◎
		イオパミロン注370 75.52%100mL1瓶		◎
		イオパミロン注370 75.52%50mL1瓶		◎
		イオパミロン注370シリンジ 75.52%100mL1筒		◎
		イソゾール注射用0.5g		
		イソビスト注240 51.26%10mL1瓶		◎
【後】		イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」		◎
		イベニティ皮下注105mgシリンジ		
		イミフィンジ点滴静注500mg	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」2mL(=トホテシ)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」5mL(=トホテシ)	①抗悪性腫瘍剤	
		インジゴカルミン注20mg「AFP」0.4%5mL		
【後】	【危】	インスリンアスパルトBS注シロスターNR「サノフィ」(=ノラピット)	⑩膵臓ホルモン剤	
【後】	【危】	インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」(=ランタス)	⑩膵臓ホルモン剤	
		インデラル注射液2mg 0.1%2mL		
		イントラリポス輸液20% 100mL		
【後】		インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」		
		インフルエンザHAワクチン 1mL(ビケンHA)		
		インフルエンザHAワクチンシリンジ 0.5mL(フルービックHAシリンジ)		
		ウログラフィン注60% 60%20mL1管		◎
【後】		エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」(=ラジカット)		
		NaCl注10% 20mL		
		エナルモンデポー筋注250mg 1mL		
		エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg 1mL		
【後】	【危】	エピルピシン注射液10mg/5mL(=ファルモピシン)	①抗悪性腫瘍剤	
		エホチール注10mg 1%1mL		
【後】		エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」2mL	①抗悪性腫瘍剤	△
		エルネオパNF1号輸液 1000mL		
		エルネオパNF1号輸液 1500mL		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		エルネオパNF2号輸液 1000mL		
		エルネオパNF2号輸液 1500mL		
	【危】	エルプラット点滴静注液10mg 20mL	①抗悪性腫瘍剤	△
	【危】	エルプラット点滴静注液50mg 10mL	①抗悪性腫瘍剤	△
【後】		エレジェクト注シリンジ 2mL		
【後】		オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 1mL(=サントスタチン)		△
【後】		オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」 200mL(=カタクト)		○
		おたふくかぜワクチン「タケダ」(乾燥弱毒生)		
	【危】	オニバイド点滴静注43mg 10mL	①抗悪性腫瘍剤	
		オビソート注射用0.1g(溶解液付)		
	【危】	オブジーボ点滴静注120mg 12mL	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	オブジーボ点滴静注240mg 24mL	①抗悪性腫瘍剤	
		オムニパーク300注シリンジ100mL		◎
		オムニパーク300注シリンジ125mL		◎
		オメプラゾール注射用20mg「日医工」(=オメプラール)		
		ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」(=エフォーワイ)		
【後】		ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」(=エフォーワイ)		
		カルチコール注射液8.5%5mL		
【後】		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」10mL(=アドナ)		△
【後】	【危】	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL(=パラプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】	【危】	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL(=パラプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
	【危】	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL(=パラプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
		ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケダ」		
【後】		カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(=ソルダクト)		○
		キシロカイン注ポリアンブ1% 10mL		
		キシロカイン注ポリアンブ2% 5mL		
		キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有 20mL		
		強カネオミノファーゲンシー静注20mL		
【後】		グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」		
		クリアクター静注用80万国単位		
		グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL(=グリセオール)		△
		クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」(=ダラシン)		
【後】		グルカゴン注射用1単位「ILS」(溶解液付)		
		クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL		◎
		献血グロベニン-I静注用2500mg 50mL		
【後】	【危】	KCL注20mEqキット「テルモ」1モル20mL	⑧カリウム製剤	◎
		KN3号輸液 200mL		○
		KN3号輸液 500mL		○
		KNMG3号輸液 500mL		○
		ケイツーN静注10mg		
		ケナコルト-A筋注用関節腔内用水性懸濁注40mg/1mL		
	【危】	ゲムシタピン点滴静注用200mg「タカタ」(=ジエムザール)	①抗悪性腫瘍剤	△
	【危】	ゲムシタピン点滴静注用1g「タカタ」(=ジエムザール)	①抗悪性腫瘍剤	△
		ゲンタシン注60mg		◎
		ゴービック水性懸濁注シリンジ(五種混合ワクチン)		
		コアベータ静注用12.5mg		
		ゴナックス皮下注用80mg		
		ゴナックス皮下注用120mg		
		ゴナックス皮下注用240mg		
		コミナティ筋注シリンジ12歳以上用		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
	【危】	サイラムザ点滴静注液100mg 10mL	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	サイラムザ点滴静注液500mg 50mL	①抗悪性腫瘍剤	
		サブラッド血液ろ過用補充液BSG 1010mL		
		サムタス点滴静注用8mg		
	【危】	サンリズム注射液50mg 5mL	③不整脈用剤	◎
		ジアグノグリーン注射用 25mg(溶解液付)		
		(向)ジアゼパム注射液5mg「NIG」		△
		ジェービックV(乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン)		
	【危】	ジェブタナ点滴静注60mg	①抗悪性腫瘍剤	
		ジオン注無痛化剤付		
	【危】	ジギラノゲン注0.4mg 0.02%2mL	⑥ジギタリス製剤	◎
		シグマート注12mg		
	【危】	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 20mL(=ランダ)	①抗悪性腫瘍剤	◎
	【危】	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 100mL(=ランダ)	①抗悪性腫瘍剤	◎
		ジスロマック点滴静注用500mg		
【後】		ジノプロスト注射液1000μg「F」 1mL		
	【危】	シベノール静注70mg 5mL	③不整脈用剤	◎
【後】		シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(=エラスポール)		
		シルガード9水性懸濁筋注シリンジ 0.5mL(ヒパビローマウイルスワクチン)		
		シングリックス筋注用(帯状疱疹ワクチン)		
	【危】	シンビット静注用50mg	③不整脈用剤	
		水痘ワクチン「ビケン」(乾燥弱毒生)		
【後】		スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」		
		スルバシリン静注用3g(=ユナシ)		○
		スルペラゾン静注用1g		
		生理食塩注 20mL		
		生理食塩注 50mL		
		生理食塩注 100mL		
		生理食塩注TK 100mL ★キット		
		生理食塩注 250mL		
		生理食塩注 500mL		
		生食注 洗浄用(500mL)		
		生理食塩注 1L(ソフトバッグ)		
		生理食塩注 1L(プラボトル)		
		生理食塩注 2L(ソフトバッグ)		
		セファズリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」		○
		セファランチン注10mg 2mL		
【後】		セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(=マキシーム)		○
		セフタジジム静注用1g「VTRS」(=モダシ)		○
		セフトリアキソンNa静注用1g「日医工」(=ロセフィン)		△
		セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」		○
	【危】	セレネース注5mg 0.5%1mL	⑨精神神経用剤	
		(向)ソセゴン注射液15mg		
		ソル・コーテフ静注用100mg(溶解液付)		
		ソル・メドロール静注用125mg(溶解液付)		
		ソル・メドロール静注用500mg(溶解液付)		
		ソルデム1輸液 200mL		
		ソルデム1輸液 500mL		
【後】		ゾレドロン酸点滴静注用4mg 100mL(=ゾメ)		◎
		ダイアモックス注射用500mg		◎

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】		タゾピペ配合静注4.5「明治」(=ゾシ)		△
【後】		ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「三和」(=ネスフ)		
【後】		ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「三和」(=ネスフ)		
		ダントリウム静注用2mg		
		注射用水 20mL		
		注射用水 500ml(細口開栓・プラボトル)		
【後】		テイコプラニン点滴静注用400mg「トーフ」		◎
		1%ディプリバン注キット500mg 50mL		
【後】		デキサート注射液1.65mg 0.5mL		
【後】		デキサート注射液6.6mg 2mL		
【後】		デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(=プレセテックス)		
		テタノブリンIH静注1500単位 20mL		
		テタノブリン筋注用250単位		
		デトキソール静注液2g 20mL		
【後】		テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(=フォルテオ)		△
		テリボン皮下注用56.5μg		
【後】	【危】	ドキソルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」(=アドリアシン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドキソルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」(=アドリアシン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	①抗悪性腫瘍剤	
		ドバストン静注50mg 20mL		
【後】		ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」 200mL		
【後】		ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」 50mL		
【後】	【危】	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	①抗悪性腫瘍剤	
		トランサミン注250mg 5% 5mL		○
		ドルミカム注射液10mg 2mL		
	【危】	トレシーバ注フレックスタッチ	⑩膵臓ホルモン剤	
		ドロレプタン注射液25mg 10mL		
		ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「AY」(=フサン)		
		ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「AY」(=フサン)		
		ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 1mL		
【後】		ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mL(=ベルジピン)		△
【後】		ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」(=シグマート)		
		二種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風混合トキソイド) DTビック		
		ニトロール注5mg 0.05% 10mL		
		ニトロール点滴静注50mgバッグ 100mL(0.05%)		
		ネオアミュー輸液 200mL		
		ネオシネジンコーワ注1mg 1mL		
		ネオビタカイン注シリンジ 5mL		
	【危】	ネオフィリン注PL250mg 10mL	⑦テオフィリン製剤	
		ノイトロジン注100μg		
	【危】	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	⑩膵臓ホルモン剤	
		ノルアドリナリン注1mg 0.1% 1mL		△
		献血ノンスロン1500注射用(溶解液付)		
		肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL)		
		ハイカリックRF輸液 500mL		
【後】	【危】	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(=タキソール)	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(=タキソール)	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	パージェタ点滴静注420mg/14mL	①抗悪性腫瘍剤	

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		沈降破傷風トキソイド「生研」		
		ハプトグロビン静注2000単位「JB」 100mL		
		バル筋注100mg「AFP」 1mL		
		パレプラス輸液 500mL		
【後】		パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」(=アロキシ)		△
		バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」		◎
		パントシン注5% 100mg		
		ハンブ注射用1000μg		○
【後】		ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」		
		ビクシリン注射用1g		○
		BCGワクチン(経皮用・1人用)(乾燥)		
	【危】	ピシバニール注射用5KE	①抗悪性腫瘍剤	
		ビタジェクト注キット		
		ビタメジン静注用		
		ピトレシン注射液20 20単位		
		ピペラシリンNa注射用2g「テバ」(=ペントシリン)		○
	【危】	ヒューマリンR注 100単位/mL 10mL	①膵臓ホルモン剤	
		ビリスコピン点滴静注50 100mL		
	【危】	5-FU注1000mg 1000mg	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		ファモチジン静注液20mg「サワイ」 20mL		◎
		フィジオ140輸液 500mL		
		フェインジェクト静注500mg 10mL		
		フェジン静注40mg 2mL		
【後】		(麻)フェンタニール注射液0.1mg「テルモ」 2mL		
		ブスコパン注射液20mg 1mL		
		ブドウ糖注 5% 20mL		
		ブドウ糖注 5% 50mL		
		ブドウ糖注 5% 100mL		
		ブドウ糖注 5% 250mL		
		ブドウ糖注 5% 500mL		
		ブドウ糖注10% 500mL		
		ブドウ糖注50% 20mL		
		ブドウ糖注50% 200mL		
		ブドウ糖注 70% 350mL		
		プラリアHI皮下注60mgシリンジ 0.5mL		◎
		プリンペラン注射液10mg 2mL		◎
【後】		フルオレサイト静注500mg 5mL		
【後】		フルマゼニール注射液0.5mg「ニプロ」 5mL(=アネキセート)		
		水溶性プレドニン10mg		
		プレベナー20水性懸濁注		
		プロジフ静注液200mg 8%2.5ml		◎
【後】		フロセミド注20mg「NIG」 1mL(=ラシックス)		△
		プロタノールL注0.2mg 1mL		
		プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 10mL		
		プロハンス静注シリンジ13mL		
		プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(=デイプリバン)		
		プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」(=デイプリバン)		
【後】		ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 2mL(=ビソルボン)		
	【危】	ベクティビックス点滴静注100mg 5mL	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」 0.36mL		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		ベクルリー点滴静注用100mg		
		(麻)ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 1mL		
		注射用ペニシリンGカリウム100万単位		○
【後】	【危】	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」 4mL(=アバスタ)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」 16mL(=アバスタ)	①抗悪性腫瘍剤	
		ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」		
		ヘパリンNa注5千単位/5ml		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL		
【後】		ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		
		ヘブスプリン-IH静注1000単位 5mL		
		ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL		
		ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL		
【後】	【危】	ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」 4mL	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】	【危】	ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」 20mL	①抗悪性腫瘍剤	◎
		ベルジピン注射液10mg 10mL		
【後】		ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」		
		ホスホマイシンNa静注用2g「NP」(=ホスミンS)		○
		ボスミン注1mg 1mL		
		ボトックス注用100単位		
		ポララミン注 5mg 1mL		
		ボルベン輸液6% 500mL		◎
		マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL		
		マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL		
		マキュエイド眼注用40mg		
		乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」		
	【危】	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	⑩糖尿病用剤	
【後】		ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(=ファンガード)		
		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(=ミノマイシン)		
		ミルセラ注シリンジ100μg 0.3mL		
		ミールビックII皮下注用(乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン)		
【後】		ミルリノン注22.5mgバッグ「タカタ」 150mL(=ミルリノK)		◎
		メイロン静注7% 20mL		
		メイロン静注7% 250mL		
【後】		メコバラミン注500μg「NP」 1mL		
【後】		メロペナム点滴静注用1g「明治」		○
		(麻)モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 1mL		○
		(麻)モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」 5mL		○
		ラクテックD輸液 500mL		
		ラクテック注 500mL		
		ラビアクタ点滴用バッグ300mg 60mL		◎
【後】	【危】	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	③不整脈用剤	
		ランマーク皮下注120mg 1.7mL		◎
		リクラスト点滴静注液5mg 100mL		
		リコモジュリン点滴静注用12800		◎
【後】	【危】	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 5mL	③不整脈用剤	
【後】	【危】	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	③不整脈用剤	
【後】		リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 300mL(=サイボックス)		○
		硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL		△
		リユープリンPRO注射用キット22.5mg		
		リンデロン注4mg		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】	【危】	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 5mL	④抗てんかん剤	○
【後】		レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(=クラビット)		◎
		レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」		
		レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」		
【後】		(麻)レミフェンタニル静注用2mg(=アルチバ)		
【後】		ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」(=エスラックス)		○
		ロピオン静注50mg 5mL		○
	【危】	ワソラン静注用5mg 2mL	③不整脈用剤	

腎：腎機能低下時の用量調節の重要度【◎：最重要，○：重要，△：要注意】（「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」）

※：「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」に記載なし（添付文書より判断）