

# 水稻作況試験情報 【令和3年産 早期コシヒカリ】

香川県農業試験場（6月9日現在）

移植期以降、最高気温は平年並み、最低気温はやや高く推移した。降水量はやや多く、日照時間は少なかった。田植40日後の調査では、過去5か年平均に比べ草丈は短く、茎数はやや多く、主稈葉数はやや少なかった。

## 1. 作況試験の方法


- 1) 供試品種：コシヒカリ
- 2) 播種期：4月9日      移植期：4月30日
- 3) 育苗方法：播種後、加温出芽させた後、ハウス内で緑化させ、その後は露地育苗した。
- 4) 栽植密度及び移植方法  
18.5 株/m<sup>2</sup> (30 cm×18 cm)、1 株 4 本程度、機械移植  
なお、生育調査株は移植後 1 株 4 本に調整した。
- 5) 本田施肥 (N成分kg/a)

	基肥	穂肥Ⅰ(予定)	穂肥Ⅱ(予定)
コシヒカリ	0.35	0.15	0.1

- 6) 使用肥料：化成肥料 (N : P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : K<sub>2</sub>O = 14 : 10 : 12%)

## 2. 具体的データ

令和3年産水稻 気象表 (播種～6月2半旬まで)



令和3年産 水稻作況試験生育調査結果(6月9日現在)

調査 (月/日)	供試品種 項目	早期コシヒカリ		
		本年	過去5か年平均値	差(比)
田植時 (4/30)	草丈(cm)	14.1	15.2	▲ 1.1
	主稈葉数(枚)	2.1	2.0	0.1
田植20日後 (5/20)	草丈(cm)	28.3	27.5	0.8
	茎数(本/m <sup>2</sup> )	149	144	3 %
	主稈葉数(枚)	5.3	5.5	▲ 0.2
田植30日後 (5/30)	草丈(cm)	31.0	34.3	▲ 3.3
	茎数(本/m <sup>2</sup> )	260	379	▲ 31 %
	主稈葉数(枚)	6.4	7.5	▲ 1.1
田植40日後 (6/9)	草丈(cm)	37.5	47.0	▲ 9.5
	茎数(本/m <sup>2</sup> )	627	609	3 %
	主稈葉数(枚)	8.5	9.0	▲ 0.5
田植50日後 (6/19)	草丈(cm)		59.5	
	茎数(本/m <sup>2</sup> )		614	%
	主稈葉数(枚)		9.9	
田植期(月/日)		4/30	5/1	▲ 1
幼穂形成始期(月/日)			6/23	
出穂期(月/日)			7/14	
主稈止葉葉数(枚)			12.2	
稈長(cm)			86.9	
穂長(cm)			18.3	
穂数(本/m <sup>2</sup> )			404.4	%
成熟期(月/日)			8/16	

注1) 差(比)は、過去5か年平均値との比較で示した。なお、茎数については対比(増減%)で表し、これ以外の項目については対差(実数値)で表した。なお▲は少ない、短い、早いことを示す。