

水稻作況試験情報 【令和8年産 早期コシヒカリ】

香川県農業試験場（成熟期）

移植後の気温はやや低い範囲で推移した。5月3半旬以降の最高気温は高く推移したが、6月1半旬以降平年並みから低い範囲で推移した。降水量は5月5半旬以降、周期的にまとまった降雨があった。日照時間は5月3、4半旬が多照であったが、6月1半旬以降は寡照傾向となった。7月3半旬以降は高温、多照、少雨で経過した。成熟期は8月16日で、過去5ヶ年平均と比べ1日早まり、稈長、穂長は同等、穂数はやや多くなった。

1. 作況試験の方法


- 1) 供試品種：コシヒカリ
 2) 播種期：4月10日 移植期：5月1日
 3) 育苗方法：播種後、加温出芽させた後、ハウス内で緑化、硬化させた。
 4) 栽植密度及び移植方法
 18.5株/㎡（30cm×18cm）、1株4本程度、機械移植
 なお、生育調査株は移植後1株4本に調整した。
 5) 本田施肥（N成分kg/a）

	基肥	穂肥Ⅰ（6/29）	穂肥Ⅱ（7/6）
コシヒカリ	0.35	0.15	0.1

- 6) 使用肥料：化成肥料（N：P₂O₅：K₂O＝14：10：12％）

2. 具体的データ

令和8年産水稻 気象表（播種～8月3半旬まで）



令和8年産 水稻作況試験生育調査結果(成熟期)

調 査 (月／日)	供試品種 項 目	早期コシヒカリ		
		本年	過去5か年平均値	差(比)
移植時 (5/1)	草丈(cm)	14.5	14.1	0.4
	主稈葉数(枚)	2.0	2.1	▲ 0.1
移植20日後 (5/21)	草丈(cm)	23.8	26.2	▲ 2.4
	茎数(本/㎡)	177	153	16 %
	主稈葉数(枚)	5.6	5.1	0.5
移植30日後 (5/31)	草丈(cm)	37.9	31.1	6.8
	茎数(本/㎡)	391	329	19 %
	主稈葉数(枚)	8.0	7.0	1.0
移植40日後 (6/10)	草丈(cm)	53.1	42.7	10.4
	茎数(本/㎡)	651	607	7 %
	主稈葉数(枚)	9.4	8.5	0.9
移植50日後 (6/20)	草丈(cm)	68.5	61.7	6.8
	茎数(本/㎡)	625	667	▲ 6 %
	主稈葉数(枚)	10.5	9.8	0.7
田植期(月／日)		5/1	5/1	0
幼穂形成始期(月／日)		6/23	6/24	▲ 1
出穂期(月／日)		7/14	7/14	0
主稈止葉葉数(枚)		13.0	12.4	0.6
稈長(cm)		92.8	90.7	2.1
穂長(cm)		20.3	20.5	▲ 0.2
穂数(本/㎡)		449	425	6 %
成熟期(月／日)		8/16	8/17	▲ 1

注1) 差(比)は、過去5か年平均値との比較で示した。なお、茎数・穂数については対比(増減%)で表し、これ以外の項目については対差(実数値)で表した。なお▲は少ない、短い、早いことを示す。