

水稲作況試験情報【令和8年産 普通期栽培】

香川県農業試験場（7月9日現在）

移植期以降、最高気温は平年より低く推移した。降水量は多雨で経過し、6月5半旬88.5mm、6月6半旬104mm、7月1半旬70mmの降雨があった。日照時間は、平年より寡照であった。移植時の調査では、過去5か年平均に比べ、草丈はヒノヒカリはやや長かった。田植20日後の調査では、草丈はコシヒカリでやや短く、茎数はコシヒカリ、おいでまいで少なく、主稈葉数はコシヒカリでやや少なかった。


1. 作況試験の方法

- 1) 供試品種：コシヒカリ、ヒノヒカリ、おいでまい
- 2) 播種期：5月29日 移植期：6月19日
- 3) 育苗方法：播種後、加温出芽させ、その後露地育苗した。
- 4) 栽植密度及び移植方法
18.5株/㎡（30cm×18cm）、1株4本程度、機械移植
なお、生育調査株は移植直後1株4本に調整した。
- 5) 本田施肥（N成分kg/a）

	基肥	穂肥Ⅰ（予定）	穂肥Ⅱ（予定）
コシヒカリ	0.3	0.15	0.10
ヒノヒカリ	0.5	0.25	0.15
おいでまい	0.5	0.25	0.15

- 6) 使用肥料：化成肥料（N：P₂O₅：K₂O＝14：10：12％）
- 7) 1区面積及び区制 1区250㎡（コシヒカリ500㎡）、2反復

2. 具体的データ



令和8年産 水稻作況試験生育調査結果(7月9日現在)

調 査 (月／日)	供試品種 項 目	コシヒカリ			ヒノヒカリ			おいでまい		
		本年	過去5か年 平均値	差(比)	本年	過去5か年 平均値	差(比)	本年	過去5か年 平均値	差(比)
移植時 (6/19)	草丈(cm)	14.7	14.4	0.3	12.6	11.7	0.9	11.0	11.2	▲ 0.2
	主稈葉数(枚)	2.3	2.4	▲ 0.1	2.6	2.6	0.0	2.6	2.5	0.1
移植20日後 (7/9)	草丈(cm)	36.3	39.3	▲ 3.0	29.6	30.4	▲ 0.8	30.5	31.5	▲ 1.0
	茎数(本/㎡)	234	265	▲ 12 %	299	310	▲ 4 %	308	351	▲ 12 %
	主稈葉数(枚)	7.0	7.4	▲ 0.4	7.3	7.6	▲ 0.3	7.5	7.8	▲ 0.3
移植30日後 (7/19)	草丈(cm)		60.3			50.0			50.2	
	茎数(本/㎡)		483	%		571	%		642	%
	主稈葉数(枚)		9.6			9.8			10.0	
移植40日後 (7/29)	草丈(cm)		76.9			68.6			68.9	
	茎数(本/㎡)		511	%		632	%		751	%
	主稈葉数(枚)		11.1			11.2			11.7	
播種期(月／日)		5/29	5/31	▲ 2	5/29	5/31	▲ 2	5/29	5/31	▲ 2
移植期(月／日)		6/19	6/20	▲ 1	6/19	6/20	▲ 1	6/19	6/20	▲ 1
幼穂形成始期(月／日)			7/25			8/4			8/6	
出穂期(月／日)			8/15			8/26			8/27	
主稈止葉葉位(枚)			12.8			14.1			14.7	
穂数(本/㎡)			409	%		470	%		495	%
稈長(cm)			96.6			87.9			87.1	
穂長(cm)			19.3			18.5			19.4	
成熟期(月／日)			9/18			10/3			10/3	