令和7年10月17日 香川県

野生いのししの豚熱(CSF) 感染確認検査(PCR検査)の結果について

令和7年4月1日から令和7年10月15日までの間に実施した野生いのししの感染 確認検査の結果、2頭陽性、186頭陰性となりました。

							_	•	
番号	発見•捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	成子 の別	体長	体重	検査日	検査 結果
1647	小豆島町	R7.5.2		雌	成獣	約90cm	約40kg	R7.5.13	陰性
1648	善通寺市	R7.6.2		雄	成獣	約70cm	約25kg	R7.6.10	陰性
1649	善通寺市	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R7.6.10	陰性
1650	多度津町	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約85cm	約40kg	R7.6.10	陰性
1651	多度津町	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R7.6.10	陰性
1652	丸亀市	R7.6.4		雄	成獣	約110cm	約50kg	R7.6.10	陰性
1653	丸亀市	R7.6.4		雌	成獣	約130cm		R7.6.10	陰性
1654	丸亀市	R7.6.4		雌	成獣	約125cm		R7.6.10	陰性
1655	三豊市	R7.6.5		雌	成獣	約100cm		R7.6.10	陰性
1656	多度津町	R7.6.9		雄	成獣	約110cm		R7.6.24	陰性
1657	坂出市	R7.6.15		雄	成獣	約105cm		R7.6.24	陰性
1658	高松市	R7.6.17		雄	成獣	約90cm	約25kg	R7.6.24	陽性54
1659	綾川町	R7.6.18		雄	成獣	約130cm		R7.6.24	陰性
1660	丸亀市	R7.6.18		雄	成獣	約110cm		R7.6.24	陰性
1661	高松市	R7.6.20		雌	成獣	約75cm	約40kg	R7.6.24	陰性
1662	高松市	R7.6.21		雌	成獣	約80cm	約45kg	R7.6.24	陰性
1663	高松市	R7.6.24		雄	成獣	約92cm	約20kg	R7.7.1	陰性
1664	高松市	R7.6.25		雄	成獣	約80cm	約30kg	R7.7.1	陰性
1665	高松市	R7.6.28		雄	成獣	約80cm	約40kg	R7.7.1	陰性
1666	高松市	R7.7.6		雌	成獣	約95cm	約20kg	R7.7.8	陰性
1667	多度津町	R7.7.4		雄	成獣	約126cm		R7.7.15	陰性
1668	坂出市	R7.7.4		雄	成獣	約95cm	約35kg	R7.7.15	陰性
1669	さぬき市	R7.7.9		雄	成獣	約110cm		R7.7.15	陰性
1670	善通寺市	R7.7.8		雌	成獣	約80cm	約30kg	R7.7.15	陰性
1671	坂出市 綾川町	R7.7.9		雌	幼獣	約55cm	約8kg	R7.7.15	陰性 陰性
1672 1673		R7.7.10 R7.7.13		雌雌	成獣		約36kg 約60kg	R7.7.15 R7.7.15	陰性
1674	高松市 小豆島町	R7.7.13		雄	成獣 成獣	約80cm		R7.7.15	陰性
1675	<u>小豆扁叫</u> 土庄町	R7.0.30		雌	成獣	約80cm	約24kg	R7.7.15	陰性
1676	小豆島町	R7.6.30		雄	成獣	約120cm	約17kg 約75kg	R7.7.15	陰性
1677	小豆島町	R7.7.2		雄	成獣	約85cm	約27kg	R7.7.15	陰性
1678	小豆島町	R7.7.4		雌	成獣	約80cm	約27kg	R7.7.15	陰性
1679	<u>小豆岛啊</u> 土庄町	R7.7.4		雄	成 <u>歌</u> 成獣	約120cm	約20kg 約70kg	R7.7.15	陰性
1680	小豆島町	R7.7.7	描獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R7.7.15	陰性
1681	小豆島町	R7.7.7	描獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R7.7.15	陰性
1682	小豆島町	R7.7.7	描獲	雄	幼獣	約50cm	約4kg	R7.7.15	陰性
1683	土庄町	R7.7.8	描獲	雄	成獣	約90cm	約26kg	R7.7.15	陽性55
1684	小豆島町	R7.7.9	描獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R7.7.15	陰性
1685	土庄町	R7.7.9		雌	成獣	約80cm	約26kg	R7.7.15	陰性
1686	土庄町	R7.7.14		雄	成獣	不明	約12kg	R7.7.29	陰性
1687	<u>工作引</u> 坂出市	R7.7.13		雄	成獣	約90cm	約50kg	R7.7.22	陰性
1688	高松市	R7.7.14		雌	成獣	約70cm	約35kg	R7.7.22	陰性
1689	高松市	R7.7.14		雄	成獣	約90cm	約27kg	R7.7.15	陰性
1690	高松市	R7.7.15		雄	成獣	約110cm		R7.7.22	陰性
1691	高松市	R7.7.15		雌	成獣	約100cm		R7.7.22	陰性
1692	さぬき市	R7.7.16		雌	成獣	約65cm	約30kg	R7.7.22	陰性
1693	さぬき市	R7.7.17		雄	成獣	約110cm		R7.7.22	陰性

1694	 高松市	R7.7.18 捕獲	雌	成獣	約76cm	約27kg	R7.7.22	陰性
1695	さぬき市	R7.7.19 捕獲	雄	成獣		約27kg 約50kg	R7.7.22	陰性
1696	高松市	R7.7.19 捕獲	雄	成獣	不明	約35kg	R7.7.22	陰性
1697	高松市	R7.7.19 捕獲	雌	成獣	約100cm		R7.7.29	陰性
1698	善通寺市	R7.7.19 捕獲	雄	成獣	約95cm	約30kg	R7.8.5	陰性
1699	高松市	R7.7.24 捕獲	雌	成獣	約120cm		R7.7.29	陰性
1700		R7.7.27 捕獲	雌	成獣	約100cm		R7.8.5	陰性
1701	<u> </u>	R7.7.29 捕獲	雌	成獣	約100cm		R7.8.5	陰性
1701	<u>- 音通寸巾</u> 高松市	R7.8.1 捕獲	雌	成獣	約120cm		R7.8.5	陰性
1703	高松市	R7.8.1 捕獲	雌	成獣	約125cm		R7.8.5	陰性
1704	高松市	R7.8.3 捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R7.8.5	陰性
1705	高松市	R7.8.2 捕獲	雄	成獣	約80cm	約28kg	R7.8.5	陰性
1706	さぬき市	R7.8.4 捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R7.8.5	陰性
1707	高松市	R7.8.5 捕獲	雌	成 <u>歌</u> 成獣	約90cm	約28kg	R7.8.12	陰性
1707	<u></u>	R7.7.23 捕獲	雌	幼獣	不明	約29kg	R7.8.12	陰性
1709	<u>工任</u> 町 土庄町	R7.7.27 捕獲	雄	成獣	約90cm	約27kg	R7.8.12	陰性
1710	工 <u>工工</u> 型 土庄町	R7.8.1 捕獲	雄	成獣	約77cm		R7.8.12	<u> 医圧</u> 陰性
1711	工 <u>年</u> 回 土庄町	R7.8.1 捕獲 R7.8.1 捕獲	<u>雄</u> 雄	<u>成</u> 成	<u>約77cm</u> 約85cm	約19kg 約28kg	R7.8.12	<u>陰性</u> 陰性
			<u>雄</u> 雄					陰性
1712	<u>土庄町</u>	R7.8.1 捕獲		成獣	約100cm	約35kg	R7.8.12	
1713	土庄町	R7.8.1 捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R7.8.12	陰性
1714	小豆島町	R7.8.1 捕獲	雄	幼獣	約30cm	約1kg	R7.8.12	陰性
1715	<u>土庄町</u>	R7.8.1 捕獲	雄	成獣	約88cm	約19kg	R7.8.12	陰性
1716	小豆島町	R7.8.1 捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1717	<u>土庄町</u>	R7.8.4 捕獲	雌	成獣	約50cm	約4kg	R7.8.12	陰性
1718	土庄町	R7.8.3 捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R7.8.12	陰性
1719	土庄町	R7.8.5 捕獲	雄	成獣	約100cm	約48kg	R7.8.12	陰性
1720	小豆島町	R7.8.5 捕獲	雄	成獣	約90cm	約33kg	R7.8.12	陰性
1721	小豆島町	R7.8.5 捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R7.8.12	陰性
1722	小豆島町	R7.8.6 捕獲	雄	成獣	約55cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1723	<u>高松市</u>	R7.8.6 捕獲	雄	成獣	約118cm	約42kg	R7.8.12	陰性
1724	<u> </u>	R7.8.6 捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1725	高松市	R7.8.7 捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1726	高松市	R7.8.8 捕獲	雌	成獣	約120cm	約33kg	R7.8.12	陰性
1727	善通寺市	R7.8.8 捕獲	雄	成獣	約85cm	約30kg	R7.8.19	陰性
1728	善通寺市	R7.8.13 捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R7.8.19	陰性
1729	丸亀市	R7.8.13 捕獲	雌	幼獣	約40cm	約3kg	R7.8.19	陰性
1730	さぬき市	R7.8.14 捕獲	雄	成獣	約101cm	約35kg	R7.8.19	陰性
1731	<u> </u>	R7.8.15 捕獲	雄	成獣	約110cm		R7.8.19	陰性
1732	高松市	R7.8.17 捕獲	雌	成獣	約90cm	約27kg	R7.8.19	陰性
1733	善通寺市	R7.8.19 捕獲	雄	成獣	約85cm	約30kg	R7.9.2	陰性
1734	さぬき市	R7.8.19 捕獲	雌	成獣	約65cm	約40kg	R7.8.26	陰性
1735	まんのう町	R7.8.20 死亡	雄	幼獣	約30cm	約3kg	R7.8.26	陰性
1736	綾川町	R7.8.20 捕獲	雄	成獣	約105cm	約30kg	R7.9.2	陰性
1737	<u> </u>	R7.8.20 捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R7.8.26	陰性
1738	<u> </u>	R7.8.20 捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8kg	R7.8.26	陰性
1739	<u> </u>	R7.8.21 捕獲	雄	幼獣	約50cm	約4kg	R7.8.26	陰性
1740	<u> </u>	R7.8.20 捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R7.8.26	陰性
1741	高松市	R7.8.22 捕獲	雌	成獣	約110cm		R7.8.26	陰性
1742	高松市	R7.8.22 捕獲	雌	幼獣	約65cm	約10kg	R7.8.26	陰性
1743	観音寺市	R7.8.23 捕獲	雌	幼獣	約40cm	約3kg	R7.9.2	陰性
1744	さぬき市	R7.8.22 捕獲	雄	成獣	約55cm	約35kg	R7.8.26	陰性
1745	高松市	R7.8.23 捕獲	雌	成獣	約100cm		R7.8.26	陰性
1746	高松市	R7.8.25 捕獲	雄	成獣	約97cm	約30kg	R7.8.26	陰性
1747	高松市	R7.8.25 捕獲	雌	成獣	約70cm	約12kg	R7.8.26	陰性
1748	高松市	R7.8.28 捕獲	雄	成獣	約100cm		R7.9.2	陰性
1749	高松市	R7.8.28 捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R7.9.2	陰性
1750	高松市	R7.8.31 捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R7.9.2	陰性
1751	綾川町	R7.9.1 捕獲	雌	成獣	約105cm	約40kg	R7.9.9	陰性
1752	高松市	R7.9.1 捕獲	雌	成獣	約74cm	約15kg	R7.9.2	陰性
1753	高松市	R7.9.1 捕獲	雄	成獣	約80cm	約16kg	R7.9.9	陰性
1754	三豊市	R7.9.4 捕獲	雌	成獣	約100cm		R7.9.9	陰性

1755 綾川町 R7.9.4 捕獲 雄 成獣 約120cm 約40kg 1756 高松市 R7.9.5 捕獲 雌 成獣 約103cm 約25kg 1757 高松市 R7.9.5 捕獲 雄 幼獣 約65cm 約8kg 1758 高松市 R7.9.8 捕獲 雌 成獣 約65cm 約8kg	R7.9.9 R7.9.9 R7.9.9	陰性 陰性
1757 高松市 R7.9.5 捕獲 雄 幼獣 約65cm 約8kg		11'25 12 1
1758 高松市 R7.9.8 捕獲 雌 成獣 約65cm 約8kg		陰性
	R7.9.9	陰性
1759 高松市 R7.9.8 捕獲 雌 成獣 約80cm 約30kg	R7.9.9	陰性
1760 高松市 R7.9.9 捕獲 雄 成獣 約10cm 約50kg	R7.9.16	陰性
1761 土庄町 R7.9.1 捕獲 不明 成獣 約101cm 約40kg	R7.9.16	陰性
1762 土庄町 R7.9.1 捕獲 雌 成獣 約105cm 約90kg	R7.9.16	陰性
1763 土庄町	R7.9.16	陰性
1764 小豆島町	R7.9.16	陰性
1765 小豆島町 R7.9.2 捕獲 雌 成獣 約82cm 約35kg	R7.9.16	陰性
1766 小豆島町 R7.9.2 捕獲 雄 幼獣 約50cm 約3kg	R7.9.16	陰性
1767 小豆島町 R7.9.2 捕獲 雄 成獣 約102cm 約30kg	R7.9.16	陰性
1768 小豆島町 R7.9.3 捕獲 雄 幼獣 約55cm 約4kg	R7.9.16	陰性
1769 小豆島町 R7.9.3 捕獲 雌 成獣 約85cm 約35kg	R7.9.16	陰性
1770 小豆島町 R7.9.3 捕獲 雄 幼獣 約55cm 約3kg	R7.9.16	陰性
1771 土庄町 R7.9.4 捕獲 雄 成獣 約105cm 約40kg	R7.9.16	陰性
1772 土庄町	R7.9.16	陰性
1773 土庄町 R7.9.9 捕獲 雄 幼獣 約55cm 約7kg	R7.9.16	陰性
1774 高松市 R7.9.9 捕獲 雌 幼獣 約70cm 約10kg	R7.9.16	陰性
1775 高松市 R7.8.20 捕獲 雄 成獸 約90cm 約38kg	R7.9.16	陰性
1776 多度津町 R7.9.11 捕獲 雄 成獣 約75cm 約25kg	R7.9.24	陰性
1777 さぬき市 R7.9.11 捕獲 雄 幼獣 約60cm 約10kg	R7.9.16	陰性
1778 高松市 R7.9.11 捕獲 雌 成獸 約90cm 約35kg	R7.9.16	陰性
1779 高松市 R7.9.10 捕獲 雄 成獸 約75cm 約15kg	R7.9.16	陰性
1780 さぬき市 R7.9.11 捕獲 雄 成獣 約93cm 約35kg	R7.9.16	陰性
1781 善通寺市	R7.9.24	陰性
1782 綾川町 R7.9.11 捕獲 雄 幼獣 約55cm 約5kg	R7.9.24	陰性
1783 高松市 R7.9.11 捕獲 雄 幼獣 約60cm 約6kg	R7.9.16	陰性
1784 綾川町 R7.9.12 捕獲 雄 成獣 約135cm 約70kg	R7.9.24	陰性
1785 高松市 R7.9.12 捕獲 雄 成獣 約150cm 約60kg	R7.9.16	陰性
1786 高松市 R7.9.12 捕獲 雄 幼獣 約65cm 約10kg	R7.9.16	陰性
1787 高松市	R7.9.16	陰性
1788 多度津町	R7.9.24	陰性
1789 高松市 R7.9.15 捕獲 雄 幼獣 約65cm 約10kg	R7.9.24	陰性
1790 高松市 R7.9.14 捕獲 雄 成獣 約120cm 約35kg	R7.9.24	陰性
1791 高松市	R7.9.24	陰性
1792 高松市	R7.9.24	陰性
1793 高松市 R7.9.14 捕獲 雌 成獣 約110cm 約50kg	R7.9.24	陰性
1794 高松市 R7.9.17 捕獲 雌 幼獣 約55cm 約8kg	R7.9.24	陰性
1795 高松市 R7.9.17 捕獲 雄 幼獣 約65cm 約10kg	R7.9.24	陰性
1796 高松市	R7.9.24	陰性
1797 高松市 R7.9.14 捕獲 雄 成獣 約104cm 約50kg	R7.9.24	陰性
1798 高松市 R7.9.17 捕獲 雄 成獣 約100cm 約30kg	R7.9.24	陰性
1799 多度津町 R7.9.17 捕獲 雄 成獣 約120cm 約30kg	R7.9.24	陰性
1800 善通寺市	R7.9.24	陰性
1801 高松市 R7.9.17 捕獲 雄 幼獣 約65cm 約10kg	R7.9.24	陰性
1802 高松市 R7.9.17 捕獲 雄 幼獣 約65cm 約10kg	R7.9.24	陰性
1803 高松市 R7.9.17 捕獲 雄 幼獣 約65cm 約10kg	R7.9.24	陰性
1804 多度津町	R7.9.24	陰性
1805 高松市 R7.9.18 捕獲 雄 成獣 約60cm 約10kg	R7.9.24	陰性
1806 高松市	R7.9.24	陰性
1807	R7.9.30	陰性
1808 善通寺市 R7.9.21 捕獲 雄 成獣 約75cm 約25kg	R7.9.30	陰性
1809 高松市 R7.9.21 捕獲 雄 幼獣 約46cm 約7kg	R7.9.24	陰性
1810 丸亀市 R7.9.22 捕獲 雌 成獣 約100cm 約60kg	R7.9.30	陰性
1811	R7.9.30	陰性
1812 さぬき市 R7.9.24 捕獲 雄 成獣 約60cm 約15kg	R7.9.30	陰性
1813 丸亀市	R7.9.30	陰性
1814 丸亀市	R7.9.30	陰性
[1815] 高松市 R7.9.27 捕獲 雄 成獣 約85cm 約30kg	R7.9.30	陰性

1816	高松市	R7.9.27 捕獲		成獣	約80cm	約23kg	R7.9.30	陰性
1817	善通寺市	R7.9.28 捕獲		成獣	約125cm	約40kg	R7.10.7	陰性
1818	丸亀市	R7.10.1 捕獲		成獣	約140cm	約120kg	R7.10.7	陰性
1819	土庄町	R7.10.1 捕獲		成獣	約60cm	約9kg	R7.10.7	陰性
1820	小豆島町	R7.10.1 捕獲		成獣	約110cm	約45kg	R7.10.7	陰性
1821	小豆島町	R7.10.1 捕獲		幼獣	約60cm	約9kg	R7.10.7	陰性
1822	小豆島町	R7.10.1 捕獲		成獣	約100cm	約60kg	R7.10.7	陰性
1823	小豆島町	R7.10.2 捕獲		成獣	約100cm	約40kg	R7.10.7	陰性
1824	土庄町	R7.10.2 捕獲		幼獣	約60cm	約6kg	R7.10.7	陰性
1825	小豆島町	R7.10.3 捕獲		成獣	約65cm	約15kg	R7.10.7	陰性
1826	高松市	R7.10.4 捕獲		成獣	約100cm	約40kg	R7.10.7	陰性
1827	高松市	R7.10.6 捕獲		成獣	約120cm	約60kg	R7.10.15	陰性
1828	高松市	R7.10.9 捕獲		幼獣	約45cm	約10kg	R7.10.15	陰性
1829	高松市	R7.10.9 捕獲		幼獣	約40cm	約8kg	R7.10.15	陰性
1830	高松市	R7.10.11 捕獲		成獣	約110cm	約45kg	R7.10.15	陰性
1831	高松市	R7.10.12 捕獲		成獣	約100cm	約45kg	R7.10.15	陰性
1832	高松市	R7.10.13 捕獲		成獣	約70cm	約10kg	R7.10.15	陰性
1833	高松市	R7.10.13 捕獲		成獣	約120cm	約110kg	R7.10.15	陰性
1834	高松市	R7.10.13 捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R7.10.15	陰性