## 令和7年11月28日 香川県

## 野生いのししの豚熱(CSF) 感染確認検査(PCR検査)の結果について

令和7年4月1日から令和7年11月26日までの間に実施した野生いのししの感染 確認検査の結果、2頭陽性、269頭陰性となりました。

番号	発見•捕獲場所	発見• 捕獲日	状態	性別	成子 の別	体長	体重	検査日	検査 結果
1647	小豆島町	R7.5.2		雌	成獣	約90cm	約40kg	R7.5.13	陰性
1648	善通寺市	R7.6.2	捕獲	雄	成獣	約70cm	約25kg	R7.6.10	陰性
1649	善通寺市	R7.6.4		雌	成獣	約100cm	約40kg	R7.6.10	陰性
1650	多度津町	R7.6.4		雌	成獣	約85cm	約40kg	R7.6.10	陰性
1651	多度津町	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R7.6.10	陰性
1652	丸亀市	R7.6.4	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R7.6.10	陰性
1653	丸亀市	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約130cm	約80kg	R7.6.10	陰性
1654	丸亀市	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約125cm	約80kg	R7.6.10	陰性
1655	三豊市	R7.6.5		雌	成獣	約100cm	約45kg	R7.6.10	陰性
1656	多度津町	R7.6.9		雄	成獣		約60kg	R7.6.24	陰性
1657	坂出市	R7.6.15		雄	成獣		約25kg	R7.6.24	陰性
1658	高松市	R7.6.17		雄	成獣	約90cm	約25kg	R7.6.24	陽性54
1659	綾川町	R7.6.18	捕獲	雄	成獣		約35kg	R7.6.24	陰性
1660	丸亀市	R7.6.18		雄	成獣	<u>約110cm</u>	約70kg	R7.6.24	陰性
1661	高松市	R7.6.20		雌	成獣	約75cm	約40kg	R7.6.24	陰性
1662	高松市	R7.6.21		雌	成獣	約80cm	約45kg	R7.6.24	陰性
1663	高松市	R7.6.24	捕獲	雄	成獣	約92cm	約20kg	R7.7.1	陰性
1664	高松市	R7.6.25		雄	成獣	約80cm	約30kg	R7.7.1	陰性
1665	高松市	R7.6.28		雄	成獣	約80cm	約40kg	R7.7.1	陰性
1666	高松市	R7.7.6		雌	成獣	約95cm	約20kg	R7.7.8	陰性
1667	多度津町	R7.7.4		雄	成獣		約75kg	R7.7.15	陰性
1668	坂出市	R7.7.4		雄	成獣	約95cm	約35kg	R7.7.15	陰性
1669	さぬき市	R7.7.9	捕獲	雄	成獣	<u>約110cm</u>	約35kg	R7.7.15	陰性
1670	善通寺市	R7.7.8		雌	成獣	約80cm	約30kg	R7.7.15	陰性
1671	坂出市	R7.7.9	捕獲	雌	幼獣	<u>約55cm</u>	約8kg	R7.7.15	陰性
1672	綾川町	R7.7.10	捕獲	雌	成獣	約115cm	約36kg	R7.7.15	陰性
1673	高松市	R7.7.13		雌	成獣	約125cm	約60kg	R7.7.15	陰性
1674	小豆島町	R7.6.30		雄	成獣	約80cm	約24kg	R7.7.15	陰性
1675	土庄町		捕獲	雌	成獣	約80cm	約17kg	R7.7.15	陰性
1676	小豆島町	R7.6.30		雄	成獣	約120cm	約75kg	R7.7.15	陰性
1677	小豆島町	R7.7.2		雄	成獣	約85cm	約27kg	R7.7.15	陰性
1678	小豆島町	R7.7.4	<u> </u>	雌	成獣	約80cm	約20kg	R7.7.15	陰性
1679	土庄町	R7.7.6		雄	成獣	約120cm	約70kg	R7.7.15	陰性
1680	小豆島町	R7.7.7		雌	<u> </u>	約115cm	約60kg	R7.7.15	陰性
1681	小豆島町	R7.7.7		雌	成獣	<u>約90cm</u>	約30kg	R7.7.15	陰性
1682	小豆島町	R7.7.7	抽獲	雄	幼獣	約50cm	約4kg	R7.7.15	陰性
1683	土庄町	R7.7.8	抽獲	雄	<u> </u>	約90cm	約26kg	R7.7.15	陽性55
1684	小豆島町	R7.7.9	<u>押獲</u>	雄	成獣	約80cm	約40kg	R7.7.15	陰性
1685	土庄町	R7.7.9	<u>押獲</u>	雌	成獣	約80cm	約26kg	R7.7.15	陰性
1686	土庄町	R7.7.14		雄	成獣	不明	約12kg	R7.7.29	陰性
1687	坂出市	R7.7.13		雄	成獣	約90cm	約50kg	R7.7.22	陰性
1688	高松市	R7.7.14	<u>押货</u>	雌	成獣	約70cm	約35kg	R7.7.22	陰性
1689	高松市	R7.7.14		雄	成獣	約90cm	約27kg	R7.7.15	陰性
1690	<u> </u>	R7.7.15		雄	成獣		約50kg	R7.7.22	陰性
1691	<u> </u>	R7.7.15		雌	成獣		約22kg	R7.7.22	陰性
1692	さぬき市	R7.7.16	抽獲	雌	成獣	約65cm	約30kg	R7.7.22	陰性
1693	さぬき市	R7.7.17	押货	雄	成獣	約110cm	約40kg	R7.7.22	陰性
1694	<u> </u>	R7.7.18		雌	成獣	約76cm	約27kg	R7.7.22	陰性
1695	さぬき市	R7.7.19	拥獲	雄	成獣	約112cm	約50kg	R7.7.22	陰性

1696	高松市	R7.7.19 捕獲	雄	成獣	不明	約35kg	R7.7.22	陰性
1697	高松市	R7.7.19 捕獲	雌	成獣		約40kg	R7.7.29	陰性
1698	善通寺市	R7.7.19 捕獲	雄	成獣	約95cm	約30kg	R7.8.5	陰性
1699	高松市	R7.7.24 捕獲	雌	成獣		約45kg	R7.7.29	陰性
1700	多度津町	R7.7.27 捕獲	雌	成獣		約50kg	R7.8.5	陰性
1701	善通寺市	R7.7.29 捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R7.8.5	陰性
1702	高松市	R7.8.1 捕獲	雌	成獣	約120cm	約41kg	R7.8.5	陰性
1703	高松市	R7.8.1 捕獲	雌	成獣	約125cm		R7.8.5	陰性
1704	高松市	R7.8.3 捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R7.8.5	陰性
1705	高松市	R7.8.2 捕獲	雄	成獣	約80cm	約28kg	R7.8.5	陰性
1706	さぬき市	R7.8.4 捕獲	雄	成獣		約30kg	R7.8.5	陰性
1707	<u> </u>	R7.8.5 捕獲	雌	成獣	<u>約90cm</u>	約28kg	R7.8.12	陰性
1708	<u> </u>	R7.7.23 捕獲	雌	幼獣	不明	約29kg	R7.8.12	陰性
1709	<u>土庄町</u>	R7.7.27 捕獲	雄	成獣	<u>約90cm</u>	約27kg	R7.8.12	陰性
1710	土庄町	R7.8.1 捕獲	雄	<u> </u>	約77cm	約19kg	R7.8.12	陰性
1711	土庄町	R7.8.1 捕獲	雄	成獣	約85cm	約28kg	R7.8.12	陰性
1712 1713	<u>土庄町</u> 土庄町	R7.8.1 捕獲	雄	成獣	約100cm	約35kg	R7.8.12	陰性
1714		R7.8.1 捕獲 R7.8.1 捕獲	雄雄	成獣	約110cm	がJOUKg 名与11kで	R7.8.12	陰性 陰性
1714	<u> </u>	R7.8.1 捕獲 R7.8.1 捕獲	雄	幼獣 成獣	約30cm 約88cm	約1kg 約19kg	R7.8.12 R7.8.12	陰性
1716		R7.8.1 捕獲 R7.8.1 捕獲	雌	<u>成</u>	約120cm	約19kg 約40kg	R7.8.12	陰性
1717		R7.8.4 捕獲	雌	成獣	約50cm	約4kg	R7.8.12	陰性
1718		R7.8.3 捕獲	雌	成獣	約120cm		R7.8.12	陰性
1719		R7.8.5 捕獲	雄	成獣		約48kg	R7.8.12	陰性
1720	小豆島町	R7.8.5 捕獲	雄	成獣	約90cm	約33kg	R7.8.12	陰性
1721	小豆島町	R7.8.5 捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R7.8.12	陰性
1722	小豆島町	R7.8.6 捕獲	雄	成獣	約55cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1723	高松市	R7.8.6 捕獲	雄	成獣	約118cm	約42kg	R7.8.12	陰性
1724	高松市	R7.8.6 捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1725	高松市	R7.8.7 捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1726	高松市	R7.8.8 捕獲	雌	成獣	約120cm	約33kg	R7.8.12	陰性
1727	善通寺市	R7.8.8 捕獲	雄	成獣	<u>約85cm</u>	約30kg	R7.8.19	陰性
1728	善通寺市	R7.8.13 捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R7.8.19	陰性
1729	<u> </u>	R7.8.13 捕獲	雌	幼獣	約40cm	約3kg	R7.8.19	陰性
1730	さぬき市	R7.8.14 捕獲	雄	成獣	<u>約101cm</u>	約35kg	R7.8.19	陰性
1731	<u> </u>	R7.8.15 捕獲	雄	成獣	約110cm	約51kg	R7.8.19	陰性
1732	高松市	R7.8.17 捕獲	雌	成獣	約90cm	約27kg	R7.8.19	陰性
1733	善き通寺市	R7.8.19 捕獲	雄	成獣	約85cm	約30kg	R7.9.2	陰性
1734 1735	<u>さぬき市</u> まんのう町	R7.8.19 捕獲 R7.8.20 死亡	雄雄	成獣 幼獣	約65cm 約30cm	約40kg 約3kg	R7.8.26 R7.8.26	<u>陰性</u> 陰性
1736	参川町	R7.8.20 捕獲	雄	成獣	約105cm	新30kg 終530kg	R7.9.2	陰性
1737		R7.8.20 捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R7.8.26	陰性
1738	高松市	R7.8.20 捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8kg	R7.8.26	陰性
1739	高松市	R7.8.21 捕獲	雄	幼獣	約50cm	約4kg	R7.8.26	陰性
1740	高松市	R7.8.20 捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R7.8.26	陰性
1741	高松市	R7.8.22 捕獲	雌	成獣	約110cm	約66kg	R7.8.26	陰性
1742	高松市 観音寺市	R7.8.22 捕獲	雌	幼獣	約65cm	約10kg	R7.8.26	陰性
1743	観音寺市	R7.8.23 捕獲	雌	幼獣	約40cm	約3kg	R7.9.2	陰性
1744	さぬき市	R7.8.22 捕獲	雄	成獣	約55cm	約35kg	R7.8.26	陰性
1745	高松市	R7.8.23 捕獲	雌	成獣	約100cm	約28kg	R7.8.26	陰性
1746	<u> </u>	R7.8.25 捕獲	雄	<u> </u>		約30kg	R7.8.26	陰性
1747	高松市	R7.8.25 捕獲	雌			約12kg	R7.8.26	陰性
1748	<u>高松市</u>	R7.8.28 捕獲	雄	成獣	約100cm		R7.9.2	陰性
1749	高松市	R7.8.28 捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R7.9.2	陰性
1750	<u>高松市</u> 参川町	R7.8.31 捕獲	雄雌	幼獣	約60cm	約8kg	R7.9.2	陰性
1751 1752	<u>綾川町</u> 高松市	R7.9.1 捕獲 R7.9.1 捕獲	<u>  唯</u>   雌	成獣 成獣	約105cm 約74cm	約40kg 約15kg	R7.9.9 R7.9.2	陰性 陰性
1752	<u> </u>	R7.9.1 捕獲 R7.9.1 捕獲	雄	成 <u>歌</u> 成獣	約74cm 約80cm	約16kg	R7.9.2	陰性
1754	三豊市	R7.9.4 捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R7.9.9	陰性
1755	—— <u>— 豆 II</u> 綾川町	R7.9.4 捕獲	雄	成獣	約120cm		R7.9.9	陰性
1756	高松市	R7.9.5 捕獲	雌	成獣	約103cm		R7.9.9	陰性
1757	高松市	R7.9.5 捕獲	雄	幼獣	約65cm	約8kg	R7.9.9	陰性
1758	高松市	R7.9.8 捕獲	雌	成獣	約65cm	約8kg	R7.9.9	陰性
1759	高松市	R7.9.8 捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R7.9.9	陰性

1700	÷ 1.1 +	D 2 0 0 1 <del>1 2</del> 7#	1+#	1 中 米1	145110	144501	ID7.0.40	100 h4
1760	高松市	R7.9.9 捕獲	雄品	成獣	約110cm		R7.9.16	陰性
1761	<u>土庄町</u>	R7.9.1 捕獲	不明	成獣	約101cm		R7.9.16	陰性
1762	<u>土庄町</u>	R7.9.1 捕獲	雌	成獣	約105cm		R7.9.16	陰性
1763	土庄町	R7.9.1 捕獲	雌	成獣	<u>約85cm</u>	約18kg	R7.9.16	陰性
1764	<u>小豆島町</u>	R7.9.1 捕獲	雌	<u>成獣</u>	約72cm	約53kg	R7.9.16	陰性
1765	小豆島町	R7.9.2 捕獲	雌	<u>成獣</u>	約82cm	約35kg	R7.9.16	陰性
1766	小豆島町	R7.9.2 捕獲	雄	幼獣	約50cm	約3kg	R7.9.16	陰性
1767	小豆島町	R7.9.2 捕獲	雄	成獣	<u>約102cm</u>	約30kg	R7.9.16	陰性
1768	小豆島町	R7.9.3 捕獲	雄	幼獣	約55cm	約4kg	R7.9.16	陰性
1769	小豆島町	R7.9.3 捕獲	雌	成獣	約85cm	約35kg	R7.9.16	陰性
1770	小豆島町	R7.9.3 捕獲	雄	<u> </u>	約55cm	約3kg	R7.9.16	陰性
1771	土庄町	R7.9.4 捕獲	雄	成獣	約105cm	約40kg	R7.9.16	陰性
1772	土庄町	R7.9.9 捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R7.9.16	陰性
1773	土庄町	R7.9.9 捕獲	雄	幼獣	約55cm	約7kg	R7.9.16	陰性
1774	<u> </u>	R7.9.9 捕獲	雌	<u> </u>	約70cm	約10kg	R7.9.16	<u>陰性</u>
1775	高松市	R7.8.20 捕獲	雄	成獣	約90cm	約38kg	R7.9.16	陰性
1776	多度津町	R7.9.11 捕獲	雄	成獣	<u>約75cm</u>	約25kg	R7.9.24	陰性
1777	さぬき市	R7.9.11 捕獲	雄	<u> </u>	<u>約60cm</u>	約10kg	R7.9.16	陰性
1778	<u> </u>	R7.9.11 捕獲	雌	成獣	約90cm	約35kg	R7.9.16	陰性
1779	高松市	R7.9.10 捕獲	雄	成獣	約75cm	約15kg	R7.9.16	陰性
1780	さぬき市	R7.9.11 捕獲	雄	成獣	約93cm	約35kg	R7.9.16	陰性
1781	善通寺市	R7.9.11 捕獲	雄	成獣		約60kg	R7.9.24	陰性
1782	<u>綾川町</u>	R7.9.11 捕獲	雄	幼獣	約55cm	約5kg	R7.9.24	陰性
1783	<u> </u>	R7.9.11 捕獲	雄	幼獣	約60cm	約6kg	R7.9.16	陰性
1784	<u>綾川町</u>	R7.9.12 捕獲	雄	成獣		約70kg	R7.9.24	陰性
1785	高松市	R7.9.12 捕獲	雄	成獣		約60kg	R7.9.16	陰性
1786	<u> </u>	R7.9.12 捕獲	雄	幼獣	<u>約65cm</u>	約10kg	R7.9.16	陰性
1787	<u>高松市</u>	R7.9.14 捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R7.9.16	陰性
1788	多度津町	R7.9.14 捕獲	雌	成獣	約85cm	約40kg	R7.9.24	陰性
1789	高松市	R7.9.15 捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10kg	R7.9.24	陰性
1790	高松市	R7.9.14 捕獲	雄	成獣		約35kg	R7.9.24	陰性
1791	高松市	R7.9.16 捕獲	雌	成獣	約100cm	がJ4UKg 名句のLan	R7.9.24	陰性
1792	高松市	R7.9.14 捕獲	雌	幼獣	約45cm	約6kg	R7.9.24	陰性
1793	<u> </u>	R7.9.14 捕獲	雌雌	成獣	約110cm	約50kg	R7.9.24	陰性
1794	高松市	R7.9.17 捕獲		幼獣	約55cm	約8kg	R7.9.24	陰性 陰性
1795	<u> </u>	R7.9.17 捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10kg	R7.9.24	
1796 1797	<u>高松市</u> 高松市	R7.9.14 捕獲 R7.9.14 捕獲	雄雄	成獣 成獣	約96cm	約40kg 約50kg	R7.9.24 R7.9.24	陰性 陰性
1797	高松市	R7.9.14 捕獲 R7.9.17 捕獲	雄	成獣	約104cm 約100cm	ポリンUKg 名与201cm	R7.9.24	陰性
1799	<u>同仏川</u> 多度津町	R7.9.17 捕獲 R7.9.17 捕獲	<u>雄</u>  雄	成 <u>款</u> 成獣	約120cm	またっつしゃ	R7.9.24	陰性
1800	善通寺市	R7.9.17 捕獲 R7.9.17 捕獲	雄	成獣	約130cm		R7.9.24	陰性
1801	高松市	R7.9.17 捕獲	雄	幼獣	約65cm	約40kg	R7.9.24	陰性
1802	高松市	R7.9.17 捕獲 R7.9.17 捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10kg	R7.9.24	陰性
1803	高松市	R7.9.17 捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10kg	R7.9.24	陰性
1804	多度津町	R7.9.18 捕獲	雌	成獣		約40kg	R7.9.24	陰性
1805	<u> </u>	R7.9.18 捕獲	雄	成獣	約60cm	約10kg	R7.9.24	陰性
1806	高松市	R7.9.18 捕獲	雄	成獣	約60cm	約10kg	R7.9.24	陰性
1807	綾川町	R7.9.15 捕獲	雄	成獣		約30kg	R7.9.30	陰性
1808	善通寺市	R7.9.21 捕獲	雄	成獣	約75cm	約25kg	R7.9.30	陰性
1809	高松市	R7.9.21 捕獲	雄	幼獣	約46cm	約7kg	R7.9.24	陰性
1810	丸亀市	R7.9.22 捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R7.9.30	陰性
1811	<u> </u>	R7.9.24 捕獲	雌	成獣	約114cm	約35kg	R7.9.30	陰性
1812	さぬき市	R7.9.24 捕獲	雄	成獣	約60cm	約15kg	R7.9.30	陰性
1813	丸亀市	R7.9.25 捕獲	雌	幼獣	約30cm	約10kg	R7.9.30	陰性
1814	丸亀市	R7.9.25 捕獲	雌	成獣		約80kg	R7.9.30	陰性
1815	高松市	R7.9.27 捕獲	雄	成獣	約85cm	約30kg	R7.9.30	陰性
1816	高松市	R7.9.27 捕獲	雌	成獣	約80cm	約23kg	R7.9.30	陰性
1817	善通寺市	R7.9.28 捕獲	雄	成獣		約40kg	R7.10.7	陰性
1818	丸亀市	R7.10.1 捕獲	雄	成獣	約140cm	約120kg	R7.10.7	陰性
1819	土庄町	R7.10.1 捕獲	雄	成獣	約60cm	約9kg	R7.10.7	陰性
1820	小豆島町	R7.10.1 捕獲	雌	成獣	約110cm		R7.10.7	陰性
1821	小豆島町	R7.10.1 捕獲	雄	幼獣	約60cm	約9kg	R7.10.7	陰性
1822	小豆島町	R7.10.1 捕獲	雄	成獣	約100cm		R7.10.7	陰性
1823	小豆島町	R7.10.2 捕獲	雄	成獣		約40kg	R7.10.7	陰性
			_		_			

			1."	171 375	161	141	I== =	
1824	土庄町	R7.10.2 捕獲	雄	<u>幼獣</u>	約60cm	約6kg	R7.10.7	陰性
1825	小豆島町	R7.10.3 捕獲	雄	成獣	約65cm	約15kg	R7.10.7	陰性
1826	高松市	R7.10.4 捕獲	雌	成獣		約40kg	R7.10.7	陰性
1827	<u> </u>	R7.10.4 捕獲	雌	成獣	約73cm	約18kg	R7.10.21	陰性
1828	<u> </u>	R7.10.6 捕獲	雄	成獣	約120cm	約60kg	R7.10.15	陰性
1829	<u> </u>	R7.10.9 捕獲	雄	幼獣	約45cm	約10kg	R7.10.15	陰性
1830	高松市	R7.10.9 捕獲	雌	幼獣	約40cm	約8kg	R7.10.15	陰性
1831	高松市	R7.10.11 捕獲	雄	成獣	<u>約110cm</u>	約45kg	R7.10.15	陰性
1832	高松市	R7.10.12 捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R7.10.15	陰性
1833	高松市	R7.10.13 捕獲	雌	成獣	約70cm	約10kg	R7.10.15	陰性
1834	高松市	R7.10.13 捕獲	雄	成獣	約120cm	約110kg	R7.10.15	陰性
1835	高松市	R7.10.13 捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R7.10.15	陰性
1836	綾川町	R7.10.15 捕獲	雌	成獣	約130cm	約60kg	R7.10.21	陰性
1837	坂出市	R7.10.16 捕獲	雄	成獣		約35kg	R7.10.21	陰性
1838	坂出市	R7.10.16 捕獲	雄	成獣	約75cm	約13kg	R7.10.21	陰性
1839	土庄町	R7.10.6 捕獲	雌	成獣	約70cm	約11kg	R7.10.21	陰性
1840	小豆島町	R7.10.8 捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R7.10.21	陰性
1841	小豆島町	R7.10.8 捕獲	雌	成獣	約95cm	約37kg	R7.10.21	陰性
1842	小豆島町	R7.10.10 捕獲	雄	成獣	約110cm	約45kg	R7.10.21	陰性
1843	土庁町	R7.10.10 捕獲	雌	成獣	約110cm	約45kg	R7.10.21	陰性
1844	小豆島町	R7.10.15 捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R7.10.21	陰性
1845	高松市	R7.10.17 捕獲	雄	成獣	約103cm	約40kg	R7.10.21	陰性
1846	高松市	R7.10.19 捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R7.10.21	陰性
1847	丸亀市	R7.10.19 捕獲	雄	成獣		約80kg	R7.10.28	陰性
1848	さぬき市	R7.10.22 捕獲	雌	幼獣	約80cm	約10kg	R7.10.28	陰性
1849	高松市	R7.10.21 捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R7.10.28	陰性
1850	高松市	R7.10.19 捕獲	雌	成獣	約110cm	約45kg	R7.10.28	陰性
1851	高松市	R7.10.22 捕獲	雄	成獣		約40kg	R7.10.28	陰性
1852	綾川町	R7.10.21 捕獲	雄	成獣	約120cm	約40kg	R7.10.28	陰性
1853	綾川町	R7.10.22 捕獲	雌	幼獣	約85cm	約10kg	R7.10.28	陰性
1854	高松市	R7.10.23 捕獲	雌	成獣	約90cm	約20kg	R7.10.28	陰性
1855	高松市	R7.10.25 捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R7.10.28	陰性
1856	丸亀市	R7.10.24 捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R7.11.5	陰性
1857	丸亀市	R7.10.27 捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R7.11.5	陰性
1858	高松市	R7.10.27 捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R7.10.28	陰性
1859		R7.10.27 死亡	雄	成獣	約110cm	約50kg	R7.11.5	陰性
1860	<u>三豊市</u> 高松市	R7.10.27 捕獲	雌	成獣	約60cm	約9kg	R7.11.5	陰性
1861	高松市	R7.10.27 捕獲	雄	成獣	約60cm	約10kg	R7.11.5	陰性
1862	高松市	R7.10.27 捕獲	雌	成獣	約118cm		R7.11.5	陰性
1863	丸亀市	R7.10.28 捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R7.11.5	陰性
1864	丸亀市	R7.10.28 捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R7.11.5	陰性
1865	まんのう町	R7.10.29 捕獲	雌	成獣	約65cm	約20kg	R7.11.5	陰性
1866	まんのう町	R7.10.29 捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R7.11.5	陰性
1867	観音寺市	R7.10.30 捕獲	雌	成獣	約85cm	約65kg	R7.11.5	陰性
1868	高松市	R7.10.30 捕獲	常明	成獣	約90cm	約40kg	R7.11.5	陰性
1869	= 曹市	R7.10.28 捕獲	雌	成獣	不明	約50kg	R7.11.11	陰性
1870	三三豊市三三豊市三三豊市三三豊市市三三皇豊市	R7.10.28 捕獲	雌	成獣	<b>不明</b>	約50kg	R7.11.11	陰性
1871	三豊市	R7.10.29 捕獲	不明	成獣	<b></b>	約60kg	R7.11.11	陰性
1872	三豊市	R7.10.30 捕獲	末前	成獣	不明	約70kg	R7.11.11	陰性
1873	三豊市	R7.10.30 死亡	雄	成獣	約110cm	約50kg	R7.11.5	陰性
1874	<u>参川</u> 町	R7.10.31 捕獲	雌	成獣	約133cm	約67kg	R7.11.11	陰性
1875	三木町	R7.11.1 捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R7.11.5	陰性
1876	さぬき市	R7.11.4 捕獲	雌	成獸	約100cm	約40kg	R7.11.5	陰性
1877	観音寺市	R7.11.1 捕獲	雄	幼獣		約10kg	R7.11.11	陰性
1878	さぬき市	R7.11.5 捕獲	雄	成獸	約100cm		R7.11.11	陰性
1879	三豊市	R7.11.1 捕獲	雄	成獣	約120cm		R7.11.11	陰性
1880	<u>ーー・</u> まんのう町	R7.11.5 捕獲	雄	成獣	約70cm	約25kg	R7.11.11	陰性
1881	綾川町	R7.11.5 捕獲	雌	成獣		約70kg	R7.11.11	陰性
1882	<u>綾川町</u>	R7.11.5 捕獲	雌	幼獣	約83cm	約20kg	R7.11.11	陰性
1883	善通寺市	R7.11.6 捕獲	雄	成獣	約130cm	約60kg	R7.11.11	陰性
1884	高松市	R7.11.6 捕獲	雄	幼獣	約68cm	約6kg	R7.11.11	陰性
1885	坂出市	R7.11.5 捕獲	雌	成獣	約71cm	約18kg	R7.11.11	陰性
1886	坂出市	R7.11.5 捕獲	雌	成獸	約75cm	約22kg	R7.11.11	陰性
1887	<u> </u>	R7.11.6 捕獲	雄	成獣	約97cm	約18kg	R7.11.11	陰性
	リスノコロナ	11/11/11/11/11/12	I WIT	1/2/ 1//	1110 / 05/11	אוט ו ביוין	1	14

1888	三豊市	R7.11.6 挥	甫獲	雌	成獣	不明	約60kg	R7.11.11	陰性
1889	高松市	R7.11.7 扣	甫獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R7.11.11	陰性
1890	高松市	R7.11.7 拆	甫獲	雄	幼獣	約60cm	約12kg	R7.11.11	陰性
1891	高松市	R7.11.7 拆	甫獲	雌	幼獣	約60cm	約13kg	R7.11.11	陰性
1892	高松市	R7.11.8 拆	甫獲	雄	幼獣	約70cm	約8kg	R7.11.11	陰性
1893	高松市		甫獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R7.11.11	陰性
1894	坂出市	R7.11.10 拆	甫獲	雌	幼獣	約70cm	約15kg		陰性
1895	東かがわ市	R7.11.11 拆	甫獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R7.11.11	陰性
1896	高松市	R7.11.12 排	甫獲	雌	成獣		約42kg		陰性
1897	綾川町		甫獲	雄	成獣	約134cm	約60kg	R7.11.25	陰性
1898	綾川町		甫獲	雄	成獣	約89cm	約25kg	R7.11.25	陰性
1899	高松市		甫獲	不明	成獣	約60cm	約10kg		陰性
1900	高松市	R7.11.15 打		雄	成獣	約90cm	約25kg		陰性
1901	まんのう町	R7.11.16 打	甫獲	雌	成獣	不明	約60kg		陰性
1902	綾川町		甫獲	雄	成獣	約140cm	約60kg	R7.11.25	陰性
1903	土庄町		甫獲	雄	成獣	約100cm	約50kg		陰性
1904	土庄町		甫獲	雄	成獣	約60cm	約15kg	R7.11.25	陰性
1905	土庄町	R7.11.4 指		雄	成獣	約100cm	約29kg	R7.11.25	陰性
1906	小豆島町		甫獲	雄	幼獣	約65cm	約6kg		陰性
1907	小豆島町		甫獲	雄	成獣	約70cm	約17kg		陰性
1908	小豆島町	R7.11.5 打		雄	成獣	約75cm	約20kg		陰性
1909	小豆島町	R7.11.5 打		雌	成獣	約100cm	約35kg	R7.11.25	陰性
1910	小豆島町	R7.11.5 排	甫獲	雄	成獣	約60cm	約15kg		陰性
1911	<u>土庄町</u>		甫獲	雌	成獣	約65cm	約8kg	R7.11.25	陰性
1912	小豆島町	R7.11.10 扣		雄	成獣	約115cm	約50kg		陰性
1913	小豆島町		<u> </u>	雄	成獣	約70cm	約15kg	R7.11.25	陰性
1914	<u> </u>	R7.11.11 打	<u> 東獲</u>	雄	成獣	約105cm	約40kg		陰性
1915	土庄町		<u> 東獲</u>	雄	成獣	約65cm	約9kg	R7.11.25	陰性
1916	高松市		<u> </u>	雌	成獣	約70cm	約20kg		陰性
1917	高松市	R7.11.21 拆	甫獲	雌	成獣	約60cm	約15kg	R7.11.25	陰性