

令和8年1月9日  
香川県

野生いのししの豚熱(CSF)  
感染確認検査(PCR検査)の結果について

令和7年4月1日から令和8年1月7日までの間に実施した野生いのししの感染確認検査の結果、2頭陽性、297頭陰性となりました。

| 番号   | 発見・捕獲場所 | 発見・<br>捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子<br>の別 | 体長     | 体重    | 検査日     | 検査<br>結果 |
|------|---------|------------|----|----|----------|--------|-------|---------|----------|
| 1647 | 小豆島町    | R7.5.2     | 死亡 | 雌  | 成獣       | 約90cm  | 約40kg | R7.5.13 | 陰性       |
| 1648 | 善通寺市    | R7.6.2     | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約70cm  | 約25kg | R7.6.10 | 陰性       |
| 1649 | 善通寺市    | R7.6.4     | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約100cm | 約40kg | R7.6.10 | 陰性       |
| 1650 | 多度津町    | R7.6.4     | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約85cm  | 約40kg | R7.6.10 | 陰性       |
| 1651 | 多度津町    | R7.6.4     | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約70cm  | 約20kg | R7.6.10 | 陰性       |
| 1652 | 丸亀市     | R7.6.4     | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約110cm | 約50kg | R7.6.10 | 陰性       |
| 1653 | 丸亀市     | R7.6.4     | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約130cm | 約80kg | R7.6.10 | 陰性       |
| 1654 | 丸亀市     | R7.6.4     | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約125cm | 約80kg | R7.6.10 | 陰性       |
| 1655 | 三豊市     | R7.6.5     | 死亡 | 雌  | 成獣       | 約100cm | 約45kg | R7.6.10 | 陰性       |
| 1656 | 多度津町    | R7.6.9     | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約110cm | 約60kg | R7.6.24 | 陰性       |
| 1657 | 坂出市     | R7.6.15    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約105cm | 約25kg | R7.6.24 | 陰性       |
| 1658 | 高松市     | R7.6.17    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約90cm  | 約25kg | R7.6.24 | 陽性54     |
| 1659 | 綾川町     | R7.6.18    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約130cm | 約35kg | R7.6.24 | 陰性       |
| 1660 | 丸亀市     | R7.6.18    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約110cm | 約70kg | R7.6.24 | 陰性       |
| 1661 | 高松市     | R7.6.20    | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約75cm  | 約40kg | R7.6.24 | 陰性       |
| 1662 | 高松市     | R7.6.21    | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約80cm  | 約45kg | R7.6.24 | 陰性       |
| 1663 | 高松市     | R7.6.24    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約92cm  | 約20kg | R7.7.1  | 陰性       |
| 1664 | 高松市     | R7.6.25    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約80cm  | 約30kg | R7.7.1  | 陰性       |
| 1665 | 高松市     | R7.6.28    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約80cm  | 約40kg | R7.7.1  | 陰性       |
| 1666 | 高松市     | R7.7.6     | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約95cm  | 約20kg | R7.7.8  | 陰性       |
| 1667 | 多度津町    | R7.7.4     | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約126cm | 約75kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1668 | 坂出市     | R7.7.4     | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約95cm  | 約35kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1669 | さぬき市    | R7.7.9     | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約110cm | 約35kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1670 | 善通寺市    | R7.7.8     | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約80cm  | 約30kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1671 | 坂出市     | R7.7.9     | 捕獲 | 雌  | 幼獣       | 約55cm  | 約8kg  | R7.7.15 | 陰性       |
| 1672 | 綾川町     | R7.7.10    | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約115cm | 約36kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1673 | 高松市     | R7.7.13    | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約125cm | 約60kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1674 | 小豆島町    | R7.6.30    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約80cm  | 約24kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1675 | 土庄町     | R7.7.1     | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約80cm  | 約17kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1676 | 小豆島町    | R7.6.30    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約120cm | 約75kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1677 | 小豆島町    | R7.7.2     | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約85cm  | 約27kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1678 | 小豆島町    | R7.7.4     | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約80cm  | 約20kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1679 | 土庄町     | R7.7.6     | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約120cm | 約70kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1680 | 小豆島町    | R7.7.7     | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約115cm | 約60kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1681 | 小豆島町    | R7.7.7     | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約90cm  | 約30kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1682 | 小豆島町    | R7.7.7     | 捕獲 | 雄  | 幼獣       | 約50cm  | 約4kg  | R7.7.15 | 陰性       |
| 1683 | 土庄町     | R7.7.8     | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約90cm  | 約26kg | R7.7.15 | 陽性55     |
| 1684 | 小豆島町    | R7.7.9     | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約80cm  | 約40kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1685 | 土庄町     | R7.7.9     | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約80cm  | 約26kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1686 | 土庄町     | R7.7.14    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 不明     | 約12kg | R7.7.29 | 陰性       |
| 1687 | 坂出市     | R7.7.13    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約90cm  | 約50kg | R7.7.22 | 陰性       |
| 1688 | 高松市     | R7.7.14    | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約70cm  | 約35kg | R7.7.22 | 陰性       |
| 1689 | 高松市     | R7.7.14    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約90cm  | 約27kg | R7.7.15 | 陰性       |
| 1690 | 高松市     | R7.7.15    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約110cm | 約50kg | R7.7.22 | 陰性       |
| 1691 | 高松市     | R7.7.15    | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約100cm | 約22kg | R7.7.22 | 陰性       |
| 1692 | さぬき市    | R7.7.16    | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約65cm  | 約30kg | R7.7.22 | 陰性       |
| 1693 | さぬき市    | R7.7.17    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約110cm | 約40kg | R7.7.22 | 陰性       |
| 1694 | 高松市     | R7.7.18    | 捕獲 | 雌  | 成獣       | 約76cm  | 約27kg | R7.7.22 | 陰性       |
| 1695 | さぬき市    | R7.7.19    | 捕獲 | 雄  | 成獣       | 約112cm | 約50kg | R7.7.22 | 陰性       |

|      |       |         |    |   |    |        |       |         |    |
|------|-------|---------|----|---|----|--------|-------|---------|----|
| 1696 | 高松市   | R7.7.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明     | 約35kg | R7.7.22 | 陰性 |
| 1697 | 高松市   | R7.7.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R7.7.29 | 陰性 |
| 1698 | 善通寺市  | R7.7.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm  | 約30kg | R7.8.5  | 陰性 |
| 1699 | 高松市   | R7.7.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約45kg | R7.7.29 | 陰性 |
| 1700 | 多度津町  | R7.7.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R7.8.5  | 陰性 |
| 1701 | 善通寺市  | R7.7.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R7.8.5  | 陰性 |
| 1702 | 高松市   | R7.8.1  | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約41kg | R7.8.5  | 陰性 |
| 1703 | 高松市   | R7.8.1  | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約125cm | 約41kg | R7.8.5  | 陰性 |
| 1704 | 高松市   | R7.8.3  | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm  | 約7kg  | R7.8.5  | 陰性 |
| 1705 | 高松市   | R7.8.2  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm  | 約28kg | R7.8.5  | 陰性 |
| 1706 | さぬき市  | R7.8.4  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R7.8.5  | 陰性 |
| 1707 | 高松市   | R7.8.5  | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm  | 約28kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1708 | 土庄町   | R7.7.23 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 不明     | 約29kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1709 | 土庄町   | R7.7.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm  | 約27kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1710 | 土庄町   | R7.8.1  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約77cm  | 約19kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1711 | 土庄町   | R7.8.1  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm  | 約28kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1712 | 土庄町   | R7.8.1  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1713 | 土庄町   | R7.8.1  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1714 | 小豆島町  | R7.8.1  | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約30cm  | 約1kg  | R7.8.12 | 陰性 |
| 1715 | 土庄町   | R7.8.1  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約88cm  | 約19kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1716 | 小豆島町  | R7.8.1  | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1717 | 土庄町   | R7.8.4  | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約50cm  | 約4kg  | R7.8.12 | 陰性 |
| 1718 | 土庄町   | R7.8.3  | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1719 | 土庄町   | R7.8.5  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約48kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1720 | 小豆島町  | R7.8.5  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm  | 約33kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1721 | 小豆島町  | R7.8.5  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm  | 約30kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1722 | 小豆島町  | R7.8.6  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約55cm  | 約40kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1723 | 高松市   | R7.8.6  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約118cm | 約42kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1724 | 高松市   | R7.8.6  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm  | 約40kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1725 | 高松市   | R7.8.7  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1726 | 高松市   | R7.8.8  | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約33kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1727 | 善通寺市  | R7.8.8  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm  | 約30kg | R7.8.19 | 陰性 |
| 1728 | 善通寺市  | R7.8.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm  | 約35kg | R7.8.19 | 陰性 |
| 1729 | 丸亀市   | R7.8.13 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約40cm  | 約3kg  | R7.8.19 | 陰性 |
| 1730 | さぬき市  | R7.8.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約101cm | 約35kg | R7.8.19 | 陰性 |
| 1731 | 高松市   | R7.8.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約51kg | R7.8.19 | 陰性 |
| 1732 | 高松市   | R7.8.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm  | 約27kg | R7.8.19 | 陰性 |
| 1733 | 善通寺市  | R7.8.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm  | 約30kg | R7.9.2  | 陰性 |
| 1734 | さぬき市  | R7.8.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm  | 約40kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1735 | まんのう町 | R7.8.20 | 死亡 | 雄 | 幼獣 | 約30cm  | 約3kg  | R7.8.26 | 陰性 |
| 1736 | 綾川町   | R7.8.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約30kg | R7.9.2  | 陰性 |
| 1737 | 高松市   | R7.8.20 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm  | 約7kg  | R7.8.26 | 陰性 |
| 1738 | 高松市   | R7.8.20 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm  | 約8kg  | R7.8.26 | 陰性 |
| 1739 | 高松市   | R7.8.21 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm  | 約4kg  | R7.8.26 | 陰性 |
| 1740 | 高松市   | R7.8.20 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm  | 約7kg  | R7.8.26 | 陰性 |
| 1741 | 高松市   | R7.8.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約66kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1742 | 高松市   | R7.8.22 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約65cm  | 約10kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1743 | 観音寺市  | R7.8.23 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約40cm  | 約3kg  | R7.9.2  | 陰性 |
| 1744 | さぬき市  | R7.8.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約55cm  | 約35kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1745 | 高松市   | R7.8.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約28kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1746 | 高松市   | R7.8.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約97cm  | 約30kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1747 | 高松市   | R7.8.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm  | 約12kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1748 | 高松市   | R7.8.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R7.9.2  | 陰性 |
| 1749 | 高松市   | R7.8.28 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm  | 約8kg  | R7.9.2  | 陰性 |
| 1750 | 高松市   | R7.8.31 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm  | 約8kg  | R7.9.2  | 陰性 |
| 1751 | 綾川町   | R7.9.1  | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約40kg | R7.9.9  | 陰性 |
| 1752 | 高松市   | R7.9.1  | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約74cm  | 約15kg | R7.9.2  | 陰性 |
| 1753 | 高松市   | R7.9.1  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm  | 約16kg | R7.9.9  | 陰性 |
| 1754 | 三豊市   | R7.9.4  | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R7.9.9  | 陰性 |
| 1755 | 綾川町   | R7.9.4  | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R7.9.9  | 陰性 |
| 1756 | 高松市   | R7.9.5  | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約103cm | 約25kg | R7.9.9  | 陰性 |
| 1757 | 高松市   | R7.9.5  | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm  | 約8kg  | R7.9.9  | 陰性 |
| 1758 | 高松市   | R7.9.8  | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm  | 約8kg  | R7.9.9  | 陰性 |
| 1759 | 高松市   | R7.9.8  | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm  | 約30kg | R7.9.9  | 陰性 |

|      |      |         |    |    |    |        |        |         |    |
|------|------|---------|----|----|----|--------|--------|---------|----|
| 1760 | 高松市  | R7.9.9  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約110cm | 約50kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1761 | 土庄町  | R7.9.1  | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 約101cm | 約40kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1762 | 土庄町  | R7.9.1  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約105cm | 約90kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1763 | 土庄町  | R7.9.1  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約85cm  | 約18kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1764 | 小豆島町 | R7.9.1  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約72cm  | 約53kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1765 | 小豆島町 | R7.9.2  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約82cm  | 約35kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1766 | 小豆島町 | R7.9.2  | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約50cm  | 約3kg   | R7.9.16 | 陰性 |
| 1767 | 小豆島町 | R7.9.2  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約102cm | 約30kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1768 | 小豆島町 | R7.9.3  | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約55cm  | 約4kg   | R7.9.16 | 陰性 |
| 1769 | 小豆島町 | R7.9.3  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約85cm  | 約35kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1770 | 小豆島町 | R7.9.3  | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約55cm  | 約3kg   | R7.9.16 | 陰性 |
| 1771 | 土庄町  | R7.9.4  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約105cm | 約40kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1772 | 土庄町  | R7.9.9  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約90cm  | 約30kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1773 | 土庄町  | R7.9.9  | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約55cm  | 約7kg   | R7.9.16 | 陰性 |
| 1774 | 高松市  | R7.9.9  | 捕獲 | 雌  | 幼獣 | 約70cm  | 約10kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1775 | 高松市  | R7.8.20 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約90cm  | 約38kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1776 | 多度津町 | R7.9.11 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約75cm  | 約25kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1777 | さぬき市 | R7.9.11 | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約60cm  | 約10kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1778 | 高松市  | R7.9.11 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約90cm  | 約35kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1779 | 高松市  | R7.9.10 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約75cm  | 約15kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1780 | さぬき市 | R7.9.11 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約93cm  | 約35kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1781 | 善通寺市 | R7.9.11 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約120cm | 約60kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1782 | 綾川町  | R7.9.11 | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約55cm  | 約5kg   | R7.9.24 | 陰性 |
| 1783 | 高松市  | R7.9.11 | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約60cm  | 約6kg   | R7.9.16 | 陰性 |
| 1784 | 綾川町  | R7.9.12 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約135cm | 約70kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1785 | 高松市  | R7.9.12 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約150cm | 約60kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1786 | 高松市  | R7.9.12 | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約65cm  | 約10kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1787 | 高松市  | R7.9.14 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約80cm  | 約20kg  | R7.9.16 | 陰性 |
| 1788 | 多度津町 | R7.9.14 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約85cm  | 約40kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1789 | 高松市  | R7.9.15 | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約65cm  | 約10kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1790 | 高松市  | R7.9.14 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約120cm | 約35kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1791 | 高松市  | R7.9.16 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約100cm | 約40kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1792 | 高松市  | R7.9.14 | 捕獲 | 雌  | 幼獣 | 約45cm  | 約6kg   | R7.9.24 | 陰性 |
| 1793 | 高松市  | R7.9.14 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約110cm | 約50kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1794 | 高松市  | R7.9.17 | 捕獲 | 雌  | 幼獣 | 約55cm  | 約8kg   | R7.9.24 | 陰性 |
| 1795 | 高松市  | R7.9.17 | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約65cm  | 約10kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1796 | 高松市  | R7.9.14 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約96cm  | 約40kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1797 | 高松市  | R7.9.14 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約104cm | 約50kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1798 | 高松市  | R7.9.17 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約100cm | 約30kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1799 | 多度津町 | R7.9.17 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約120cm | 約30kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1800 | 善通寺市 | R7.9.17 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約130cm | 約45kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1801 | 高松市  | R7.9.17 | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約65cm  | 約10kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1802 | 高松市  | R7.9.17 | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約65cm  | 約10kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1803 | 高松市  | R7.9.17 | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約65cm  | 約10kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1804 | 多度津町 | R7.9.18 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約105cm | 約40kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1805 | 高松市  | R7.9.18 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約60cm  | 約10kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1806 | 高松市  | R7.9.18 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約60cm  | 約10kg  | R7.9.24 | 陰性 |
| 1807 | 綾川町  | R7.9.15 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約110cm | 約30kg  | R7.9.30 | 陰性 |
| 1808 | 善通寺市 | R7.9.21 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約75cm  | 約25kg  | R7.9.30 | 陰性 |
| 1809 | 高松市  | R7.9.21 | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約46cm  | 約7kg   | R7.9.24 | 陰性 |
| 1810 | 丸亀市  | R7.9.22 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約100cm | 約60kg  | R7.9.30 | 陰性 |
| 1811 | 綾川町  | R7.9.24 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約114cm | 約35kg  | R7.9.30 | 陰性 |
| 1812 | さぬき市 | R7.9.24 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約60cm  | 約15kg  | R7.9.30 | 陰性 |
| 1813 | 丸亀市  | R7.9.25 | 捕獲 | 雌  | 幼獣 | 約30cm  | 約10kg  | R7.9.30 | 陰性 |
| 1814 | 丸亀市  | R7.9.25 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約110cm | 約80kg  | R7.9.30 | 陰性 |
| 1815 | 高松市  | R7.9.27 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約85cm  | 約30kg  | R7.9.30 | 陰性 |
| 1816 | 高松市  | R7.9.27 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約80cm  | 約23kg  | R7.9.30 | 陰性 |
| 1817 | 善通寺市 | R7.9.28 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約125cm | 約40kg  | R7.10.7 | 陰性 |
| 1818 | 丸亀市  | R7.10.1 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約140cm | 約120kg | R7.10.7 | 陰性 |
| 1819 | 土庄町  | R7.10.1 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約60cm  | 約9kg   | R7.10.7 | 陰性 |
| 1820 | 小豆島町 | R7.10.1 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約110cm | 約45kg  | R7.10.7 | 陰性 |
| 1821 | 小豆島町 | R7.10.1 | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約60cm  | 約9kg   | R7.10.7 | 陰性 |
| 1822 | 小豆島町 | R7.10.1 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約100cm | 約60kg  | R7.10.7 | 陰性 |
| 1823 | 小豆島町 | R7.10.2 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約100cm | 約40kg  | R7.10.7 | 陰性 |

|      |       |          |    |    |    |        |        |          |    |
|------|-------|----------|----|----|----|--------|--------|----------|----|
| 1824 | 土庄町   | R7.10.2  | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約60cm  | 約6kg   | R7.10.7  | 陰性 |
| 1825 | 小豆島町  | R7.10.3  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約65cm  | 約15kg  | R7.10.7  | 陰性 |
| 1826 | 高松市   | R7.10.4  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約100cm | 約40kg  | R7.10.7  | 陰性 |
| 1827 | 坂出市   | R7.10.4  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約73cm  | 約18kg  | R7.10.21 | 陰性 |
| 1828 | 高松市   | R7.10.6  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約120cm | 約60kg  | R7.10.15 | 陰性 |
| 1829 | 高松市   | R7.10.9  | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約45cm  | 約10kg  | R7.10.15 | 陰性 |
| 1830 | 高松市   | R7.10.9  | 捕獲 | 雌  | 幼獣 | 約40cm  | 約8kg   | R7.10.15 | 陰性 |
| 1831 | 高松市   | R7.10.11 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約110cm | 約45kg  | R7.10.15 | 陰性 |
| 1832 | 高松市   | R7.10.12 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約100cm | 約45kg  | R7.10.15 | 陰性 |
| 1833 | 高松市   | R7.10.13 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約70cm  | 約10kg  | R7.10.15 | 陰性 |
| 1834 | 高松市   | R7.10.13 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約120cm | 約110kg | R7.10.15 | 陰性 |
| 1835 | 高松市   | R7.10.13 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約80cm  | 約20kg  | R7.10.15 | 陰性 |
| 1836 | 綾川町   | R7.10.15 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約130cm | 約60kg  | R7.10.21 | 陰性 |
| 1837 | 坂出市   | R7.10.16 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約105cm | 約35kg  | R7.10.21 | 陰性 |
| 1838 | 坂出市   | R7.10.16 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約75cm  | 約13kg  | R7.10.21 | 陰性 |
| 1839 | 土庄町   | R7.10.6  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約70cm  | 約11kg  | R7.10.21 | 陰性 |
| 1840 | 小豆島町  | R7.10.8  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約70cm  | 約20kg  | R7.10.21 | 陰性 |
| 1841 | 小豆島町  | R7.10.8  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約95cm  | 約37kg  | R7.10.21 | 陰性 |
| 1842 | 小豆島町  | R7.10.10 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約110cm | 約45kg  | R7.10.21 | 陰性 |
| 1843 | 土庄町   | R7.10.10 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約110cm | 約45kg  | R7.10.21 | 陰性 |
| 1844 | 小豆島町  | R7.10.15 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約110cm | 約50kg  | R7.10.21 | 陰性 |
| 1845 | 高松市   | R7.10.17 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約103cm | 約40kg  | R7.10.21 | 陰性 |
| 1846 | 高松市   | R7.10.19 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約90cm  | 約35kg  | R7.10.21 | 陰性 |
| 1847 | 丸亀市   | R7.10.19 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約120cm | 約80kg  | R7.10.28 | 陰性 |
| 1848 | さぬき市  | R7.10.22 | 捕獲 | 雌  | 幼獣 | 約80cm  | 約10kg  | R7.10.28 | 陰性 |
| 1849 | 高松市   | R7.10.21 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約90cm  | 約35kg  | R7.10.28 | 陰性 |
| 1850 | 高松市   | R7.10.19 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約110cm | 約45kg  | R7.10.28 | 陰性 |
| 1851 | 高松市   | R7.10.22 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約100cm | 約40kg  | R7.10.28 | 陰性 |
| 1852 | 綾川町   | R7.10.21 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約120cm | 約40kg  | R7.10.28 | 陰性 |
| 1853 | 綾川町   | R7.10.22 | 捕獲 | 雌  | 幼獣 | 約85cm  | 約10kg  | R7.10.28 | 陰性 |
| 1854 | 高松市   | R7.10.23 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約90cm  | 約20kg  | R7.10.28 | 陰性 |
| 1855 | 高松市   | R7.10.25 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約90cm  | 約30kg  | R7.10.28 | 陰性 |
| 1856 | 丸亀市   | R7.10.24 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約70cm  | 約30kg  | R7.11.5  | 陰性 |
| 1857 | 丸亀市   | R7.10.27 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約70cm  | 約30kg  | R7.11.5  | 陰性 |
| 1858 | 高松市   | R7.10.27 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約90cm  | 約35kg  | R7.10.28 | 陰性 |
| 1859 | 三豊市   | R7.10.27 | 死亡 | 雄  | 成獣 | 約110cm | 約50kg  | R7.11.5  | 陰性 |
| 1860 | 高松市   | R7.10.27 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約60cm  | 約9kg   | R7.11.5  | 陰性 |
| 1861 | 高松市   | R7.10.27 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約60cm  | 約10kg  | R7.11.5  | 陰性 |
| 1862 | 高松市   | R7.10.27 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約118cm | 約40kg  | R7.11.5  | 陰性 |
| 1863 | 丸亀市   | R7.10.28 | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約60cm  | 約10kg  | R7.11.5  | 陰性 |
| 1864 | 丸亀市   | R7.10.28 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約80cm  | 約30kg  | R7.11.5  | 陰性 |
| 1865 | まんのう町 | R7.10.29 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約65cm  | 約20kg  | R7.11.5  | 陰性 |
| 1866 | まんのう町 | R7.10.29 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約70cm  | 約20kg  | R7.11.5  | 陰性 |
| 1867 | 観音寺市  | R7.10.30 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約85cm  | 約65kg  | R7.11.5  | 陰性 |
| 1868 | 高松市   | R7.10.30 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 約90cm  | 約40kg  | R7.11.5  | 陰性 |
| 1869 | 三豊市   | R7.10.28 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 不明     | 約50kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1870 | 三豊市   | R7.10.28 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 不明     | 約50kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1871 | 三豊市   | R7.10.29 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 不明     | 約60kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1872 | 三豊市   | R7.10.30 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 不明     | 約70kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1873 | 三豊市   | R7.10.30 | 死亡 | 雄  | 成獣 | 約110cm | 約50kg  | R7.11.5  | 陰性 |
| 1874 | 綾川町   | R7.10.31 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約133cm | 約67kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1875 | 三木町   | R7.11.1  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約120cm | 約70kg  | R7.11.5  | 陰性 |
| 1876 | さぬき市  | R7.11.4  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約100cm | 約40kg  | R7.11.5  | 陰性 |
| 1877 | 観音寺市  | R7.11.1  | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約40cm  | 約10kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1878 | さぬき市  | R7.11.5  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約100cm | 約50kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1879 | 三豊市   | R7.11.1  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約120cm | 約70kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1880 | まんのう町 | R7.11.5  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約70cm  | 約25kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1881 | 綾川町   | R7.11.5  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約140cm | 約70kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1882 | 綾川町   | R7.11.5  | 捕獲 | 雌  | 幼獣 | 約83cm  | 約20kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1883 | 善通寺市  | R7.11.6  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約130cm | 約60kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1884 | 高松市   | R7.11.6  | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約68cm  | 約6kg   | R7.11.11 | 陰性 |
| 1885 | 坂出市   | R7.11.5  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約71cm  | 約18kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1886 | 坂出市   | R7.11.5  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約75cm  | 約22kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1887 | 綾川町   | R7.11.6  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約97cm  | 約18kg  | R7.11.11 | 陰性 |

|      |       |          |    |    |    |        |       |          |    |
|------|-------|----------|----|----|----|--------|-------|----------|----|
| 1888 | 三豊市   | R7.11.6  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 不明     | 約60kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1889 | 高松市   | R7.11.7  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約80cm  | 約20kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1890 | 高松市   | R7.11.7  | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約60cm  | 約12kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1891 | 高松市   | R7.11.7  | 捕獲 | 雌  | 幼獣 | 約60cm  | 約13kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1892 | 高松市   | R7.11.8  | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約70cm  | 約8kg  | R7.11.11 | 陰性 |
| 1893 | 高松市   | R7.11.10 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約70cm  | 約15kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1894 | 坂出市   | R7.11.10 | 捕獲 | 雌  | 幼獣 | 約70cm  | 約15kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1895 | 東かがわ市 | R7.11.11 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1896 | 高松市   | R7.11.12 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約105cm | 約42kg | R7.11.17 | 陰性 |
| 1897 | 綾川町   | R7.11.12 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約134cm | 約60kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1898 | 綾川町   | R7.11.14 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約89cm  | 約25kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1899 | 高松市   | R7.11.14 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 約60cm  | 約10kg | R7.11.17 | 陰性 |
| 1900 | 高松市   | R7.11.15 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約90cm  | 約25kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1901 | まんのう町 | R7.11.16 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 不明     | 約60kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1902 | 綾川町   | R7.11.17 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約140cm | 約60kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1903 | 土庄町   | R7.11.3  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1904 | 土庄町   | R7.11.4  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約60cm  | 約15kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1905 | 土庄町   | R7.11.4  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約100cm | 約29kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1906 | 小豆島町  | R7.11.4  | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約65cm  | 約6kg  | R7.11.25 | 陰性 |
| 1907 | 小豆島町  | R7.11.5  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約70cm  | 約17kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1908 | 小豆島町  | R7.11.5  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約75cm  | 約20kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1909 | 小豆島町  | R7.11.5  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1910 | 小豆島町  | R7.11.5  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約60cm  | 約15kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1911 | 土庄町   | R7.11.9  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約65cm  | 約8kg  | R7.11.25 | 陰性 |
| 1912 | 小豆島町  | R7.11.10 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約115cm | 約50kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1913 | 小豆島町  | R7.11.10 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約70cm  | 約15kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1914 | 土庄町   | R7.11.11 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約105cm | 約40kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1915 | 土庄町   | R7.11.16 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約65cm  | 約9kg  | R7.11.25 | 陰性 |
| 1916 | 綾川町   | R7.11.20 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約136cm | 約70kg | R7.12.2  | 陰性 |
| 1917 | 観音寺市  | R7.11.21 | 捕獲 | 雄  | 幼獣 | 約60cm  | 約12kg | R7.12.2  | 陰性 |
| 1918 | 高松市   | R7.11.21 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約70cm  | 約20kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1919 | 高松市   | R7.11.21 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約60cm  | 約15kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1920 | 高松市   | R7.11.23 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約90cm  | 約18kg | R7.12.2  | 陰性 |
| 1921 | 綾川町   | R7.11.24 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約90cm  | 約20kg | R7.12.2  | 陰性 |
| 1922 | 観音寺市  | R7.11.24 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R7.12.2  | 陰性 |
| 1923 | まんのう町 | R7.11.26 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約60cm  | 約20kg | R7.12.2  | 陰性 |
| 1924 | 観音寺市  | R7.11.27 | 捕獲 | 雌  | 幼獣 | 約50cm  | 約10kg | R7.12.2  | 陰性 |
| 1925 | まんのう町 | R7.11.27 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約65cm  | 約25kg | R7.12.2  | 陰性 |
| 1926 | 高松市   | R7.11.26 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R7.12.2  | 陰性 |
| 1927 | 綾川町   | R7.11.27 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 約108cm | 約50kg | R7.12.2  | 陰性 |
| 1928 | 綾川町   | R7.11.27 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約83cm  | 約25kg | R7.12.2  | 陰性 |
| 1929 | 坂出市   | R7.11.30 | 捕獲 | 雌  | 幼獣 | 約75cm  | 約20kg | R7.12.8  | 陰性 |
| 1930 | 高松市   | R7.11.30 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約110cm | 約80kg | R7.12.2  | 陰性 |
| 1931 | 三豊市   | R7.11.23 | 捕獲 | 雌  | 不明 | 不明     | 約60kg | R7.12.8  | 陰性 |
| 1932 | 三豊市   | R7.11.30 | 捕獲 | 雌  | 不明 | 不明     | 約80kg | R7.12.8  | 陰性 |
| 1933 | 高松市   | R7.12.3  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約120cm | 約45kg | R7.12.8  | 陰性 |
| 1934 | 高松市   | R7.12.3  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約123cm | 約50kg | R7.12.8  | 陰性 |
| 1935 | 高松市   | R7.12.7  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約120cm | 約60kg | R7.12.8  | 陰性 |
| 1936 | 高松市   | R7.12.5  | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約70cm  | 約60kg | R7.12.16 | 陰性 |
| 1937 | さぬき市  | R7.12.8  | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約70cm  | 約15kg | R7.12.16 | 陰性 |
| 1938 | まんのう町 | R7.11.30 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約100cm | 約70kg | R7.12.23 | 陰性 |
| 1939 | まんのう町 | R7.12.8  | 捕獲 | 雌  | 幼獣 | 約50cm  | 約10kg | R7.12.23 | 陰性 |
| 1940 | 三豊市   | R7.12.16 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R7.12.23 | 陰性 |
| 1941 | 綾川町   | R7.12.18 | 捕獲 | 雌  | 成獣 | 約136cm | 約75kg | R7.12.23 | 陰性 |
| 1942 | まんのう町 | R7.12.14 | 捕獲 | 雌  | 幼獣 | 約60cm  | 約10kg | R7.12.23 | 陰性 |
| 1943 | 東かがわ市 | R7.12.25 | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約60cm  | 約30kg | R8.1.6   | 陰性 |
| 1944 | さぬき市  | R8.1.3   | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約100cm | 約70kg | R8.1.6   | 陰性 |
| 1945 | さぬき市  | R8.1.3   | 捕獲 | 雄  | 成獣 | 約80cm  | 約15kg | R8.1.6   | 陰性 |