

令和8年10月9日  
香川県

野生いのししの豚熱(CSF)  
感染確認検査(PCR検査)の結果について

令和8年4月1日から令和8年10月7日までの間に実施した野生いのししの感染  
確認検査の結果、3頭陽性214頭陰性となりました。

| 番号   | 発見・捕獲場所 | 発見・<br>捕獲日 | 状態 | 成子<br>の別 | 性別 | 体重    | 体長     | 検査日     | 検査<br>結果 |
|------|---------|------------|----|----------|----|-------|--------|---------|----------|
| 1955 | 高松市     | R8.6.3     | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約45kg | 約110cm | R8.6.8  | 陰性       |
| 1956 | 善通寺市    | R8.6.5     | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約50kg | 約90cm  | R8.6.15 | 陰性       |
| 1957 | 高松市     | R8.6.5     | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約25kg | 約102cm | R8.6.8  | 陰性       |
| 1958 | 高松市     | R8.6.6     | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約35kg | 約100cm | R8.6.15 | 陰性       |
| 1959 | 高松市     | R8.6.6     | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約20kg | 約84cm  | R8.6.15 | 陰性       |
| 1960 | 善通寺市    | R8.6.7     | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約64kg | 約100cm | R8.6.15 | 陽性(58)   |
| 1961 | 善通寺市    | R8.6.8     | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約46kg | 約80cm  | R8.6.15 | 陰性       |
| 1962 | 善通寺市    | R8.6.9     | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約40kg | 約120cm | R8.6.15 | 陰性       |
| 1963 | 坂出市     | R8.6.9     | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約65kg | 約125cm | R8.6.15 | 陰性       |
| 1964 | 高松市     | R8.6.10    | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約40kg | 約100cm | R8.6.15 | 陰性       |
| 1965 | 善通寺市    | R8.6.14    | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約50kg | 約100cm | R8.6.22 | 陰性       |
| 1966 | 善通寺市    | R8.6.14    | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約42kg | 約70cm  | R8.6.22 | 陰性       |
| 1967 | 善通寺市    | R8.6.14    | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約35kg | 約110cm | R8.6.22 | 陰性       |
| 1968 | 善通寺市    | R8.6.17    | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約56kg | 約90cm  | R8.6.22 | 陰性       |
| 1969 | 坂出市     | R8.6.17    | 捕獲 | 幼獣       | 雌  | 約4kg  | 約40cm  | R8.6.29 | 陰性       |
| 1970 | 三木町     | R8.6.17    | 死亡 | 幼獣       | 雌  | 約10kg | 約50cm  | R8.6.22 | 陽性(59)   |
| 1971 | さぬき市    | R8.6.18    | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約30kg | 約60cm  | R8.6.22 | 陰性       |
| 1972 | 三豊市     | R8.6.19    | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約30kg | 不明     | R8.6.29 | 陽性(60)   |
| 1973 | さぬき市    | R8.6.21    | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約40kg | 約100cm | R8.6.29 | 陰性       |
| 1974 | 高松市     | R8.6.19    | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約30kg | 約90cm  | R8.6.29 | 陰性       |
| 1975 | さぬき市    | R8.6.22    | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約35kg | 約90cm  | R8.6.29 | 陰性       |
| 1976 | 坂出市     | R8.6.21    | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約50kg | 約100cm | R8.6.29 | 陰性       |
| 1977 | 高松市     | R8.6.22    | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約80kg | 約135cm | R8.6.29 | 陰性       |
| 1978 | 小豆島町    | R8.6.22    | 死亡 | 成獣       | 雌  | 約40kg | 約60cm  | R8.6.29 | 陰性       |
| 1979 | 丸亀市     | R8.6.23    | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約40kg | 約60cm  | R8.6.29 | 陰性       |
| 1980 | 丸亀市     | R8.6.23    | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約60kg | 約100cm | R8.6.29 | 陰性       |
| 1981 | さぬき市    | R8.6.25    | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約40kg | 約90cm  | R8.6.29 | 陰性       |
| 1982 | さぬき市    | R8.6.27    | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約35kg | 約75cm  | R8.7.6  | 陰性       |
| 1983 | さぬき市    | R8.6.28    | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約30kg | 約90cm  | R8.7.6  | 陰性       |
| 1984 | 高松市     | R8.6.27    | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約90kg | 約120cm | R8.7.6  | 陰性       |
| 1985 | 高松市     | R8.6.29    | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約70kg | 約110cm | R8.7.6  | 陰性       |
| 1986 | 高松市     | R8.6.29    | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約50kg | 約100cm | R8.7.6  | 陰性       |
| 1987 | 高松市     | R8.6.30    | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約30kg | 約85cm  | R8.7.6  | 陰性       |
| 1988 | 高松市     | R8.6.30    | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約20kg | 約80cm  | R8.7.6  | 陰性       |
| 1989 | 坂出市     | R8.6.30    | 捕獲 | 幼獣       | 雌  | 約5kg  | 約60cm  | R8.7.6  | 陰性       |
| 1990 | 高松市     | R8.7.2     | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約45kg | 約115cm | R8.7.6  | 陰性       |
| 1991 | さぬき市    | R8.7.3     | 捕獲 | 幼獣       | 雄  | 約15kg | 約62cm  | R8.7.6  | 陰性       |
| 1992 | 高松市     | R8.7.3     | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約30kg | 約80cm  | R8.7.6  | 陰性       |
| 1993 | 小豆島町    | R8.7.1     | 捕獲 | 幼獣       | 雄  | 約8kg  | 約50cm  | R8.7.13 | 陰性       |
| 1994 | 小豆島町    | R8.7.1     | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約38kg | 約100cm | R8.7.13 | 陰性       |
| 1995 | 小豆島町    | R8.6.30    | 捕獲 | 幼獣       | 雄  | 約5kg  | 約55cm  | R8.7.13 | 陰性       |
| 1996 | 小豆島町    | R8.6.30    | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約38kg | 約90cm  | R8.7.13 | 陰性       |
| 1997 | 小豆島町    | R8.7.1     | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約35kg | 約105cm | R8.7.13 | 陰性       |
| 1998 | 土庄町     | R8.7.1     | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約31kg | 約80cm  | R8.7.13 | 陰性       |
| 1999 | 小豆島町    | R8.7.1     | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約40kg | 約110cm | R8.7.13 | 陰性       |
| 2000 | 土庄町     | R8.7.1     | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約17kg | 約75cm  | R8.7.13 | 陰性       |
| 2001 | 土庄町     | R8.7.1     | 捕獲 | 成獣       | 雄  | 約40kg | 約100cm | R8.7.13 | 陰性       |
| 2002 | 土庄町     | R8.7.1     | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約40kg | 約100cm | R8.7.13 | 陰性       |
| 2003 | 土庄町     | R8.7.2     | 捕獲 | 成獣       | 雌  | 約16kg | 約70cm  | R8.7.13 | 陰性       |

| 番号   | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日  | 状態 | 成子の別 | 性別 | 体重    | 体長     | 検査日     | 検査結果 |
|------|---------|---------|----|------|----|-------|--------|---------|------|
| 2004 | 土庄町     | R8.7.3  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約9kg  | 約65cm  | R8.7.13 | 陰性   |
| 2005 | 土庄町     | R8.7.5  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約40kg | 約90cm  | R8.7.13 | 陰性   |
| 2006 | 土庄町     | R8.7.6  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約34kg | 約95cm  | R8.7.13 | 陰性   |
| 2007 | 小豆島町    | R8.7.6  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約18kg | 約70cm  | R8.7.13 | 陰性   |
| 2008 | 土庄町     | R8.6.26 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約30kg | 約90cm  | R8.7.13 | 陰性   |
| 2009 | 多度津町    | R8.7.7  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約65kg | 約135cm | R8.8.4  | 陰性   |
| 2010 | 高松市     | R8.7.7  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約3kg  | 約90cm  | R8.7.13 | 陰性   |
| 2011 | 小豆島町    | R8.7.8  | 死亡 | 幼獣   | 雄  | 約20kg | 約60cm  | R8.7.13 | 陰性   |
| 2012 | 小豆島町    | R8.7.8  | 死亡 | 幼獣   | 雌  | 約20kg | 約60cm  | R8.7.13 | 陰性   |
| 2013 | 小豆島町    | R8.7.8  | 死亡 | 幼獣   | 雌  | 約20kg | 約60cm  | R8.7.13 | 陰性   |
| 2014 | 小豆島町    | R8.7.8  | 死亡 | 幼獣   | 雌  | 約20kg | 約60cm  | R8.7.13 | 陰性   |
| 2015 | 高松市     | R8.7.7  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約40kg | 約110cm | R8.7.13 | 陰性   |
| 2016 | 土庄町     | R8.7.9  | 死亡 | 成獣   | 雌  | 約20kg | 約60cm  | R8.7.13 | 陰性   |
| 2017 | 高松市     | R8.7.12 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約40kg | 約110cm | R8.7.21 | 陰性   |
| 2018 | 高松市     | R8.7.12 | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約2kg  | 約40cm  | R8.7.21 | 陰性   |
| 2019 | 高松市     | R8.7.11 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約70kg | 約110cm | R8.7.21 | 陰性   |
| 2020 | 高松市     | R8.7.12 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約40kg | 約110cm | R8.7.21 | 陰性   |
| 2021 | 高松市     | R8.7.12 | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約7kg  | 約30cm  | R8.7.21 | 陰性   |
| 2022 | 高松市     | R8.7.13 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約15kg | 約85cm  | R8.7.21 | 陰性   |
| 2023 | 高松市     | R8.7.13 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約20kg | 約90cm  | R8.7.21 | 陰性   |
| 2024 | さぬき市    | R8.7.14 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約30kg | 約100cm | R8.7.21 | 陰性   |
| 2025 | 高松市     | R8.7.13 | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約5kg  | 約50cm  | R8.7.21 | 陰性   |
| 2026 | さぬき市    | R8.7.13 | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約15kg | 約60cm  | R8.7.21 | 陰性   |
| 2027 | 高松市     | R8.7.15 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約40kg | 約100cm | R8.7.21 | 陰性   |
| 2028 | 高松市     | R8.7.15 | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約1kg  | 約35cm  | R8.7.21 | 陰性   |
| 2029 | 高松市     | R8.7.14 | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約2kg  | 約30cm  | R8.7.21 | 陰性   |
| 2030 | 丸亀市     | R8.7.15 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約70kg | 約110cm | R8.8.4  | 陰性   |
| 2031 | 高松市     | R8.7.16 | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約2kg  | 約50cm  | R8.7.21 | 陰性   |
| 2032 | 高松市     | R8.7.21 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約40kg | 約100cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 2033 | 高松市     | R8.7.21 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約8kg  | 約60cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 2034 | 高松市     | R8.7.22 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約40kg | 約123cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 2035 | 丸亀市     | R8.7.22 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約40kg | 約70cm  | R8.8.5  | 陰性   |
| 2036 | 高松市     | R8.7.23 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約60kg | 約110cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 2037 | 高松市     | R8.7.26 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約15kg | 約70cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 2038 | 高松市     | R8.7.27 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約70kg | 約110cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 2039 | 高松市     | R8.7.27 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約35kg | 約100cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 2040 | 三豊市     | R8.7.27 | 死亡 | 幼獣   | 雌  | 約20kg | 約50cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 2041 | 高松市     | R8.7.29 | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約2kg  | 約40cm  | R8.8.4  | 陰性   |
| 2042 | 綾川町     | R8.7.31 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約29kg | 約99cm  | R8.8.4  | 陰性   |
| 2043 | 高松市     | R8.7.30 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約12kg | 約80cm  | R8.8.4  | 陰性   |
| 2044 | 高松市     | R8.7.30 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約25kg | 約80cm  | R8.8.4  | 陰性   |
| 2045 | 丸亀市     | R8.7.29 | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約10kg | 約25cm  | R8.8.4  | 陰性   |
| 2046 | 高松市     | R8.8.2  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約30kg | 約110cm | R8.8.4  | 陰性   |
| 2047 | 高松市     | R8.8.1  | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約8kg  | 約60cm  | R8.8.4  | 陰性   |
| 2048 | 多度津町    | R8.8.3  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約35kg | 約120cm | R8.8.17 | 陰性   |
| 2049 | 善通寺市    | R8.8.4  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約45kg | 約110cm | R8.8.17 | 陰性   |
| 2050 | 土庄町     | R8.8.2  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約23kg | 約85cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2051 | 土庄町     | R8.8.2  | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約10kg | 約60cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2052 | 小豆島町    | R8.8.2  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約37kg | 約95cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2053 | 小豆島町    | R8.8.3  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約10kg | 約70cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2054 | 小豆島町    | R8.8.2  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約32kg | 約95cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2055 | 土庄町     | R8.8.3  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約22kg | 約90cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2056 | 小豆島町    | R8.8.2  | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約8kg  | 約64cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2057 | 土庄町     | R8.8.3  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約50kg | 約110cm | R8.8.12 | 陰性   |
| 2058 | 土庄町     | R8.8.2  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約30kg | 約100cm | R8.8.12 | 陰性   |
| 2059 | 小豆島町    | R8.8.3  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約20kg | 約70cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2060 | 小豆島町    | R8.8.3  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約37kg | 約80cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2061 | 小豆島町    | R8.8.3  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約30kg | 約75cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2062 | 土庄町     | R8.8.4  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約27kg | 約90cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2063 | 小豆島町    | R8.8.4  | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約5kg  | 約50cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2064 | 小豆島町    | R8.8.4  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約20kg | 約85cm  | R8.8.12 | 陰性   |

| 番号   | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日  | 状態 | 成子の別 | 性別 | 体重     | 体長     | 検査日     | 検査結果 |
|------|---------|---------|----|------|----|--------|--------|---------|------|
| 2065 | 高松市     | R8.8.4  | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約8kg   | 約62cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2066 | 高松市     | R8.8.4  | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約8kg   | 約64cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2067 | 高松市     | R8.8.4  | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約10kg  | 約68cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2068 | 高松市     | R8.8.4  | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約10kg  | 約68cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2069 | 高松市     | R8.8.5  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約70kg  | 約110cm | R8.8.12 | 陰性   |
| 2070 | 高松市     | R8.8.6  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約50kg  | 約110cm | R8.8.12 | 陰性   |
| 2071 | 綾川町     | R8.8.7  | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約5kg   | 約70cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 2072 | 多度津町    | R8.8.9  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約30kg  | 約70cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 2073 | 綾川町     | R8.8.8  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約33kg  | 約104cm | R8.8.17 | 陰性   |
| 2074 | 高松市     | R8.8.7  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約70kg  | 約110cm | R8.8.12 | 陰性   |
| 2075 | 三木町     | R8.8.8  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約28kg  | 約100cm | R8.8.12 | 陰性   |
| 2076 | 高松市     | R8.8.10 | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約8kg   | 約45cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2077 | 高松市     | R8.8.10 | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約8kg   | 約45cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2078 | 高松市     | R8.8.10 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約8kg   | 約62cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 2079 | 高松市     | R8.8.11 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約40kg  | 約90cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 2080 | 善通寺市    | R8.8.12 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約90kg  | 約21cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 2081 | 高松市     | R8.8.12 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約100kg | 約40cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 2082 | 丸亀市     | R8.8.12 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約60kg  | 約40cm  | R8.8.18 | 陰性   |
| 2083 | 丸亀市     | R8.8.12 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約50kg  | 約35cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 2084 | 高松市     | R8.8.14 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約127kg | 約40cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 2085 | 高松市     | R8.8.16 | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約67kg  | 約10cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 2086 | 高松市     | R8.8.16 | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約62kg  | 約8cm   | R8.8.17 | 陰性   |
| 2087 | さぬき市    | R8.8.16 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約100kg | 約50cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 2088 | 坂出市     | R8.8.17 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約100cm | 約35kg  | R8.8.31 | 陰性   |
| 2089 | 高松市     | R8.8.18 | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約67cm  | 約10kg  | R8.8.24 | 陰性   |
| 2090 | 高松市     | R8.8.19 | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約65cm  | 約10kg  | R8.8.24 | 陰性   |
| 2091 | 綾川町     | R8.8.19 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約98cm  | 約30kg  | R8.8.31 | 陰性   |
| 2092 | 善通寺市    | R8.8.20 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約110cm | 約70kg  | R8.8.31 | 陰性   |
| 2093 | 高松市     | R8.8.20 | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約65cm  | 約10kg  | R8.8.24 | 陰性   |
| 2094 | 高松市     | R8.8.24 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約70cm  | 約30kg  | R8.8.31 | 陰性   |
| 2095 | 高松市     | R8.8.21 | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約67cm  | 約10kg  | R8.8.31 | 陰性   |
| 2096 | 高松市     | R8.8.26 | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約65cm  | 約12kg  | R8.8.31 | 陰性   |
| 2097 | 善通寺市    | R8.8.26 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約120cm | 約34kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2098 | 高松市     | R8.8.26 | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約45cm  | 約8kg   | R8.8.31 | 陰性   |
| 2099 | 綾川町     | R8.8.26 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約120cm | 約40kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2100 | 綾川町     | R8.8.27 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約75cm  | 約25kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2101 | 綾川町     | R8.8.27 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約140cm | 約76kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2102 | 多度津町    | R8.8.30 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約90cm  | 約30kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2103 | 高松市     | R8.8.28 | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約68cm  | 約10kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2104 | 高松市     | R8.8.28 | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約65cm  | 約10kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2105 | 高松市     | R8.8.29 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約100cm | 約40kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2106 | 高松市     | R8.8.30 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約110cm | 約50kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2107 | 高松市     | R8.8.30 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約100cm | 約40kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2108 | 高松市     | R8.8.30 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約30cm  | 約8kg   | R8.9.7  | 陰性   |
| 2109 | まんのう町   | R8.8.29 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約80cm  | 約40kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2110 | 多度津町    | R8.8.28 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約100cm | 約30kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2111 | 綾川町     | R8.8.27 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約120cm | 約80kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2112 | 高松市     | R8.8.31 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約100cm | 約50kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2113 | 高松市     | R8.8.31 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約100cm | 約60kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2114 | 綾川町     | R8.9.1  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約75cm  | 約25kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2115 | 高松市     | R8.9.1  | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約62cm  | 約8kg   | R8.9.7  | 陰性   |
| 2116 | 高松市     | R8.9.2  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約87cm  | 約25kg  | R8.9.7  | 陰性   |
| 2117 | 小豆島町    | R8.8.31 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約110kg | 約56cm  | R8.9.14 | 陰性   |
| 2118 | 小豆島町    | R8.9.1  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約45kg  | 約15cm  | R8.9.14 | 陰性   |
| 2119 | 小豆島町    | R8.8.31 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約75kg  | 約15cm  | R8.9.14 | 陰性   |
| 2120 | 小豆島町    | R8.9.1  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約60kg  | 約18cm  | R8.9.14 | 陰性   |
| 2121 | 土庄町     | R8.9.1  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約90kg  | 約21cm  | R8.9.14 | 陰性   |
| 2122 | 土庄町     | R8.9.1  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約65kg  | 約10cm  | R8.9.14 | 陰性   |
| 2123 | 小豆島町    | R8.8.31 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約55kg  | 約15cm  | R8.9.14 | 陰性   |
| 2124 | 小豆島町    | R8.9.1  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約100kg | 約55cm  | R8.9.14 | 陰性   |
| 2125 | 小豆島町    | R8.9.1  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約95kg  | 約30cm  | R8.9.14 | 陰性   |

| 番号   | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日  | 状態 | 成子の別 | 性別 | 体重     | 体長    | 検査日     | 検査結果 |
|------|---------|---------|----|------|----|--------|-------|---------|------|
| 2126 | 小豆島町    | R8.9.1  | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約65kg  | 約15cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2127 | 小豆島町    | R8.9.1  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約80kg  | 約45cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2128 | 土庄町     | R8.9.1  | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約65kg  | 約8cm  | R8.9.14 | 陰性   |
| 2129 | 小豆島町    | R8.9.1  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約60kg  | 約15cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2130 | 土庄町     | R8.9.1  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約90kg  | 約22cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2131 | 小豆島町    | R8.9.2  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約115kg | 約60cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2132 | 小豆島町    | R8.9.2  | 死亡 | 幼獣   | 雌  | 約50kg  | 約10cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2133 | 綾川町     | R8.9.4  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約90kg  | 約15cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2134 | 高松市     | R8.9.6  | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約50kg  | 約5cm  | R8.9.14 | 陰性   |
| 2135 | 高松市     | R8.9.5  | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約65kg  | 約10cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2136 | 高松市     | R8.9.7  | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約40kg  | 約10cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2137 | 綾川町     | R8.9.5  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約130kg | 約70cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2138 | 綾川町     | R8.9.6  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約130kg | 約52cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2139 | 高松市     | R8.9.6  | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約100kg | 約30cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2140 | 高松市     | R8.9.7  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約90kg  | 約30cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2141 | 観音寺市    | R8.9.8  | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約70kg  | 約25cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2142 | 高松市     | R8.9.6  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約110kg | 約50cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2143 | 高松市     | R8.9.9  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約60kg  | 約25cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2144 | 高松市     | R8.9.9  | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約70kg  | 約12cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2145 | 高松市     | R8.9.10 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約60kg  | 約15cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2146 | 高松市     | R8.9.10 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約120kg | 約50cm | R8.9.14 | 陰性   |
| 2147 | 善通寺市    | R8.9.11 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約95cm  | 約37kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2148 | まんのう町   | R8.9.12 | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約90cm  | 約30kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2149 | まんのう町   | R8.9.12 | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約85cm  | 約23kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2150 | 善通寺市    | R8.9.13 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約102cm | 約42kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2151 | 善通寺市    | R8.9.14 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約95cm  | 約31kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2152 | まんのう町   | R8.9.13 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約80cm  | 約40kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2153 | 綾川町     | R8.9.16 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約90cm  | 約25kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2154 | 高松市     | R8.9.16 | 捕獲 | 幼獣   | 雌  | 約65cm  | 約10kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2155 | 高松市     | R8.9.20 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約90cm  | 約15kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2156 | 高松市     | R8.9.22 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約80cm  | 約30kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2157 | 高松市     | R8.9.21 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約110cm | 約50kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2158 | 高松市     | R8.9.16 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約72cm  | 約15kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2159 | 高松市     | R8.9.16 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約69cm  | 約15kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2160 | 善通寺市    | R8.9.22 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約120cm | 約76kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2161 | 高松市     | R8.9.24 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約120cm | 約70kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2162 | 綾川町     | R8.9.22 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約82cm  | 約22kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2163 | 観音寺市    | R8.9.23 | 捕獲 | 幼獣   | 雄  | 約80cm  | 約30kg | R8.10.5 | 陰性   |
| 2164 | 高松市     | R8.9.24 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約80cm  | 約25kg | R8.9.28 | 陰性   |
| 2165 | 高松市     | R8.9.26 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約110cm | 約60kg | R8.10.5 | 陰性   |
| 2166 | 高松市     | R8.9.26 | 捕獲 | 成獣   | 雌  | 約80cm  | 約20kg | R8.10.5 | 陰性   |
| 2167 | 高松市     | R8.10.2 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約80cm  | 約15kg | R8.10.5 | 陰性   |
| 2168 | 高松市     | R8.10.2 | 捕獲 | 成獣   | 雄  | 約100cm | 約45kg | R8.10.5 | 陰性   |