

令和8年6月12日
香川県

野生いのししの豚熱(CSF) 感染確認検査(PCR検査)の結果について

平成30年9月25日から令和8年3月31日までの間に実施した野生いのししの感染
確認検査の結果、57頭陽性、1878頭陰性となりました。

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・ 捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子 の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査 結果 |
|----|---------|------------|----|----|----------|--------|-------|----------|----------|
| 1 | 三豊市 | H30.9.25 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約80kg | H30.9.25 | 陰性 |
| 2 | さぬき市 | H30.9.26 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | H30.9.27 | 陰性 |
| 3 | 丸亀市 | H31.1.11 | 死亡 | 雌 | 幼獣 | 約80cm | 約30kg | H31.1.15 | 陰性 |
| 4 | 高松市 | H31.2.12 | 死亡 | 雄 | 幼獣 | 約90cm | 約35kg | H31.2.12 | 陰性 |
| 5 | 観音寺市 | H31.2.13 | 死亡 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約12kg | H31.2.14 | 陰性 |
| 6 | さぬき市 | R1.8.2 | 死亡 | 雌 | 幼獣 | 約40cm | 約10kg | R1.8.2 | 陰性 |
| 7 | 三木町 | R1.9.13 | 死亡 | 雌 | 幼獣 | 約35cm | 約5kg | R1.9.17 | 陰性 |
| 8 | 三豊市 | R1.12.14 | 死亡 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約7kg | R1.12.17 | 陰性 |
| 9 | 善通寺市 | R2.9.15 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 不明 | 約35kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 10 | 善通寺市 | R2.9.15 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 不明 | 約30kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 11 | 小豆島町 | R2.9.23 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 12 | 三豊市 | R2.9.20 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 不明 | 約20kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 13 | 土庄町 | R2.10.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約65kg | R2.10.15 | 陰性 |
| 14 | 善通寺市 | R2.9.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約45kg | R2.10.27 | 陰性 |
| 15 | まんのう町 | R2.9.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約30kg | R2.10.27 | 陰性 |
| 16 | 坂出市 | R2.10.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約35kg | R2.10.27 | 陰性 |
| 17 | 琴平町 | R2.10.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約45kg | R2.10.27 | 陰性 |
| 18 | 坂出市 | R2.10.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約45kg | R2.10.27 | 陰性 |
| 19 | まんのう町 | R2.10.15 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 不明 | 約10kg | R2.10.27 | 陰性 |
| 20 | 三豊市 | R2.10.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約80kg | R2.11.2 | 陰性 |
| 21 | 高松市 | R2.10.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約20kg | R2.11.2 | 陰性 |
| 22 | 高松市 | R2.11.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約34kg | R2.12.2 | 陰性 |
| 23 | 高松市 | R2.11.6 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 不明 | 約11kg | R2.12.2 | 陰性 |
| 24 | 東かがわ市 | R2.11.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約40kg | R2.12.2 | 陰性 |
| 25 | 三豊市 | R2.11.8 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 不明 | 約30kg | R2.12.9 | 陰性 |
| 26 | 坂出市 | R2.11.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約80kg | R2.12.9 | 陰性 |
| 27 | 東かがわ市 | R2.12.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約50kg | R2.12.9 | 陰性 |
| 28 | 東かがわ市 | R2.12.21 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 不明 | 約70kg | R3.1.4 | 陰性 |
| 29 | 三木町 | R3.7.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約30kg | R3.7.7 | 陰性 |
| 30 | 高松市 | R3.7.5 | 捕獲 | 雄 | 不明 | 不明 | 約25kg | R3.7.7 | 陰性 |
| 31 | 高松市 | R3.7.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約40kg | R3.7.13 | 陰性 |
| 32 | 丸亀市 | R3.7.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約60kg | R3.7.19 | 陰性 |
| 33 | さぬき市 | R3.7.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約20kg | R3.7.19 | 陰性 |
| 34 | 高松市 | R3.7.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約70kg | R3.7.19 | 陰性 |
| 35 | 高松市 | R3.7.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約25kg | R3.7.19 | 陰性 |
| 36 | 高松市 | R3.7.16 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R3.7.19 | 陰性 |
| 37 | 高松市 | R3.7.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約25kg | R3.7.19 | 陰性 |
| 38 | 高松市 | R3.7.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約20kg | R3.7.26 | 陰性 |
| 39 | 丸亀市 | R3.7.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約50kg | R3.7.26 | 陰性 |
| 40 | 高松市 | R3.7.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約25kg | R3.7.26 | 陰性 |
| 41 | 丸亀市 | R3.7.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約50kg | R3.8.2 | 陰性 |
| 42 | さぬき市 | R3.7.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約30kg | R3.8.2 | 陰性 |
| 43 | 高松市 | R3.7.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約60kg | R3.8.2 | 陰性 |
| 44 | 高松市 | R3.7.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R3.8.2 | 陰性 |
| 45 | 高松市 | R3.7.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R3.8.2 | 陰性 |
| 46 | 高松市 | R3.7.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約18kg | R3.8.2 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|---------|----|---|----|--------|---------|---------|----|
| 47 | 高松市 | R3.8.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約35kg | R3.8.10 | 陰性 |
| 48 | 高松市 | R3.8.2 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約40cm | 約10kg | R3.8.10 | 陰性 |
| 49 | 高松市 | R3.8.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R3.8.10 | 陰性 |
| 50 | さぬき市 | R3.8.6 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 不明 | 約5kg | R3.8.10 | 陰性 |
| 51 | 小豆島町 | R3.7.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約20kg | R3.8.16 | 陰性 |
| 52 | 小豆島町 | R3.8.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約47kg | R3.8.16 | 陰性 |
| 53 | 小豆島町 | R3.8.17 | 死亡 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約3kg | R3.8.19 | 陰性 |
| 54 | 三豊市 | R3.8.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約22kg | R3.8.30 | 陰性 |
| 55 | 三豊市 | R3.8.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約25kg | R3.8.30 | 陰性 |
| 56 | 三木町 | R3.8.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約15kg | R3.8.30 | 陰性 |
| 57 | 三木町 | R3.8.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約15kg | R3.8.30 | 陰性 |
| 58 | 土庄町 | R3.9.3 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約10.8kg | R3.9.13 | 陰性 |
| 59 | 土庄町 | R3.9.5 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約94cm | 約22kg | R3.9.13 | 陰性 |
| 60 | 土庄町 | R3.9.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約62cm | 約8kg | R3.9.13 | 陰性 |
| 61 | 小豆島町 | R3.9.7 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約15kg | R3.9.13 | 陰性 |
| 62 | 土庄町 | R3.9.7 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約55cm | 約5.6kg | R3.9.13 | 陰性 |
| 63 | 土庄町 | R3.9.9 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約7.9kg | R3.9.13 | 陰性 |
| 64 | 三豊市 | R3.8.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約76kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 65 | 土庄町 | R3.9.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約38.3kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 66 | 土庄町 | R3.9.9 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約5.5kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 67 | 小豆島町 | R3.9.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm | 約41kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 68 | 小豆島町 | R3.9.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約50cm | 約25kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 69 | 小豆島町 | R3.9.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 70 | 小豆島町 | R3.9.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約25kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 71 | 小豆島町 | R3.9.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約42kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 72 | 小豆島町 | R3.9.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約33kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 73 | 小豆島町 | R3.9.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約23kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 74 | 小豆島町 | R3.9.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約43kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 75 | 小豆島町 | R3.9.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 76 | 小豆島町 | R3.9.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約70kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 77 | 小豆島町 | R3.9.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 78 | 小豆島町 | R3.9.14 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約55cm | 約6kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 79 | 小豆島町 | R3.9.14 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約6kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 80 | 土庄町 | R3.9.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 81 | 土庄町 | R3.9.15 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約8.4kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 82 | 小豆島町 | R3.9.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約31kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 83 | 小豆島町 | R3.9.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 84 | 小豆島町 | R3.9.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約12kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 85 | 土庄町 | R3.9.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約10kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 86 | 小豆島町 | R3.9.16 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約85cm | 約23kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 87 | 小豆島町 | R3.9.16 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約37cm | 約3kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 88 | 小豆島町 | R3.9.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約62kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 89 | 小豆島町 | R3.9.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約63kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 90 | 高松市 | R3.9.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約93kg | R3.9.21 | 陰性 |
| 91 | 小豆島町 | R3.9.17 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約45cm | 約3kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 92 | 小豆島町 | R3.9.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 93 | 小豆島町 | R3.9.16 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約56cm | 約5.7kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 94 | 小豆島町 | R3.9.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm | 約11kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 95 | 小豆島町 | R3.9.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約60kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 96 | 小豆島町 | R3.9.17 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約12kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 97 | 土庄町 | R3.9.20 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約8.4kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 98 | 小豆島町 | R3.9.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約41kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 99 | 小豆島町 | R3.9.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約63cm | 約15kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 100 | 小豆島町 | R3.9.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 101 | 小豆島町 | R3.9.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約28kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 102 | 土庄町 | R3.9.20 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約3.4kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 103 | 小豆島町 | R3.9.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 104 | さぬき市 | R3.9.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約15kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 105 | さぬき市 | R3.9.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約15kg | R3.9.27 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|---------|----|---|----|--------|---------|----------|----|
| 106 | 高松市 | R3.9.22 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約40cm | 約15kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 107 | 高松市 | R3.9.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約25kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 108 | 高松市 | R3.9.24 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約5kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 109 | さぬき市 | R3.9.23 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約6kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 110 | さぬき市 | R3.9.23 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約8kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 111 | 高松市 | R3.9.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約70kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 112 | 小豆島町 | R3.9.23 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約60kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 113 | 小豆島町 | R3.9.23 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約75kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 114 | 土庄町 | R3.9.23 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約16kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 115 | 小豆島町 | R3.9.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約45kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 116 | 小豆島町 | R3.9.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 117 | 小豆島町 | R3.9.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約13kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 118 | 土庄町 | R3.9.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約25.5kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 119 | 土庄町 | R3.9.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約15.1kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 120 | 小豆島町 | R3.9.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約7.6kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 121 | 小豆島町 | R3.9.26 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約8.3kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 122 | 小豆島町 | R3.9.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約17kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 123 | 土庄町 | R3.9.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約8kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 124 | 小豆島町 | R3.9.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 125 | 小豆島町 | R3.9.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約45kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 126 | 小豆島町 | R3.9.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約55kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 127 | 土庄町 | R3.9.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約16kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 128 | 土庄町 | R3.9.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約50cm | 約9.9kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 129 | 高松市 | R3.9.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約30kg | R3.9.27 | 陰性 |
| 130 | 高松市 | R3.9.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 131 | 高松市 | R3.9.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約60kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 132 | 高松市 | R3.9.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 133 | 高松市 | R3.9.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 134 | 丸亀市 | R3.9.28 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約30kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 135 | 丸亀市 | R3.9.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 136 | 高松市 | R3.9.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 137 | 高松市 | R3.9.28 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約11kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 138 | 小豆島町 | R3.9.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約37kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 139 | 小豆島町 | R3.9.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 140 | 小豆島町 | R3.9.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約45kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 141 | 小豆島町 | R3.9.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約63kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 142 | さぬき市 | R3.9.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約35kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 143 | 坂出市 | R3.9.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約35kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 144 | 土庄町 | R3.9.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約8.8kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 145 | 小豆島町 | R3.9.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 146 | 小豆島町 | R3.9.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約71cm | 約36kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 147 | 小豆島町 | R3.9.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約125cm | 約62kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 148 | 土庄町 | R3.9.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約13.1kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 149 | 高松市 | R3.9.30 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約25kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 150 | 土庄町 | R3.9.30 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約6.4kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 151 | 土庄町 | R3.9.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約16.5kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 152 | 土庄町 | R3.9.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約16.8kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 153 | 高松市 | R3.9.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約38kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 154 | 小豆島町 | R3.10.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約25cm | 約72kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 155 | 小豆島町 | R3.10.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 156 | 土庄町 | R3.9.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約33.5kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 157 | 坂出市 | R3.9.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 158 | 坂出市 | R3.9.28 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約65cm | 約10kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 159 | 高松市 | R3.10.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約45cm | 約6kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 160 | 高松市 | R3.10.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約50cm | 約8kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 161 | 高松市 | R3.10.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約50cm | 約8kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 162 | さぬき市 | R3.9.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約50cm | 約15kg | R3.10.5 | 陰性 |
| 163 | 高松市 | R3.10.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約44kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 164 | 丸亀市 | R3.10.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R3.10.13 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|----|---|----|--------|---------|----------|----|
| 165 | 丸亀市 | R3.10.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 166 | 丸亀市 | R3.10.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 167 | 小豆島町 | R3.10.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約150cm | 約100kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 168 | 小豆島町 | R3.10.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約60kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 169 | 小豆島町 | R3.10.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約16kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 170 | 土庄町 | R3.10.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約37kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 171 | 小豆島町 | R3.10.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 172 | 小豆島町 | R3.10.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約87cm | 約40kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 173 | 小豆島町 | R3.10.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約11kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 174 | 小豆島町 | R3.10.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約29kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 175 | 土庄町 | R3.10.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約16.8kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 176 | 土庄町 | R3.10.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約37.8kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 177 | 土庄町 | R3.10.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約9.8kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 178 | 小豆島町 | R3.10.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 179 | 小豆島町 | R3.10.5 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約18kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 180 | 小豆島町 | R3.10.5 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約85cm | 約22kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 181 | 高松市 | R3.10.5 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約6kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 182 | 高松市 | R3.10.5 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約7kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 183 | 高松市 | R3.10.5 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約45cm | 約5kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 184 | 小豆島町 | R3.10.6 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約13kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 185 | 小豆島町 | R3.10.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約35kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 186 | 小豆島町 | R3.10.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 187 | 小豆島町 | R3.10.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約11kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 188 | 土庄町 | R3.10.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約34kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 189 | 土庄町 | R3.10.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約12.9kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 190 | 土庄町 | R3.10.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約12.2kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 191 | 高松市 | R3.10.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約104cm | 約38kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 192 | 高松市 | R3.10.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 193 | 小豆島町 | R3.10.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約28kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 194 | 小豆島町 | R3.10.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約36kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 195 | 土庄町 | R3.10.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約83.3kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 196 | 小豆島町 | R3.10.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約18kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 197 | 小豆島町 | R3.10.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約30kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 198 | 土庄町 | R3.10.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約92kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 199 | 小豆島町 | R3.10.7 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約8kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 200 | 東かがわ市 | R3.10.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約20kg | R3.10.13 | 陰性 |
| 201 | 高松市 | R3.10.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約19.8kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 202 | 高松市 | R3.10.11 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約8kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 203 | 高松市 | R3.10.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 204 | 丸亀市 | R3.10.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 205 | さぬき市 | R3.10.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約36kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 206 | 東かがわ市 | R3.10.11 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 207 | 土庄町 | R3.10.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約11.8kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 208 | 小豆島町 | R3.10.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約12kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 209 | 小豆島町 | R3.10.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約125cm | 約78kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 210 | 小豆島町 | R3.10.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約12kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 211 | 小豆島町 | R3.10.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約25kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 212 | 小豆島町 | R3.10.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約20kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 213 | 小豆島町 | R3.10.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約18kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 214 | 小豆島町 | R3.10.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約56cm | 約16kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 215 | 小豆島町 | R3.10.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約78cm | 約20kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 216 | 小豆島町 | R3.10.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約97cm | 約38kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 217 | 小豆島町 | R3.10.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約71cm | 約32kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 218 | 小豆島町 | R3.10.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 219 | 小豆島町 | R3.10.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 220 | 土庄町 | R3.10.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約34.4kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 221 | 小豆島町 | R3.10.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約11kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 222 | 土庄町 | R3.10.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約6.8kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 223 | 土庄町 | R3.10.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約55kg | R3.10.18 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|----|---|----|--------|---------|----------|----|
| 224 | 高松市 | R3.10.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 225 | 高松市 | R3.10.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 226 | 高松市 | R3.10.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 227 | 土庄町 | R3.10.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約37.5kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 228 | 土庄町 | R3.10.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約16.9kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 229 | 土庄町 | R3.10.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約11.2kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 230 | 土庄町 | R3.10.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm | 約9.4kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 231 | 土庄町 | R3.10.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約14.6kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 232 | 小豆島町 | R3.10.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約14.6kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 233 | 小豆島町 | R3.10.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約31kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 234 | 小豆島町 | R3.10.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約84cm | 約38kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 235 | 小豆島町 | R3.10.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約20kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 236 | 小豆島町 | R3.10.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約26kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 237 | 高松市 | R3.10.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 238 | 高松市 | R3.10.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 239 | 高松市 | R3.10.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約92cm | 約26.3kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 240 | 小豆島町 | R3.10.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約28kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 241 | さぬき市 | R3.10.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 242 | まんのう町 | R3.10.14 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約40cm | 約5kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 243 | 高松市 | R3.10.14 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約10kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 244 | 小豆島町 | R3.10.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm | 約15kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 245 | 小豆島町 | R3.10.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約17kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 246 | 小豆島町 | R3.10.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約87cm | 約37kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 247 | 高松市 | R3.10.15 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約10kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 248 | 高松市 | R3.10.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 249 | 小豆島町 | R3.10.15 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約17kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 250 | 小豆島町 | R3.10.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約73cm | 約30kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 251 | 小豆島町 | R3.10.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約38kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 252 | 小豆島町 | R3.10.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約37kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 253 | 小豆島町 | R3.10.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約37kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 254 | 小豆島町 | R3.10.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約53kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 255 | 土庄町 | R3.10.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約38.3kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 256 | 多度津町 | R3.10.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約80kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 257 | まんのう町 | R3.10.15 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約4kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 258 | 土庄町 | R3.10.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約11kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 259 | 土庄町 | R3.10.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約44kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 260 | 小豆島町 | R3.10.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約70kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 261 | 小豆島町 | R3.10.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 262 | 小豆島町 | R3.10.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約50kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 263 | 土庄町 | R3.10.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約16kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 264 | 土庄町 | R3.10.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約10kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 265 | 土庄町 | R3.10.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約44.5kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 266 | 小豆島町 | R3.10.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約44.5kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 267 | 小豆島町 | R3.10.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約102cm | 約47kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 268 | 小豆島町 | R3.10.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約127cm | 約80kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 269 | 小豆島町 | R3.10.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約23kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 270 | 小豆島町 | R3.10.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約26kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 271 | 小豆島町 | R3.10.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約38kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 272 | 小豆島町 | R3.10.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約41kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 273 | 土庄町 | R3.10.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約38.4kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 274 | 小豆島町 | R3.10.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約45kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 275 | 小豆島町 | R3.10.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約62cm | 約30kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 276 | さぬき市 | R3.10.16 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約35kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 277 | さぬき市 | R3.10.16 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約55cm | 約35kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 278 | さぬき市 | R3.10.16 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約55cm | 約35kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 279 | 小豆島町 | R3.10.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約64cm | 約33kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 280 | 三木町 | R3.10.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 281 | 坂出市 | R3.10.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約125cm | 約90kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 282 | 丸亀市 | R3.10.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R3.10.26 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|----|---|----|--------|-------|----------|----|
| 283 | 東かがわ市 | R3.10.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約60kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 284 | 高松市 | R3.10.19 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 285 | 高松市 | R3.10.19 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 286 | 山本町 | R3.10.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R3.10.18 | 陰性 |
| 287 | 小豆島町 | R3.10.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約50kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 288 | 小豆島町 | R3.10.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約42kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 289 | 小豆島町 | R3.10.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約52kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 290 | 小豆島町 | R3.10.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約37kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 291 | 土庄町 | R3.10.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約14kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 292 | 土庄町 | R3.10.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約14kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 293 | 土庄町 | R3.10.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約78cm | 約14kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 294 | 土庄町 | R3.10.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約14kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 295 | 土庄町 | R3.10.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約82cm | 約17kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 296 | 土庄町 | R3.10.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約29kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 297 | 小豆島町 | R3.10.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約25kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 298 | 小豆島町 | R3.10.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約44kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 299 | 土庄町 | R3.10.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約46kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 300 | 土庄町 | R3.10.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約39kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 301 | 土庄町 | R3.10.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約19kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 302 | 土庄町 | R3.10.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約83cm | 約21kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 303 | 土庄町 | R3.10.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約17kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 304 | 小豆島町 | R3.10.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約20kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 305 | 高松市 | R3.10.20 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 306 | さぬき市 | R3.10.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 307 | 坂出市 | R3.10.20 | 捕獲 | 雄 | 不明 | 約85cm | 約26kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 308 | 小豆島町 | R3.10.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約64cm | 約48kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 309 | 小豆島町 | R3.10.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約33kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 310 | 土庄町 | R3.10.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約58kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 311 | 小豆島町 | R3.10.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約50cm | 約20kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 312 | 小豆島町 | R3.10.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約58kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 313 | 小豆島町 | R3.10.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約25kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 314 | 土庄町 | R3.10.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約25kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 315 | 小豆島町 | R3.10.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約48kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 316 | 小豆島町 | R3.10.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約22kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 317 | 小豆島町 | R3.10.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約51kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 318 | 小豆島町 | R3.10.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約75kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 319 | 小豆島町 | R3.10.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約68cm | 約18kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 320 | 土庄町 | R3.10.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約123cm | 約75kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 321 | 小豆島町 | R3.10.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約13kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 322 | 小豆島町 | R3.10.20 | 死亡 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約5kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 323 | 三豊市 | R3.10.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 324 | 三豊市 | R3.10.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約70kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 325 | 坂出市 | R3.10.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 326 | さぬき市 | R3.10.22 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約13kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 327 | さぬき市 | R3.10.22 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約13kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 328 | さぬき市 | R3.10.22 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約13kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 329 | さぬき市 | R3.10.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約40kg | R3.10.26 | 陰性 |
| 330 | 坂出市 | R3.10.23 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約55kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 331 | さぬき市 | R3.10.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約80kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 332 | さぬき市 | R3.10.23 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約40cm | 約20kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 333 | さぬき市 | R3.10.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約50cm | 約35kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 334 | さぬき市 | R3.10.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約50kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 335 | 小豆島町 | R3.10.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約22kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 336 | 小豆島町 | R3.10.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約31kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 337 | 土庄町 | R3.10.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約31kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 338 | 小豆島町 | R3.10.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約16kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 339 | 土庄町 | R3.10.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約31kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 340 | 小豆島町 | R3.10.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約68kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 341 | 小豆島町 | R3.10.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約77kg | R3.11.1 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|----|---|----|--------|---------|----------|----|
| 342 | さぬき市 | R3.10.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約35kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 343 | さぬき市 | R3.10.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 344 | 三木町 | R3.10.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 345 | 三木町 | R3.10.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 346 | 東かがわ市 | R3.10.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約35kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 347 | 高松市 | R3.10.26 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約80cm | 約14.2kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 348 | 東かがわ市 | R3.10.27 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約40cm | 約5kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 349 | 高松市 | R3.10.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 350 | 三豊市 | R3.10.29 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約65cm | 約20kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 351 | 観音寺市 | R3.10.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 352 | 東かがわ市 | R3.10.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約35kg | R3.11.1 | 陰性 |
| 353 | 観音寺市 | R3.10.29 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R3.11.8 | 陰性 |
| 354 | まんのう町 | R3.10.23 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約40cm | 約5kg | R3.11.8 | 陰性 |
| 355 | 東かがわ市 | R3.10.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R3.11.8 | 陰性 |
| 356 | まんのう町 | R3.10.31 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約80cm | 約12kg | R3.11.8 | 陰性 |
| 357 | まんのう町 | R3.11.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R3.11.8 | 陰性 |
| 358 | まんのう町 | R3.11.4 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約45cm | 約8kg | R3.11.8 | 陰性 |
| 359 | 三豊市 | R3.11.4 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約85cm | 約20kg | R3.11.8 | 陰性 |
| 360 | 三豊市 | R3.11.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約60kg | R3.11.8 | 陰性 |
| 361 | 観音寺市 | R3.11.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R3.11.8 | 陰性 |
| 362 | 丸亀市 | R3.11.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R3.11.8 | 陰性 |
| 363 | 丸亀市 | R3.11.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R3.11.8 | 陰性 |
| 364 | 三豊市 | R3.11.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約10kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 365 | 三豊市 | R3.11.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 366 | 三豊市 | R3.11.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 367 | 東かがわ市 | R3.11.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 368 | 東かがわ市 | R3.11.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約40kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 369 | 東かがわ市 | R3.11.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約40kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 370 | まんのう町 | R3.11.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 371 | 丸亀市 | R3.11.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 372 | まんのう町 | R3.11.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約80kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 373 | 坂出市 | R3.11.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 374 | 坂出市 | R3.10.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 375 | 丸亀市 | R3.11.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約35kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 376 | 高松市 | R3.11.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約15kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 377 | まんのう町 | R3.11.10 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 378 | まんのう町 | R3.11.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約60kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 379 | 観音寺市 | R3.11.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 380 | 東かがわ市 | R3.11.10 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約8kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 381 | 高松市 | R3.11.10 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約75cm | 約20kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 382 | 坂出市 | R3.11.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約18kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 383 | 三豊市 | R3.11.13 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 384 | 坂出市 | R3.11.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 385 | 高松市 | R3.11.12 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約20kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 386 | 東かがわ市 | R3.11.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 387 | 東かがわ市 | R3.11.12 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約10kg | R3.11.15 | 陰性 |
| 388 | 多度津町 | R3.11.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 389 | 多度津町 | R3.11.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 390 | まんのう町 | R3.11.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約80kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 391 | まんのう町 | R3.11.14 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約12kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 392 | まんのう町 | R3.11.14 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約12kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 393 | まんのう町 | R3.11.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 394 | まんのう町 | R3.11.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 395 | 東かがわ市 | R3.11.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 396 | 東かがわ市 | R3.11.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約40kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 397 | 東かがわ市 | R3.11.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約70kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 398 | 東かがわ市 | R3.11.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約70kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 399 | 高松市 | R3.11.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約20kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 400 | 丸亀市 | R3.11.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R3.11.22 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|----|---|----|--------|--------|----------|----|
| 401 | 丸亀市 | R3.11.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約35kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 402 | 観音寺市 | R3.11.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約60kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 403 | まんのう町 | R3.11.17 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 404 | 坂出市 | R3.11.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約70kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 405 | 坂出市 | R3.11.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R3.11.22 | 陰性 |
| 406 | 観音寺市 | R3.11.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R3.11.29 | 陰性 |
| 407 | 東かがわ市 | R3.11.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約25kg | R3.11.29 | 陰性 |
| 408 | 東かがわ市 | R3.11.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約50kg | R3.11.29 | 陰性 |
| 409 | まんのう町 | R3.11.15 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約5kg | R3.11.29 | 陰性 |
| 410 | まんのう町 | R3.11.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約60kg | R3.11.29 | 陰性 |
| 411 | まんのう町 | R3.11.26 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約8kg | R3.12.6 | 陰性 |
| 412 | 坂出市 | R3.11.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約50kg | R3.12.6 | 陰性 |
| 413 | まんのう町 | R3.11.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約100kg | R3.12.6 | 陰性 |
| 414 | まんのう町 | R3.11.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R3.12.6 | 陰性 |
| 415 | まんのう町 | R3.11.24 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約5kg | R3.12.13 | 陰性 |
| 416 | まんのう町 | R3.12.4 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約8kg | R3.12.13 | 陰性 |
| 417 | 坂出市 | R3.12.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R3.12.13 | 陰性 |
| 418 | 東かがわ市 | R3.11.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約40kg | R3.12.13 | 陰性 |
| 419 | 東かがわ市 | R3.12.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約30kg | R3.12.13 | 陰性 |
| 420 | 東かがわ市 | R3.12.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約20kg | R3.12.13 | 陰性 |
| 421 | 東かがわ市 | R3.12.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約20kg | R3.12.13 | 陰性 |
| 422 | 東かがわ市 | R3.12.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約20kg | R3.12.13 | 陰性 |
| 423 | まんのう町 | R3.12.12 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R3.12.20 | 陰性 |
| 424 | まんのう町 | R3.12.11 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約8kg | R3.12.20 | 陰性 |
| 425 | まんのう町 | R3.12.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約12kg | R3.12.20 | 陰性 |
| 426 | 観音寺市 | R3.12.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約25kg | R3.12.20 | 陰性 |
| 427 | 坂出市 | R3.12.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約86cm | 約25kg | R3.12.20 | 陰性 |
| 428 | 高松市 | R3.12.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R3.12.27 | 陰性 |
| 429 | 高松市 | R3.12.23 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約10kg | R3.12.27 | 陰性 |
| 430 | 坂出市 | R3.12.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R3.12.27 | 陰性 |
| 431 | 坂出市 | R3.12.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R4.1.4 | 陰性 |
| 432 | 坂出市 | R4.1.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R4.1.11 | 陰性 |
| 433 | 東かがわ市 | R3.12.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R4.1.11 | 陰性 |
| 434 | 多度津町 | R4.1.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約35kg | R4.1.11 | 陰性 |
| 435 | 丸亀市 | R4.1.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約50kg | R4.1.17 | 陰性 |
| 436 | 丸亀市 | R4.1.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約80kg | R4.1.17 | 陰性 |
| 437 | 高松市 | R4.1.17 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約100cm | 約25kg | R4.1.17 | 陰性 |
| 438 | 高松市 | R4.1.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約90kg | R4.1.31 | 陰性 |
| 439 | 三豊市 | R4.1.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約35kg | R4.1.31 | 陰性 |
| 440 | 三豊市 | R4.1.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R4.1.31 | 陰性 |
| 441 | 丸亀市 | R4.1.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約55kg | R4.1.31 | 陰性 |
| 442 | 三豊市 | R4.1.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約35kg | R4.1.31 | 陰性 |
| 443 | 東かがわ市 | R4.1.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R4.1.31 | 陰性 |
| 444 | 三豊市 | R4.1.31 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R4.2.7 | 陰性 |
| 445 | 高松市 | R4.1.31 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R4.2.1 | 陰性 |
| 446 | 東かがわ市 | R4.2.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約70kg | R4.2.7 | 陰性 |
| 447 | 東かがわ市 | R4.2.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約50kg | R4.2.7 | 陰性 |
| 448 | 東かがわ市 | R4.2.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R4.2.14 | 陰性 |
| 449 | 東かがわ市 | R4.2.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R4.2.14 | 陰性 |
| 450 | まんのう町 | R4.2.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約90kg | R4.2.14 | 陰性 |
| 451 | まんのう町 | R4.2.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約60kg | R4.2.14 | 陰性 |
| 452 | 丸亀市 | R4.2.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約50kg | R4.2.14 | 陰性 |
| 453 | 丸亀市 | R4.2.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm | 約35kg | R4.2.28 | 陰性 |
| 454 | 丸亀市 | R4.2.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約60kg | R4.3.3 | 陰性 |
| 455 | 小豆島町 | R4.3.2 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約60kg | R4.3.3 | 陰性 |
| 456 | 高松市 | R4.5.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約20kg | R4.5.23 | 陰性 |
| 457 | 小豆島町 | R4.5.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約30kg | R4.5.31 | 陰性 |
| 458 | 小豆島町 | R4.5.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R4.5.31 | 陰性 |
| 459 | 小豆島町 | R4.5.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約55kg | R4.5.31 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|----|---|----|--------|-------|---------|----|
| 460 | 小豆島町 | R4.5.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約47kg | R4.5.31 | 陰性 |
| 461 | 小豆島町 | R4.5.23 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約36kg | R4.5.31 | 陰性 |
| 462 | 小豆島町 | R4.5.23 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約11kg | R4.5.31 | 陰性 |
| 463 | 小豆島町 | R4.5.23 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約38kg | R4.5.31 | 陰性 |
| 464 | 小豆島町 | R4.5.23 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約45cm | 約5kg | R4.5.31 | 陰性 |
| 465 | 小豆島町 | R4.5.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約62kg | R4.5.31 | 陰性 |
| 466 | 土庄町 | R4.5.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約18kg | R4.5.31 | 陰性 |
| 467 | 高松市 | R4.5.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R4.5.31 | 陰性 |
| 468 | 高松市 | R4.5.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約70kg | R4.5.31 | 陰性 |
| 469 | 三木町 | R4.5.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R4.5.31 | 陰性 |
| 470 | 坂出市 | R4.5.27 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約6kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 471 | 土庄町 | R4.5.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約22kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 472 | 高松市 | R4.6.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約40kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 473 | 小豆島町 | R4.6.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 474 | 小豆島町 | R4.5.31 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約51kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 475 | 土庄町 | R4.6.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約38kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 476 | 小豆島町 | R4.6.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約30kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 477 | 小豆島町 | R4.6.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約29kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 478 | 小豆島町 | R4.6.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約35kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 479 | 小豆島町 | R4.6.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 480 | 高松市 | R4.6.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 481 | 土庄町 | R4.6.3 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 482 | 小豆島町 | R4.6.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約42kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 483 | 土庄町 | R4.6.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約50cm | 約20kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 484 | 土庄町 | R4.6.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約27kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 485 | 東かがわ市 | R4.6.3 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約15kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 486 | 東かがわ市 | R4.6.3 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約18kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 487 | 坂出市 | R4.6.6 | 捕獲 | 雄 | 不明 | 約50cm | 約30kg | R4.6.14 | 陰性 |
| 488 | 土庄町 | R4.6.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約42kg | R4.6.7 | 陰性 |
| 489 | 東かがわ市 | R4.6.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約50kg | R4.6.14 | 陰性 |
| 490 | 土庄町 | R4.6.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約51kg | R4.6.14 | 陰性 |
| 491 | 丸亀市 | R4.6.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R4.6.14 | 陰性 |
| 492 | 丸亀市 | R4.6.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R4.6.14 | 陰性 |
| 493 | 丸亀市 | R4.6.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R4.6.14 | 陰性 |
| 494 | さぬき市 | R4.6.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R4.6.14 | 陰性 |
| 495 | 坂出市 | R4.6.7 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約6kg | R4.6.14 | 陰性 |
| 496 | さぬき市 | R4.6.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約108cm | 約45kg | R4.6.14 | 陰性 |
| 497 | 坂出市 | R4.6.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約50kg | R4.6.21 | 陰性 |
| 498 | 坂出市 | R4.6.14 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約80cm | 約20kg | R4.6.21 | 陰性 |
| 499 | 丸亀市 | R4.6.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約35kg | R4.6.21 | 陰性 |
| 500 | 土庄町 | R4.6.10 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約55cm | 約7kg | R4.6.21 | 陰性 |
| 501 | 土庄町 | R4.6.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約24kg | R4.6.21 | 陰性 |
| 502 | 土庄町 | R4.6.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約20kg | R4.6.21 | 陰性 |
| 503 | 土庄町 | R4.6.12 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約6kg | R4.6.21 | 陰性 |
| 504 | 土庄町 | R4.6.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約26kg | R4.6.21 | 陰性 |
| 505 | 綾川町 | R4.6.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約27kg | R4.6.21 | 陰性 |
| 506 | 東かがわ市 | R4.6.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約70kg | R4.6.21 | 陰性 |
| 507 | 東かがわ市 | R4.6.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約15kg | R4.6.21 | 陰性 |
| 508 | 綾川町 | R4.6.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約34kg | R4.6.28 | 陰性 |
| 509 | 高松市 | R4.6.27 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約3kg | R4.6.28 | 陰性 |
| 510 | 坂出市 | R4.6.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約30kg | R4.7.5 | 陰性 |
| 511 | 綾川町 | R4.6.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約30kg | R4.7.5 | 陰性 |
| 512 | 丸亀市 | R4.6.30 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約30cm | 約1kg | R4.7.5 | 陰性 |
| 513 | 土庄町 | R4.7.1 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約6kg | R4.7.5 | 陰性 |
| 514 | 土庄町 | R4.7.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約74kg | R4.7.5 | 陰性 |
| 515 | 小豆島町 | R4.7.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約32kg | R4.7.5 | 陰性 |
| 516 | 土庄町 | R4.7.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R4.7.5 | 陰性 |
| 517 | 丸亀市 | R4.7.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R4.7.11 | 陰性 |
| 518 | 小豆島町 | R4.7.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約25kg | R4.7.6 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|---------|----|----|----|--------|-------|---------|----|
| 519 | 小豆島町 | R4.7.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約44kg | R4.7.6 | 陰性 |
| 520 | 小豆島町 | R4.7.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約26kg | R4.7.6 | 陰性 |
| 521 | 土庄町 | R4.7.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R4.7.6 | 陰性 |
| 522 | 小豆島町 | R4.7.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約92cm | 約33kg | R4.7.6 | 陰性 |
| 523 | 小豆島町 | R4.7.4 | 死亡 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約3kg | R4.7.6 | 陰性 |
| 524 | さぬき市 | R4.7.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約35kg | R4.7.6 | 陰性 |
| 525 | 土庄町 | R4.7.5 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約55cm | 約7kg | R4.7.11 | 陰性 |
| 526 | 小豆島町 | R4.7.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約26kg | R4.7.11 | 陰性 |
| 527 | 高松市 | R4.7.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R4.7.11 | 陰性 |
| 528 | 坂出市 | R4.7.5 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約90cm | 約20kg | R4.7.20 | 陰性 |
| 529 | 坂出市 | R4.7.10 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約90cm | 約20kg | R4.7.20 | 陰性 |
| 530 | 丸亀市 | R4.7.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R4.7.20 | 陰性 |
| 531 | さぬき市 | R4.7.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R4.7.20 | 陰性 |
| 532 | 高松市 | R4.7.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R4.7.20 | 陰性 |
| 533 | 高松市 | R4.7.16 | 死亡 | 不明 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | | |
| 534 | 坂出市 | R4.7.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約35kg | R4.7.25 | 陰性 |
| 535 | 丸亀市 | R4.7.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R4.7.25 | 陰性 |
| 536 | 高松市 | R4.7.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R4.7.25 | 陰性 |
| 537 | 坂出市 | R4.7.20 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約100cm | 約20kg | R4.7.25 | 陰性 |
| 538 | 高松市 | R4.7.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 539 | 高松市 | R4.7.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約130cm | 約40kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 540 | 高松市 | R4.7.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約20kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 541 | 高松市 | R4.7.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約24kg | R4.7.25 | 陰性 |
| 542 | 三豊市 | R4.7.25 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約15kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 543 | 高松市 | R4.7.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 544 | さぬき市 | R4.7.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 545 | 坂出市 | R4.7.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約30kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 546 | 高松市 | R4.7.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約23kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 547 | 高松市 | R4.7.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約19kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 548 | 高松市 | R4.7.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約35kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 549 | 高松市 | R4.7.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約18kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 550 | 高松市 | R4.7.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約20kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 551 | 高松市 | R4.7.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約36kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 552 | 高松市 | R4.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約37kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 553 | 高松市 | R4.8.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 554 | 高松市 | R4.8.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約47kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 555 | 高松市 | R4.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約21kg | R4.8.2 | 陰性 |
| 556 | 坂出市 | R4.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約69cm | 約16kg | R4.8.9 | 陰性 |
| 557 | 坂出市 | R4.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約69cm | 約16kg | R4.8.9 | 陰性 |
| 558 | 坂出市 | R4.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約113cm | 約80kg | R4.8.9 | 陰性 |
| 559 | 高松市 | R4.8.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約23kg | R4.8.9 | 陰性 |
| 560 | 高松市 | R4.8.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R4.8.9 | 陰性 |
| 561 | 三豊市 | R4.8.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約50kg | R4.8.9 | 陰性 |
| 562 | さぬき市 | R4.8.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約90kg | R4.8.9 | 陰性 |
| 563 | 高松市 | R4.8.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R4.8.15 | 陰性 |
| 564 | 高松市 | R4.8.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約18kg | R4.8.15 | 陰性 |
| 565 | 高松市 | R4.8.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R4.8.15 | 陰性 |
| 566 | 高松市 | R4.8.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約124cm | 約67kg | R4.8.15 | 陰性 |
| 567 | さぬき市 | R4.8.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約35kg | R4.8.15 | 陰性 |
| 568 | 坂出市 | R4.8.16 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約85cm | 約28kg | R4.8.22 | 陰性 |
| 569 | 坂出市 | R4.7.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約30kg | R4.8.22 | 陰性 |
| 570 | 坂出市 | R4.7.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約88cm | 約30kg | R4.8.22 | 陰性 |
| 571 | 高松市 | R4.8.17 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R4.8.22 | 陰性 |
| 572 | 坂出市 | R4.7.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約20kg | R4.8.22 | 陰性 |
| 573 | 高松市 | R4.8.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R4.8.22 | 陰性 |
| 574 | さぬき市 | R4.8.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約60kg | R4.8.22 | 陰性 |
| 575 | さぬき市 | R4.8.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約40kg | R4.8.29 | 陰性 |
| 576 | 丸亀市 | R4.8.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R4.8.29 | 陰性 |
| 577 | 多度津町 | R4.8.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約150cm | 約50kg | R4.8.29 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|----|----|----|--------|-------|---------|----|
| 578 | 観音寺市 | R4.8.29 | 死亡 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | | |
| 579 | 高松市 | R4.8.29 | 死亡 | 不明 | 成獣 | 約80cm | 不明 | | |
| 580 | 多度津町 | R4.8.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約180cm | 約70kg | R4.9.6 | 陰性 |
| 581 | 丸亀市 | R4.8.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約70kg | R4.9.6 | 陰性 |
| 582 | 三豊市 | R4.8.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約10kg | R4.9.6 | 陰性 |
| 583 | さぬき市 | R4.9.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R4.9.6 | 陰性 |
| 584 | 三豊市 | R4.9.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R4.9.6 | 陰性 |
| 585 | さぬき市 | R4.9.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R4.9.6 | 陰性 |
| 586 | 小豆島町 | R4.9.2 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約50cm | 約10kg | R4.9.6 | 陰性 |
| 587 | 土庄町 | R4.9.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約7kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 588 | 土庄町 | R4.9.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約57kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 589 | 小豆島町 | R4.9.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約18kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 590 | 小豆島町 | R4.9.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約51kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 591 | 小豆島町 | R4.9.5 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約20kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 592 | 小豆島町 | R4.9.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約15kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 593 | 土庄町 | R4.9.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約34kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 594 | 土庄町 | R4.9.5 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約65cm | 約9kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 595 | 小豆島町 | R4.9.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約23kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 596 | 小豆島町 | R4.9.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約32kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 597 | 小豆島町 | R4.9.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約13kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 598 | 土庄町 | R4.9.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約46kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 599 | 小豆島町 | R4.9.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm | 約13kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 600 | さぬき市 | R4.9.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R4.9.6 | 陰性 |
| 601 | さぬき市 | R4.9.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R4.9.6 | 陰性 |
| 602 | 観音寺市 | R4.9.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 603 | 小豆島町 | R4.9.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約31kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 604 | 土庄町 | R4.9.7 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約10kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 605 | 土庄町 | R4.9.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約19kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 606 | 小豆島町 | R4.9.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約32kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 607 | 小豆島町 | R4.9.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約40kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 608 | 小豆島町 | R4.9.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約83cm | 約20kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 609 | 小豆島町 | R4.9.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 610 | 小豆島町 | R4.9.6 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約8kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 611 | 小豆島町 | R4.9.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約53kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 612 | 土庄町 | R4.9.9 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約11kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 613 | 土庄町 | R4.9.9 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約75cm | 約12kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 614 | 土庄町 | R4.9.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 615 | 高松市 | R4.9.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約83cm | 約17kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 616 | さぬき市 | R4.9.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約40kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 617 | 東かがわ市 | R4.9.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約50kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 618 | 高松市 | R4.9.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約43kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 619 | 小豆島町 | R4.9.9 | 死亡 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約10kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 620 | 坂出市 | R4.8.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約80kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 621 | 坂出市 | R4.9.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 622 | 小豆島町 | R4.9.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約31kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 623 | 小豆島町 | R4.9.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約20kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 624 | 小豆島町 | R4.9.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約42kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 625 | 小豆島町 | R4.9.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約12kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 626 | 土庄町 | R4.9.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約13kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 627 | 土庄町 | R4.9.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約145cm | 約90kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 628 | 土庄町 | R4.9.12 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約9kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 629 | さぬき市 | R4.9.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 630 | さぬき市 | R4.9.11 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約20cm | 約1kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 631 | 小豆島町 | R4.9.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R4.9.12 | 陰性 |
| 632 | 観音寺市 | R4.9.13 | 死亡 | 不明 | 幼獣 | 約40cm | 不明 | | |
| 633 | 高松市 | R4.9.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約27kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 634 | 高松市 | R4.9.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約92cm | 約23kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 635 | 小豆島町 | R4.9.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約30kg | R4.9.20 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|----|----|----|--------|-------|----------|----|
| 636 | 小豆島町 | R4.9.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約28kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 637 | 土庄町 | R4.9.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約12kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 638 | 土庄町 | R4.9.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約13kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 639 | 小豆島町 | R4.9.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約25kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 640 | 小豆島町 | R4.9.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 641 | 土庄町 | R4.9.14 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約9kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 642 | 東かがわ市 | R4.9.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約45kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 643 | 高松市 | R4.9.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約20kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 644 | 観音寺市 | R4.9.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約25kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 645 | 観音寺市 | R4.9.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 646 | 高松市 | R4.9.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約21kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 647 | 高松市 | R4.9.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約64cm | 約8kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 648 | 高松市 | R4.9.16 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約63cm | 約8kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 649 | 高松市 | R4.9.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約134cm | 約64kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 650 | 高松市 | R4.9.20 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R4.9.20 | 陰性 |
| 651 | 観音寺市 | R4.9.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約40kg | R4.9.26 | 陰性 |
| 652 | 高松市 | R4.9.20 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約5kg | R4.9.26 | 陰性 |
| 653 | 高松市 | R4.9.24 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約15kg | R4.9.26 | 陰性 |
| 654 | 高松市 | R4.9.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R4.10.4 | 陰性 |
| 655 | 観音寺市 | R4.9.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約62cm | 約7kg | R4.10.4 | 陰性 |
| 656 | 高松市 | R4.9.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約11kg | R4.10.4 | 陰性 |
| 657 | さぬき市 | R4.9.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約30cm | 約10kg | R4.10.4 | 陰性 |
| 658 | 高松市 | R4.9.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約52kg | R4.10.4 | 陰性 |
| 659 | さぬき市 | R4.9.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約70kg | R4.10.4 | 陰性 |
| 660 | 高松市 | R4.10.3 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約10kg | R4.10.4 | 陰性 |
| 661 | さぬき市 | R4.10.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約45kg | R4.10.4 | 陰性 |
| 662 | 高松市 | R4.10.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R4.10.11 | 陰性 |
| 663 | 高松市 | R4.10.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約34kg | R4.10.11 | 陰性 |
| 664 | さぬき市 | R4.10.6 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約8kg | R4.10.11 | 陰性 |
| 665 | 高松市 | R4.10.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R4.10.11 | 陰性 |
| 666 | 観音寺市 | R4.10.11 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約10kg | R4.10.17 | 陰性 |
| 667 | 高松市 | R4.10.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R4.10.17 | 陰性 |
| 668 | 高松市 | R4.10.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R4.10.17 | 陰性 |
| 669 | 観音寺市 | R4.10.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R4.10.17 | 陰性 |
| 670 | 観音寺市 | R4.10.9 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約80cm | 約15kg | R4.10.17 | 陰性 |
| 671 | 三豊市 | R4.10.12 | 死亡 | 不明 | 成獣 | 不明 | 不明 | | |
| 672 | 高松市 | R4.10.13 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約90cm | 約15kg | R4.10.17 | 陰性 |
| 673 | 高松市 | R4.10.18 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約85cm | 約25kg | R4.10.24 | 陰性 |
| 674 | 観音寺市 | R4.10.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約35kg | R4.10.24 | 陰性 |
| 675 | 三豊市 | R4.10.21 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約73cm | 約20kg | R4.11.1 | 陰性 |
| 676 | 三豊市 | R4.10.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約25kg | R4.11.1 | 陰性 |
| 677 | 高松市 | R4.10.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R4.11.1 | 陰性 |
| 678 | さぬき市 | R4.10.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約40kg | R4.11.1 | 陰性 |
| 679 | 観音寺市 | R4.10.31 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 不明 | 約40kg | R4.11.8 | 陰性 |
| 680 | 高松市 | R4.11.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約62kg | R4.11.8 | 陰性 |
| 681 | 高松市 | R4.11.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約39kg | R4.11.8 | 陰性 |
| 682 | 高松市 | R4.11.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約42kg | R4.11.8 | 陰性 |
| 683 | 東かがわ市 | R4.11.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R4.11.8 | 陰性 |
| 684 | 小豆島町 | R4.11.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約32kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 685 | 小豆島町 | R4.11.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約45kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 686 | 土庄町 | R4.11.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約26kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 687 | 土庄町 | R4.11.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約89cm | 約20kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 688 | 土庄町 | R4.11.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約54kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 689 | 小豆島町 | R4.11.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約30kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 690 | 小豆島町 | R4.11.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約124cm | 約75kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 691 | 小豆島町 | R4.11.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約67kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 692 | 土庄町 | R4.11.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約65kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 693 | 小豆島町 | R4.11.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約18kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 694 | 小豆島町 | R4.11.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R4.11.14 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|----|----|----|--------|-------|----------|----|
| 695 | 土庄町 | R4.11.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約38kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 696 | 土庄町 | R4.11.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約55kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 697 | 高松市 | R4.11.10 | 死亡 | 不明 | 成獣 | 不明 | 不明 | | |
| 698 | 東かがわ市 | R4.11.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約40kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 699 | 土庄町 | R4.11.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約17kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 700 | 高松市 | R4.11.11 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 701 | 三豊市 | R4.11.7 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約85cm | 約20kg | R4.11.22 | 陰性 |
| 702 | 三豊市 | R4.11.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約70kg | R4.11.22 | 陰性 |
| 703 | 土庄町 | R4.9.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 704 | 土庄町 | R4.9.22 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約45cm | 約6kg | R4.11.14 | 陰性 |
| 705 | 東かがわ市 | R4.11.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約70kg | R4.11.22 | 陰性 |
| 706 | 三豊市 | R4.11.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R4.11.22 | 陰性 |
| 707 | 三豊市 | R4.11.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R4.11.22 | 陰性 |
| 708 | 三豊市 | R4.11.17 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約55cm | 約5kg | R4.11.22 | 陰性 |
| 709 | 東かがわ市 | R4.11.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R4.11.22 | 陰性 |
| 710 | 東かがわ市 | R4.11.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R4.11.22 | 陰性 |
| 711 | 東かがわ市 | R4.11.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R4.11.22 | 陰性 |
| 712 | 東かがわ市 | R4.11.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R4.11.22 | 陰性 |
| 713 | 東かがわ市 | R4.11.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R4.11.22 | 陰性 |
| 714 | 東かがわ市 | R4.11.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R4.11.22 | 陰性 |
| 715 | 東かがわ市 | R4.11.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R4.11.22 | 陰性 |
| 716 | 三豊市 | R4.11.20 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約75cm | 約15kg | R4.11.28 | 陰性 |
| 717 | 三豊市 | R4.11.20 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約75cm | 約15kg | R4.11.28 | 陰性 |
| 718 | 東かがわ市 | R4.11.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約60kg | R4.11.28 | 陰性 |
| 719 | 東かがわ市 | R4.11.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R4.11.28 | 陰性 |
| 720 | 三豊市 | R4.11.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R4.11.28 | 陰性 |
| 721 | 小豆島町 | R4.12.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm | 約10kg | R4.12.5 | 陰性 |
| 722 | 土庄町 | R4.11.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約17kg | R4.12.5 | 陰性 |
| 723 | 土庄町 | R4.12.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約23kg | R4.12.5 | 陰性 |
| 724 | 小豆島町 | R4.12.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約78kg | R4.12.5 | 陰性 |
| 725 | 小豆島町 | R4.12.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約75kg | R4.12.5 | 陰性 |
| 726 | 小豆島町 | R4.11.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約68cm | 約26kg | R4.12.5 | 陰性 |
| 727 | 東かがわ市 | R4.12.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R4.12.5 | 陰性 |
| 728 | 小豆島町 | R4.12.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約38kg | R4.12.13 | 陰性 |
| 729 | 小豆島町 | R4.12.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R4.12.13 | 陰性 |
| 730 | 土庄町 | R4.12.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約14kg | R4.12.13 | 陰性 |
| 731 | 土庄町 | R4.12.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約13kg | R4.12.13 | 陰性 |
| 732 | 土庄町 | R4.12.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R4.12.13 | 陰性 |
| 733 | 土庄町 | R4.12.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約43kg | R4.12.13 | 陰性 |
| 734 | 土庄町 | R4.12.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約15kg | R4.12.13 | 陰性 |
| 735 | さぬき市 | R4.12.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約20kg | R4.12.13 | 陰性 |
| 736 | さぬき市 | R4.12.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約20kg | R4.12.13 | 陰性 |
| 737 | 東かがわ市 | R4.12.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R4.12.13 | 陰性 |
| 738 | さぬき市 | R4.12.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約80kg | R4.12.13 | 陰性 |
| 739 | さぬき市 | R4.12.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約40kg | R4.12.13 | 陰性 |
| 740 | 多度津町 | R4.12.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約50kg | R4.12.20 | 陰性 |
| 741 | 多度津町 | R4.12.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約90kg | R4.12.20 | 陰性 |
| 742 | 東かがわ市 | R4.11.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R4.12.20 | 陰性 |
| 743 | 東かがわ市 | R4.11.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約20kg | R4.12.20 | 陰性 |
| 744 | 東かがわ市 | R4.11.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約20kg | R4.12.20 | 陰性 |
| 745 | 東かがわ市 | R4.11.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約25kg | R4.12.20 | 陰性 |
| 746 | 東かがわ市 | R4.11.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約35kg | R4.12.20 | 陰性 |
| 747 | 東かがわ市 | R4.11.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約40kg | R4.12.20 | 陰性 |
| 748 | 東かがわ市 | R4.12.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約35kg | R4.12.20 | 陰性 |
| 749 | 東かがわ市 | R4.12.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R4.12.20 | 陰性 |
| 750 | 三豊市 | R4.12.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約25kg | R4.12.26 | 陰性 |
| 751 | 三豊市 | R4.12.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約125cm | 約80kg | R4.12.26 | 陰性 |
| 752 | 三豊市 | R4.11.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約73cm | 約50kg | R4.12.26 | 陰性 |
| 753 | 三豊市 | R4.11.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約50cm | 約30kg | R4.12.26 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|----|----|----|--------|--------|----------|-----|
| 754 | 三豊市 | R4.12.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約130cm | 約90kg | R4.12.26 | 陰性 |
| 755 | 三豊市 | R4.12.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約30kg | R4.12.26 | 陰性 |
| 756 | 東かがわ市 | R4.12.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R4.12.26 | 陰性 |
| 757 | 東かがわ市 | R4.12.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約35kg | R4.12.26 | 陰性 |
| 758 | 多度津町 | R5.1.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R5.1.11 | 陰性 |
| 759 | 坂出市 | R5.1.4 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約10kg | R5.1.11 | 陽性① |
| 760 | 小豆島町 | R5.1.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約22kg | R5.1.11 | 陰性 |
| 761 | 土庄町 | R5.1.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約60kg | R5.1.11 | 陰性 |
| 762 | 小豆島町 | R5.1.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.1.11 | 陰性 |
| 763 | 土庄町 | R5.1.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約22kg | R5.1.11 | 陰性 |
| 764 | 小豆島町 | R5.1.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約125cm | 約100kg | R5.1.11 | 陰性 |
| 765 | 小豆島町 | R5.1.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R5.1.11 | 陰性 |
| 766 | 土庄町 | R5.1.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約37kg | R5.1.11 | 陰性 |
| 767 | 小豆島町 | R5.1.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約23kg | R5.1.11 | 陰性 |
| 768 | さぬき市 | R5.1.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R5.1.11 | 陰性 |
| 769 | 小豆島町 | R5.1.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約23kg | R5.1.16 | 陰性 |
| 770 | 土庄町 | R5.1.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約12kg | R5.1.16 | 陰性 |
| 771 | 小豆島町 | R5.1.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約60kg | R5.1.16 | 陰性 |
| 772 | 小豆島町 | R5.1.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約25kg | R5.1.16 | 陰性 |
| 773 | 坂出市 | R5.1.18 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R5.1.23 | 陽性② |
| 774 | 坂出市 | R5.1.18 | 死亡 | 不明 | 成獣 | 約130cm | 約80kg | | |
| 775 | 高松市 | R5.1.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約25kg | R5.1.23 | 陰性 |
| 776 | 坂出市 | R5.1.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約30kg | R5.1.30 | 陰性 |
| 777 | 坂出市 | R5.1.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約28kg | R5.1.30 | 陰性 |
| 778 | 高松市 | R5.1.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約103cm | 約35kg | R5.1.30 | 陰性 |
| 779 | 坂出市 | R5.1.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約118cm | 約65kg | R5.1.30 | 陰性 |
| 780 | 高松市 | R5.1.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約25kg | R5.1.30 | 陰性 |
| 781 | 高松市 | R5.1.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R5.1.30 | 陰性 |
| 782 | 高松市 | R5.1.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R5.1.30 | 陰性 |
| 783 | 高松市 | R5.1.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約93kg | R5.1.30 | 陰性 |
| 784 | 三豊市 | R5.1.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約135cm | 約110kg | R5.1.30 | 陰性 |
| 785 | 高松市 | R5.1.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約135cm | 約110kg | R5.1.30 | 陰性 |
| 786 | 綾川町 | R5.1.27 | 死亡 | 不明 | 幼獣 | 約50cm | 約3kg | R5.1.30 | 陰性 |
| 787 | 坂出市 | R5.1.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約20kg | R5.2.6 | 陰性 |
| 788 | 高松市 | R5.1.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約40kg | R5.1.30 | 陰性 |
| 789 | 高松市 | R5.1.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約75kg | R5.2.6 | 陰性 |
| 790 | 土庄町 | R5.2.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約14kg | R5.2.6 | 陰性 |
| 791 | 綾川町 | R5.2.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約125cm | 約36kg | R5.2.6 | 陰性 |
| 792 | 丸亀市 | R5.2.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R5.2.6 | 陰性 |
| 793 | 丸亀市 | R5.2.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約118cm | 約35kg | R5.2.6 | 陰性 |
| 794 | 三豊市 | R5.1.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約130cm | 約60kg | R5.2.6 | 陰性 |
| 795 | 三豊市 | R5.1.31 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約55kg | R5.2.6 | 陰性 |
| 796 | 三豊市 | R5.2.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R5.2.6 | 陰性 |
| 797 | 坂出市 | R5.2.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約55kg | R5.2.14 | 陰性 |
| 798 | 多度津町 | R5.2.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R5.2.14 | 陰性 |
| 799 | 多度津町 | R5.2.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.2.14 | 陰性 |
| 800 | 高松市 | R5.2.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約60kg | R5.2.14 | 陰性 |
| 801 | 坂出市 | R5.2.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約135cm | 約95kg | R5.2.14 | 陰性 |
| 802 | 高松市 | R5.2.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R5.2.14 | 陰性 |
| 803 | 綾川町 | R5.2.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約125cm | 約50kg | R5.2.14 | 陰性 |
| 804 | 東かがわ市 | R5.2.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約14kg | R5.2.14 | 陰性 |
| 805 | 坂出市 | R5.2.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R5.2.14 | 陰性 |
| 806 | 坂出市 | R5.2.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R5.2.14 | 陰性 |
| 807 | 綾川町 | R5.2.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R5.2.14 | 陰性 |
| 808 | 丸亀市 | R5.2.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R5.2.14 | 陰性 |
| 809 | 丸亀市 | R5.2.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R5.2.14 | 陰性 |
| 810 | 高松市 | R5.2.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R5.2.14 | 陰性 |
| 811 | 高松市 | R5.2.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約25kg | R5.2.14 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|---------|----|----|----|--------|--------|---------|-----|
| 812 | 坂出市 | R5.2.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R5.2.21 | 陰性 |
| 813 | 高松市 | R5.2.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約140cm | 約100kg | R5.2.21 | 陰性 |
| 814 | 坂出市 | R5.2.15 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約11kg | R5.2.21 | 陰性 |
| 815 | 綾川町 | R5.2.16 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約45kg | R5.2.21 | 陰性 |
| 816 | 綾川町 | R5.2.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約77cm | 不明 | R5.2.27 | 陰性 |
| 817 | 坂出市 | R5.2.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約117cm | 約65kg | R5.2.27 | 陰性 |
| 818 | 坂出市 | R5.2.23 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R5.2.27 | 陰性 |
| 819 | 坂出市 | R5.2.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.2.27 | 陰性 |
| 820 | 綾川町 | R5.2.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約98cm | 約26kg | R5.3.6 | 陰性 |
| 821 | 坂出市 | R5.2.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R5.3.6 | 陰性 |
| 822 | 高松市 | R5.2.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R5.3.6 | 陰性 |
| 823 | 丸亀市 | R5.2.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約60kg | R5.3.6 | 陰性 |
| 824 | 綾川町 | R5.2.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約107cm | 約40kg | R5.3.6 | 陰性 |
| 825 | 高松市 | R5.2.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約134cm | 約100kg | R5.3.6 | 陰性 |
| 826 | 坂出市 | R5.2.28 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R5.2.28 | 陰性 |
| 827 | 高松市 | R5.3.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約137cm | 約60kg | R5.3.6 | 陰性 |
| 828 | 坂出市 | R5.3.10 | 死亡 | 不明 | 成獣 | 約100cm | 不明 | | |
| 829 | 高松市 | R5.3.20 | 死亡 | 不明 | 成獣 | 約60cm | 不明 | | |
| 830 | 高松市 | R5.3.28 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約80kg | R5.3.29 | 陰性 |
| 831 | 坂出市 | R5.4.25 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約50kg | R5.4.26 | 陽性③ |
| 832 | 高松市 | R5.5.1 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R5.5.2 | 陽性④ |
| 833 | 高松市 | R5.5.5 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約60kg | | |
| 834 | 高松市 | R5.5.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約60kg | R5.5.16 | 陰性 |
| 835 | 高松市 | R5.5.11 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R5.5.16 | 陽性⑤ |
| 836 | 高松市 | R5.5.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約18kg | R5.5.16 | 陰性 |
| 837 | 綾川町 | R5.5.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約117cm | 約40kg | R5.5.16 | 陰性 |
| 838 | 綾川町 | R5.5.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約97cm | 約18kg | R5.5.16 | 陰性 |
| 839 | 高松市 | R5.5.13 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約20kg | | |
| 840 | 高松市 | R5.5.13 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R5.5.16 | 陰性 |
| 841 | 高松市 | R5.5.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約15kg | R5.5.16 | 陰性 |
| 842 | 綾川町 | R5.5.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約125cm | 約50kg | R5.5.22 | 陰性 |
| 843 | 綾川町 | R5.5.17 | 捕獲 | 雄 | 不明 | 約99cm | 不明 | R5.5.22 | 陰性 |
| 844 | 綾川町 | R5.5.17 | 捕獲 | 雄 | 不明 | 約99cm | 不明 | R5.5.22 | 陰性 |
| 845 | 丸亀市 | R5.5.18 | 捕獲 | 雌 | 不明 | 約65cm | 約15kg | R5.5.22 | 陰性 |
| 846 | 高松市 | R5.5.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R5.5.30 | 陰性 |
| 847 | 高松市 | R5.5.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R5.5.30 | 陰性 |
| 848 | 綾川町 | R5.5.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約109cm | 約37kg | R5.5.30 | 陰性 |
| 849 | 高松市 | R5.5.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R5.5.30 | 陰性 |
| 850 | 綾川町 | R5.5.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約135cm | 約75kg | R5.5.30 | 陰性 |
| 851 | 綾川町 | R5.5.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約111cm | 不明 | R5.6.6 | 陰性 |
| 852 | 綾川町 | R5.5.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約140cm | 約63kg | R5.6.6 | 陰性 |
| 853 | 綾川町 | R5.5.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約114cm | 不明 | R5.6.6 | 陰性 |
| 854 | 高松市 | R5.5.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約28kg | R5.5.30 | 陰性 |
| 855 | 高松市 | R5.6.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R5.6.13 | 陰性 |
| 856 | 高松市 | R5.6.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R5.6.6 | 陽性⑥ |
| 857 | 高松市 | R5.6.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約60kg | R5.6.6 | 陽性⑦ |
| 858 | 高松市 | R5.6.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R5.6.13 | 陰性 |
| 859 | 高松市 | R5.6.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R5.6.13 | 陰性 |
| 860 | 高松市 | R5.6.10 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R5.6.13 | 陰性 |
| 861 | 高松市 | R5.6.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約21kg | R5.6.13 | 陰性 |
| 862 | 高松市 | R5.6.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R5.6.19 | 陰性 |
| 863 | 高松市 | R5.6.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約20kg | R5.6.19 | 陰性 |
| 864 | 綾川町 | R5.6.16 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 約97cm | 約26kg | R5.6.19 | 陰性 |
| 865 | 高松市 | R5.6.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約15kg | R5.6.26 | 陰性 |
| 866 | 高松市 | R5.6.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R5.6.26 | 陰性 |
| 867 | さぬき市 | R5.6.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R5.6.26 | 陰性 |
| 868 | 綾川町 | R5.6.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約91cm | 約25kg | R5.6.26 | 陰性 |
| 869 | 坂出市 | R5.6.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.6.26 | 陰性 |
| 870 | さぬき市 | R5.6.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R5.6.26 | 陰性 |
| 871 | 高松市 | R5.6.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R5.6.26 | 陰性 |
| 872 | 三豊市 | R5.6.24 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約90cm | 約25kg | R5.7.4 | 陰性 |
| 873 | 綾川町 | R5.6.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約108cm | 約28kg | R5.7.4 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|---------|----|---|----|--------|-------|---------|-----|
| 874 | 高松市 | R5.6.23 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R5.7.4 | 陰性 |
| 875 | 丸亀市 | R5.6.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約35kg | R5.7.4 | 陰性 |
| 876 | 綾川町 | R5.6.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約121cm | 約52kg | R5.7.4 | 陰性 |
| 877 | 土庄町 | R5.7.2 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約53cm | 約6kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 878 | 土庄町 | R5.7.3 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約8kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 879 | 土庄町 | R5.7.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約17kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 880 | 土庄町 | R5.7.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約15kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 881 | 土庄町 | R5.7.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約23kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 882 | 小豆島町 | R5.7.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約28kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 883 | 小豆島町 | R5.7.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約39kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 884 | 三豊市 | R5.7.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約45kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 885 | 綾川町 | R5.7.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約111cm | 約33kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 886 | 高松市 | R5.7.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R5.7.4 | 陰性 |
| 887 | 小豆島町 | R5.7.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 888 | 土庄町 | R5.7.4 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約7kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 889 | 小豆島町 | R5.7.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約28kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 890 | 小豆島町 | R5.7.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約46kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 891 | 高松市 | R5.7.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約20kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 892 | 小豆島町 | R5.7.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 893 | 小豆島町 | R5.7.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約38kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 894 | 小豆島町 | R5.7.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 895 | 土庄町 | R5.7.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約19kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 896 | 小豆島町 | R5.7.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約45kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 897 | 小豆島町 | R5.7.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約36kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 898 | 土庄町 | R5.7.5 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約40cm | 約3kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 899 | 小豆島町 | R5.7.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約37kg | R5.7.10 | 陰性 |
| 900 | 土庄町 | R5.7.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R5.7.18 | 陰性 |
| 901 | 坂出市 | R5.7.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約60kg | R5.7.18 | 陰性 |
| 902 | 高松市 | R5.7.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約26kg | R5.7.18 | 陰性 |
| 903 | 三豊市 | R5.7.12 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | | |
| 904 | 多度津町 | R5.7.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約30kg | R5.7.18 | 陰性 |
| 905 | 多度津町 | R5.7.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約35kg | R5.7.18 | 陰性 |
| 906 | 高松市 | R5.7.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R5.7.18 | 陰性 |
| 907 | 坂出市 | R5.7.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.7.18 | 陰性 |
| 908 | 高松市 | R5.7.14 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約7kg | R5.7.18 | 陰性 |
| 909 | 高松市 | R5.7.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約13kg | R5.7.18 | 陽性⑧ |
| 910 | さぬき市 | R5.7.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約80kg | R5.7.25 | 陰性 |
| 911 | 坂出市 | R5.7.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約112cm | 約40kg | R5.7.25 | 陰性 |
| 912 | 高松市 | R5.7.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約20kg | R5.7.25 | 陰性 |
| 913 | 高松市 | R5.7.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R5.7.25 | 陰性 |
| 914 | 土庄町 | R5.7.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約34kg | R5.7.25 | 陰性 |
| 915 | 多度津町 | R5.7.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 916 | 坂出市 | R5.7.23 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約40kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 917 | 坂出市 | R5.7.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約60kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 918 | 綾川町 | R5.7.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 不明 | R5.8.2 | 陰性 |
| 919 | 綾川町 | R5.7.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約108cm | 不明 | R5.8.2 | 陰性 |
| 920 | 綾川町 | R5.7.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約117cm | 不明 | R5.8.2 | 陰性 |
| 921 | 高松市 | R5.7.22 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約53cm | 約8kg | R5.7.25 | 陰性 |
| 922 | 高松市 | R5.7.22 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約7kg | R5.7.25 | 陰性 |
| 923 | 高松市 | R5.7.22 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約5kg | R5.7.25 | 陰性 |
| 924 | 高松市 | R5.7.24 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約53cm | 約7kg | R5.7.25 | 陰性 |
| 925 | 丸亀市 | R5.7.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約80kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 926 | 高松市 | R5.7.25 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約5kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 927 | 三豊市 | R5.7.26 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約40cm | 約5kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 928 | 三豊市 | R5.7.26 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約40cm | 約5kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 929 | 綾川町 | R5.7.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約107cm | 約36kg | R5.8.2 | 陽性⑨ |
| 930 | 綾川町 | R5.7.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 不明 | R5.8.2 | 陰性 |
| 931 | 坂出市 | R5.7.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約60kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 932 | 坂出市 | R5.7.22 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約40cm | 約2kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 933 | 高松市 | R5.7.27 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約8kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 934 | 高松市 | R5.7.27 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約7kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 935 | 高松市 | R5.7.27 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約7kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 936 | 高松市 | R5.7.27 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約8kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 937 | 高松市 | R5.7.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約32kg | R5.8.2 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---------|----|----|----|--------|-------|---------|--------|
| 938 | 高松市 | R5.7.28 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約4kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 939 | 綾川町 | R5.7.29 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 約116cm | 不明 | R5.8.8 | 陰性 |
| 940 | 土庄町 | R5.8.1 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約7kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 941 | 土庄町 | R5.8.1 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約9kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 942 | 小豆島町 | R5.8.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約50kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 943 | 土庄町 | R5.8.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約33kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 944 | 小豆島町 | R5.8.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約28kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 945 | 土庄町 | R5.8.1 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約65cm | 約5kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 946 | 小豆島町 | R5.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約48kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 947 | 小豆島町 | R5.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約36kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 948 | 小豆島町 | R5.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約18kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 949 | 三木町 | R5.8.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約25kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 950 | 高松市 | R5.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 951 | 高松市 | R5.7.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R5.8.2 | 陰性 |
| 952 | 高松市 | R5.8.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 953 | 三豊市 | R5.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 954 | 土庄町 | R5.8.2 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約58cm | 約7kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 955 | 小豆島町 | R5.8.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約68cm | 約52kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 956 | 小豆島町 | R5.8.3 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約3kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 957 | 土庄町 | R5.8.3 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約7kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 958 | 高松市 | R5.8.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 959 | 高松市 | R5.8.3 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約8kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 960 | 高松市 | R5.8.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約88cm | 約21kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 961 | 多度津町 | R5.8.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約60kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 962 | 高松市 | R5.8.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 963 | 綾川町 | R5.8.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約124cm | 約70kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 964 | 小豆島町 | R5.8.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約86cm | 約28kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 965 | 土庄町 | R5.8.3 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約9kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 966 | 小豆島町 | R5.8.4 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約15kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 967 | 綾川町 | R5.8.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.8.14 | 陰性 |
| 968 | 高松市 | R5.8.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約25kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 969 | 高松市 | R5.8.4 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約8kg | R5.8.8 | 陰性 |
| 970 | 土庄町 | R5.8.7 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約10kg | R5.8.14 | 陰性 |
| 971 | 土庄町 | R5.8.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R5.8.14 | 陰性 |
| 972 | 高松市 | R5.8.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約23kg | R5.8.14 | 陰性 |
| 973 | 高松市 | R5.8.8 | 死亡 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約5kg | R5.8.14 | 陰性 |
| 974 | 三豊市 | R5.8.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約35kg | R5.8.14 | 陽性(10) |
| 975 | 土庄町 | R5.8.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約21kg | R5.8.14 | 陰性 |
| 976 | 高松市 | R5.8.9 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約55cm | 約8kg | R5.8.14 | 陰性 |
| 977 | 高松市 | R5.8.10 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約12kg | R5.8.14 | 陰性 |
| 978 | 綾川町 | R5.8.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R5.8.22 | 陰性 |
| 979 | 綾川町 | R5.8.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約122cm | 約40kg | R5.8.22 | 陰性 |
| 980 | 高松市 | R5.8.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R5.8.14 | 陰性 |
| 981 | 三木町 | R5.8.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約25kg | R5.8.14 | 陰性 |
| 982 | 高松市 | R5.8.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約50kg | R5.8.14 | 陰性 |
| 983 | 高松市 | R5.8.12 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約57cm | 約8kg | R5.8.14 | 陰性 |
| 984 | 三豊市 | R5.8.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約75kg | R5.8.22 | 陰性 |
| 985 | 土庄町 | R5.8.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約13kg | R5.8.22 | 陰性 |
| 986 | 高松市 | R5.8.16 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R5.8.22 | 陰性 |
| 987 | 綾川町 | R5.8.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約118cm | 不明 | R5.8.22 | 陰性 |
| 988 | 綾川町 | R5.8.11 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 約130cm | 不明 | R5.8.22 | 陰性 |
| 989 | 高松市 | R5.8.18 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約40cm | 約4kg | R5.8.22 | 陰性 |
| 990 | さぬき市 | R5.8.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約50kg | R5.8.22 | 陰性 |
| 991 | 高松市 | R5.8.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R5.8.22 | 陰性 |
| 992 | 三木町 | R5.8.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R5.8.22 | 陽性(11) |
| 993 | 高松市 | R5.8.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約30kg | R5.8.22 | 陰性 |
| 994 | 三豊市 | R5.8.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約61kg | R5.8.28 | 陰性 |
| 995 | 綾川町 | R5.8.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約126cm | 約41kg | R5.8.28 | 陰性 |
| 996 | 綾川町 | R5.8.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約111cm | 約27kg | R5.8.28 | 陽性(12) |
| 997 | 観音寺市 | R5.8.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約35kg | R5.8.28 | 陰性 |
| 998 | 三豊市 | R5.8.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約53kg | R5.8.28 | 陰性 |
| 999 | 綾川町 | R5.8.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約131cm | 約57kg | R5.8.28 | 陰性 |
| 1000 | 三豊市 | R5.8.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約40kg | R5.8.28 | 陰性 |
| 1001 | 三豊市 | R5.8.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R5.8.28 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|---|----|--------|-------|---------|--------|
| 1002 | 高松市 | R5.8.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R5.8.28 | 陽性(13) |
| 1003 | 高松市 | R5.8.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約50kg | R5.8.28 | 陰性 |
| 1004 | さぬき市 | R5.8.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm | 約45kg | R5.8.28 | 陰性 |
| 1005 | 三豊市 | R5.8.26 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約5kg | R5.9.5 | 陽性(14) |
| 1006 | 三豊市 | R5.8.26 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約5kg | R5.9.5 | 陽性(15) |
| 1007 | 三豊市 | R5.8.26 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約5kg | R5.9.5 | 陽性(16) |
| 1008 | 三豊市 | R5.8.26 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約5kg | R5.9.5 | 陽性(17) |
| 1009 | 高松市 | R5.8.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約25kg | R5.8.28 | 陰性 |
| 1010 | さぬき市 | R5.8.28 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約25kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1011 | 坂出市 | R5.8.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約25kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1012 | 坂出市 | R5.8.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約25kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1013 | 坂出市 | R5.8.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約25kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1014 | 綾川町 | R5.8.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約114cm | 不明 | R5.9.5 | 陰性 |
| 1015 | 綾川町 | R5.8.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 不明 | R5.9.5 | 陰性 |
| 1016 | 三豊市 | R5.8.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約40kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1017 | 三豊市 | R5.8.30 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約5kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1018 | 綾川町 | R5.8.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約128cm | 約42kg | R5.9.5 | 陽性(18) |
| 1019 | 三木町 | R5.8.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約25kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1020 | 観音寺市 | R5.8.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約70kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1021 | 土庄町 | R5.9.1 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約7kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1022 | 小豆島町 | R5.9.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約31kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1023 | 土庄町 | R5.9.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約77cm | 約10kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1024 | 土庄町 | R5.9.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約18kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1025 | 土庄町 | R5.9.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約17kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1026 | 土庄町 | R5.9.1 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約7kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1027 | 土庄町 | R5.9.1 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約8kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1028 | 土庄町 | R5.9.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約22kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1029 | 小豆島町 | R5.9.1 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約6kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1030 | 小豆島町 | R5.9.1 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約90cm | 約32kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1031 | 土庄町 | R5.9.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約98cm | 約30kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1032 | 綾川町 | R5.8.31 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約35kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1033 | 綾川町 | R5.8.31 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約98cm | 約32kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1034 | 綾川町 | R5.8.31 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約126cm | 約41kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1035 | 三豊市 | R5.9.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1036 | 三豊市 | R5.9.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1037 | 小豆島町 | R5.9.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約45kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1038 | 小豆島町 | R5.9.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約97kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1039 | 小豆島町 | R5.9.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約37kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1040 | 土庄町 | R5.9.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約23kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1041 | 土庄町 | R5.9.4 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約8kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1042 | 土庄町 | R5.9.4 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約40cm | 約10kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1043 | 小豆島町 | R5.9.4 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約56cm | 約6kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1044 | さぬき市 | R5.9.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1045 | 高松市 | R5.9.2 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約8kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1046 | 綾川町 | R5.9.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1047 | 綾川町 | R5.9.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約112cm | 約40kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1048 | 三木町 | R5.9.1 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約3kg | R5.9.5 | 陽性(19) |
| 1049 | 三木町 | R5.9.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約35kg | R5.9.5 | 陽性(20) |
| 1050 | 高松市 | R5.9.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約9kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1051 | 高松市 | R5.9.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約13kg | R5.9.5 | 陰性 |
| 1052 | 三豊市 | R5.9.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約20kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1053 | 高松市 | R5.9.4 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約13kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1054 | 綾川町 | R5.9.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1055 | 高松市 | R5.9.7 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約4kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1056 | 高松市 | R5.9.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約34kg | R5.9.19 | 陰性 |
| 1057 | 東かがわ市 | R5.9.8 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約8kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1058 | 東かがわ市 | R5.9.8 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約7kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1059 | 土庄町 | R5.9.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約32kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1060 | 小豆島町 | R5.9.5 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約5kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1061 | 土庄町 | R5.9.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約21kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1062 | さぬき市 | R5.9.8 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1063 | さぬき市 | R5.9.11 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R5.9.11 | 陰性 |
| 1064 | 綾川町 | R5.9.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約134cm | 約45kg | R5.9.19 | 陰性 |
| 1065 | 綾川町 | R5.9.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約125cm | 約41kg | R5.9.19 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 1066 | 綾川町 | R5.9.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約38kg | R5.9.19 | 陰性 |
| 1067 | 綾川町 | R5.9.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約114cm | 約34kg | R5.9.19 | 陰性 |
| 1068 | さめき市 | R5.9.12 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約7kg | R5.9.19 | 陰性 |
| 1069 | 三木町 | R5.9.11 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約5kg | R5.9.19 | 陽性(21) |
| 1070 | 高松市 | R5.9.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約43kg | R5.9.19 | 陰性 |
| 1071 | 三豊市 | R5.9.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約118cm | 約75kg | R5.9.19 | 陰性 |
| 1072 | 高松市 | R5.9.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約47kg | R5.9.19 | 陰性 |
| 1073 | 綾川町 | R5.9.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R5.9.19 | 陰性 |
| 1074 | 綾川町 | R5.9.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約108cm | 約33kg | R5.9.19 | 陰性 |
| 1075 | 高松市 | R5.9.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R5.9.19 | 陰性 |
| 1076 | 三木町 | R5.9.19 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約35kg | | |
| 1077 | 綾川町 | R5.9.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約133cm | 約52kg | R5.9.25 | 陰性 |
| 1078 | 東かがわ市 | R5.9.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約21kg | R5.9.25 | 陰性 |
| 1079 | 東かがわ市 | R5.9.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約23kg | R5.9.25 | 陰性 |
| 1080 | 高松市 | R5.9.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約23kg | R5.9.25 | 陰性 |
| 1081 | 綾川町 | R5.9.15 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約5kg | R5.9.25 | 陰性 |
| 1082 | 綾川町 | R5.9.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約119cm | 約45kg | R5.9.25 | 陰性 |
| 1083 | 綾川町 | R5.9.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約35kg | R5.9.25 | 陰性 |
| 1084 | 綾川町 | R5.9.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約140cm | 約50kg | R5.9.25 | 陰性 |
| 1085 | 綾川町 | R5.9.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約76cm | 約15kg | R5.9.25 | 陰性 |
| 1086 | 高松市 | R5.9.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約15kg | R5.9.25 | 陰性 |
| 1087 | 綾川町 | R5.9.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約123cm | 約40kg | R5.9.25 | 陰性 |
| 1088 | 綾川町 | R5.9.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約113cm | 約34kg | R5.9.25 | 陰性 |
| 1089 | 綾川町 | R5.9.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約47kg | R5.10.3 | 陰性 |
| 1090 | 多度津町 | R5.9.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約70kg | R5.10.3 | 陰性 |
| 1091 | 坂出市 | R5.9.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R5.10.3 | 陰性 |
| 1092 | 高松市 | R5.9.27 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約11kg | R5.10.3 | 陰性 |
| 1093 | 三豊市 | R5.9.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約30cm | 約5kg | R5.10.3 | 陰性 |
| 1094 | 高松市 | R5.9.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R5.10.3 | 陰性 |
| 1095 | 高松市 | R5.9.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約35kg | R5.10.3 | 陰性 |
| 1096 | 高松市 | R5.10.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約8kg | R5.10.3 | 陽性(22) |
| 1097 | 高松市 | R5.10.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約12kg | R5.10.3 | 陽性(23) |
| 1098 | 小豆島町 | R5.10.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約30kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1099 | 小豆島町 | R5.10.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約61kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1100 | 小豆島町 | R5.10.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約45kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1101 | 小豆島町 | R5.10.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約41kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1102 | 土庄町 | R5.10.1 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1103 | 土庄町 | R5.10.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約48kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1104 | 土庄町 | R5.10.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約21kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1105 | 小豆島町 | R5.10.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm | 約25kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1106 | 小豆島町 | R5.10.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約28kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1107 | 小豆島町 | R5.10.2 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約40cm | 約11kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1108 | 小豆島町 | R5.10.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約38kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1109 | 小豆島町 | R5.10.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約100kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1110 | 土庄町 | R5.10.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約28kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1111 | 小豆島町 | R5.10.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約51kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1112 | 土庄町 | R5.10.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1113 | 土庄町 | R5.10.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約29kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1114 | 小豆島町 | R5.10.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約37kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1115 | 小豆島町 | R5.10.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約70kg | R5.10.10 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|----|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 1116 | 多度津町 | R5.9.30 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1117 | 高松市 | R5.10.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約11kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1118 | 三豊市 | R5.10.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約60kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1119 | 高松市 | R5.10.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約45kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1120 | 小豆島町 | R5.10.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約15kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1121 | 綾川町 | R5.10.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約125cm | 約62kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1122 | 土庄町 | R5.10.5 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約5kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1123 | 綾川町 | R5.10.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約107cm | 約34kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1124 | 高松市 | R5.10.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約12kg | R5.10.10 | 陰性 |
| 1125 | 綾川町 | R5.10.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約30kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1126 | 綾川町 | R5.10.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約128cm | 約40kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1127 | 綾川町 | R5.10.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約83cm | 約10kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1128 | 綾川町 | R5.10.8 | 捕獲 | 雌 | 妖獣 | 約54cm | 約8kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1129 | 綾川町 | R5.10.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約98cm | 約10kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1130 | 綾川町 | R5.10.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約108cm | 約33kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1131 | 高松市 | R5.10.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1132 | 高松市 | R5.10.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約39kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1133 | 高松市 | R5.10.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約31kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1134 | 坂出市 | R5.10.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1135 | 高松市 | R5.10.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約41kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1136 | 綾川町 | R5.10.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約107cm | 約30kg | R5.10.24 | 陰性 |
| 1137 | 高松市 | R5.10.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1138 | さぬき市 | R5.10.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約50kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1139 | さぬき市 | R5.10.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約50kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1140 | 高松市 | R5.10.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約11kg | R5.10.17 | 陽性(24) |
| 1141 | 高松市 | R5.10.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約34kg | R5.10.17 | 陽性(25) |
| 1142 | 三豊市 | R5.10.13 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約50cm | 約5kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1143 | 高松市 | R5.10.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約16kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1144 | 小豆島町 | R5.10.16 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約55cm | 約25kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1145 | 高松市 | R5.10.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1146 | 高松市 | R5.10.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1147 | 高松市 | R5.10.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1148 | 高松市 | R5.10.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1149 | さぬき市 | R5.10.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約107cm | 約55kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1150 | 高松市 | R5.10.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約23kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1151 | 高松市 | R5.10.16 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約54kg | R5.10.17 | 陰性 |
| 1152 | 高松市 | R5.10.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約11kg | R5.10.24 | 陰性 |
| 1153 | 東かがわ市 | R5.10.17 | 死亡 | 不明 | 成獣 | 約80cm | 不明 | | |
| 1154 | 高松市 | R5.10.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約103cm | 約37kg | R5.10.24 | 陰性 |
| 1155 | 三豊市 | R5.10.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.10.24 | 陰性 |
| 1156 | 高松市 | R5.10.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R5.10.24 | 陰性 |
| 1157 | 高松市 | R5.10.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約82cm | 約22kg | R5.10.24 | 陰性 |
| 1158 | さぬき市 | R5.10.16 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約40kg | R5.10.24 | 陰性 |
| 1159 | 観音寺市 | R5.10.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1160 | 観音寺市 | R5.10.20 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約45cm | 約8kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1161 | さぬき市 | R5.10.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約121cm | 約75kg | R5.10.24 | 陰性 |
| 1162 | 三木町 | R5.10.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約63kg | R5.10.24 | 陰性 |
| 1163 | 丸亀市 | R5.10.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約45kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1164 | 高松市 | R5.10.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1165 | 高松市 | R5.10.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1166 | 高松市 | R5.10.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約103kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1167 | さぬき市 | R5.10.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約65kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1168 | 高松市 | R5.10.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約20kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1169 | 三豊市 | R5.10.25 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約80cm | 約12kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1170 | 三豊市 | R5.10.25 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約75cm | 約10kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1171 | 三豊市 | R5.10.25 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約80cm | 約12kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1172 | 高松市 | R5.10.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約16kg | R5.10.30 | 陽性(26) |
| 1173 | 高松市 | R5.10.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約51kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1174 | 多度津町 | R5.10.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約130cm | 約45kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1175 | 善通寺市 | R5.10.27 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約12kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1176 | 高松市 | R5.10.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約54kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1177 | 高松市 | R5.10.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約24kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1178 | さぬき市 | R5.10.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約102cm | 約50kg | R5.10.30 | 陰性 |
| 1179 | 高松市 | R5.10.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約11kg | R5.11.8 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|----|---|----|--------|--------|----------|--------|
| 1180 | 高松市 | R5.10.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約103cm | 約35kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1181 | 三木町 | R5.10.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R5.11.8 | 陽性(27) |
| 1182 | 高松市 | R5.10.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約40kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1183 | 多度津町 | R5.10.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1184 | 多度津町 | R5.10.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約40cm | 約10kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1185 | 多度津町 | R5.10.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1186 | 善通寺市 | R5.10.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1187 | 善通寺市 | R5.10.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約30cm | 約10kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1188 | 観音寺市 | R5.10.30 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約15kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1189 | さぬき市 | R5.10.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約60kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1190 | 高松市 | R5.10.31 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約30kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1191 | 綾川町 | R5.11.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約126cm | 約60kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1192 | 高松市 | R5.11.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1193 | 高松市 | R5.10.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約72cm | 約15kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1194 | 高松市 | R5.10.31 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約17kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1195 | 高松市 | R5.10.31 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約17kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1196 | 高松市 | R5.10.31 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1197 | 高松市 | R5.11.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1198 | 観音寺市 | R5.11.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1199 | 観音寺市 | R5.11.2 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約40cm | 約3kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1200 | 坂出市 | R5.11.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約16kg | R5.11.8 | 陽性(28) |
| 1201 | 坂出市 | R5.11.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約16kg | R5.11.8 | 陽性(29) |
| 1202 | 坂出市 | R5.11.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約16kg | R5.11.8 | 陽性(30) |
| 1203 | 善通寺市 | R5.11.2 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約45cm | 約15kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1204 | 高松市 | R5.10.31 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1205 | さぬき市 | R5.11.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約90kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1206 | 土庄町 | R5.11.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約13kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1207 | 小豆島町 | R5.10.31 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約48kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1208 | 土庄町 | R5.11.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約21kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1209 | 小豆島町 | R5.11.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約22kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1210 | 土庄町 | R5.11.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約52kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1211 | 土庄町 | R5.11.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約38kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1212 | 小豆島町 | R5.11.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約37kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1213 | 土庄町 | R5.11.1 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約17kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1214 | 土庄町 | R5.11.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約47kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1215 | 小豆島町 | R5.11.1 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約80cm | 約15kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1216 | 土庄町 | R5.11.1 | 捕獲 | 雌 | 不明 | 約90cm | 約25kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1217 | 小豆島町 | R5.11.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約30kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1218 | 小豆島町 | R5.11.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約56kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1219 | 小豆島町 | R5.11.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約91cm | 約38kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1220 | 小豆島町 | R5.11.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約35kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1221 | 小豆島町 | R5.11.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約33kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1222 | 小豆島町 | R5.11.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約17kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1223 | 多度津町 | R5.11.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R5.11.13 | 陰性 |
| 1224 | 多度津町 | R5.11.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約135cm | 約115kg | R5.11.13 | 陰性 |
| 1225 | 高松市 | R5.11.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約12kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1226 | 東かがわ市 | R5.9.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1227 | 東かがわ市 | R5.9.23 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 不明 | 約10kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1228 | 東かがわ市 | R5.9.23 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約20kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1229 | 東かがわ市 | R5.10.8 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 不明 | 約5kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1230 | 東かがわ市 | R5.10.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約30kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1231 | 東かがわ市 | R5.10.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1232 | 東かがわ市 | R5.10.31 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1233 | 東かがわ市 | R5.11.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1234 | 高松市 | R5.11.3 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約80cm | 約14kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1235 | 高松市 | R5.11.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約51kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1236 | 綾川町 | R5.11.6 | 死亡 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約8kg | R5.11.8 | 陽性(31) |
| 1237 | 高松市 | R5.11.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約95kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1238 | 高松市 | R5.11.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約40kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1239 | さぬき市 | R5.11.6 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約100cm | 約50kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1240 | さぬき市 | R5.11.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約15kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1241 | 高松市 | R5.10.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約65kg | R5.11.8 | 陰性 |
| 1242 | 小豆島町 | R5.11.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約65kg | R5.11.13 | 陰性 |
| 1243 | 丸亀市 | R5.11.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R5.11.13 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|----|----|----|--------|-------|----------|--------|
| 1244 | 多度津町 | R5.11.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約60kg | R5.11.13 | 陰性 |
| 1245 | 高松市 | R5.11.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約21kg | R5.11.13 | 陰性 |
| 1246 | さぬき市 | R5.11.11 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約20kg | R5.11.13 | 陰性 |
| 1247 | 高松市 | R5.11.11 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約13kg | R5.11.13 | 陰性 |
| 1248 | 多度津町 | R5.11.12 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約68cm | 約14kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1249 | 土庄町 | R5.11.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約24kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1250 | 善通寺市 | R5.11.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約40kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1251 | 善通寺市 | R5.11.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約125cm | 約50kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1252 | さぬき市 | R5.11.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約15kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1253 | 高松市 | R5.11.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約35kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1254 | 高松市 | R5.11.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約42kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1255 | 土庄町 | R5.11.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約9kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1256 | 高松市 | R5.11.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約20kg | R5.11.21 | 陽性(32) |
| 1257 | 多度津町 | R5.11.16 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約65cm | 約14kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1258 | さぬき市 | R5.11.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約20kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1259 | 多度津町 | R5.11.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約25kg | R5.11.28 | 陰性 |
| 1260 | 多度津町 | R5.11.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約35kg | R5.11.28 | 陰性 |
| 1261 | 三木町 | R5.11.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約30kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1262 | 高松市 | R5.11.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約25kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1263 | 高松市 | R5.11.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約125cm | 約80kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1264 | 高松市 | R5.11.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約73kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1265 | 高松市 | R5.11.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R5.11.21 | 陰性 |
| 1266 | 三豊市 | R5.11.20 | 死亡 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約10kg | R5.11.21 | 陽性(33) |
| 1267 | 善通寺市 | R5.11.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R5.11.28 | 陰性 |
| 1268 | 三豊市 | R5.11.21 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約50cm | 約5kg | R5.11.28 | 陽性(34) |
| 1269 | 高松市 | R5.11.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約20kg | R5.11.28 | 陰性 |
| 1270 | 高松市 | R5.11.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約170cm | 約60kg | R5.11.28 | 陰性 |
| 1271 | さぬき市 | R5.11.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R5.11.28 | 陰性 |
| 1272 | 多度津町 | R5.11.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約140cm | 約50kg | R5.11.28 | 陰性 |
| 1273 | さぬき市 | R5.11.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R5.11.28 | 陰性 |
| 1274 | 東かがわ市 | R5.11.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約45kg | R5.11.28 | 陰性 |
| 1275 | まんのう町 | R5.11.22 | 死亡 | 雄 | 幼獣 | 約30cm | 約3kg | R5.11.28 | 陽性(35) |
| 1276 | まんのう町 | R5.11.22 | 死亡 | 雄 | 幼獣 | 約30cm | 約3kg | R5.11.28 | 陽性(36) |
| 1277 | まんのう町 | R5.11.22 | 死亡 | 雄 | 幼獣 | 約30cm | 約3kg | R5.11.28 | 陽性(37) |
| 1278 | まんのう町 | R5.11.22 | 死亡 | 雄 | 幼獣 | 約30cm | 約3kg | R5.11.28 | 陽性(38) |
| 1279 | まんのう町 | R5.11.22 | 死亡 | 雄 | 幼獣 | 約30cm | 約3kg | R5.11.28 | 陽性(39) |
| 1280 | まんのう町 | R5.11.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約60kg | R5.11.28 | 陰性 |
| 1281 | 善通寺市 | R5.11.26 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約25kg | R5.11.28 | 陽性(40) |
| 1282 | 丸亀市 | R5.11.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R5.12.5 | 陰性 |
| 1283 | さぬき市 | R5.11.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R5.11.28 | 陰性 |
| 1284 | まんのう町 | R5.11.25 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約10kg | R5.12.5 | 陽性(41) |
| 1285 | 高松市 | R5.11.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約25kg | R5.12.5 | 陰性 |
| 1286 | 高松市 | R5.11.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約24kg | R5.12.5 | 陰性 |
| 1287 | 東かがわ市 | R5.11.30 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R5.12.5 | 陰性 |
| 1288 | 丸亀市 | R5.11.30 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約45kg | R5.12.5 | 陽性(42) |
| 1289 | 三木町 | R5.12.1 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約15kg | R5.12.5 | 陽性(43) |
| 1290 | 多度津町 | R5.12.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約160cm | 約60kg | R5.12.12 | 陰性 |
| 1291 | 多度津町 | R5.12.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R5.12.12 | 陰性 |
| 1292 | 高松市 | R5.11.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約24kg | R5.12.5 | 陰性 |
| 1293 | 三豊市 | R5.12.8 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R5.12.12 | 陽性(44) |
| 1294 | 東かがわ市 | R5.12.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約60kg | R5.12.12 | 陰性 |
| 1295 | 高松市 | R5.12.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R5.12.19 | 陰性 |
| 1296 | 高松市 | R5.12.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約68kg | R5.12.19 | 陰性 |
| 1297 | 観音寺市 | R5.12.19 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R5.12.25 | 陰性 |
| 1298 | 坂出市 | R5.12.19 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R5.12.25 | 陰性 |
| 1299 | 高松市 | R5.12.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約60kg | R5.12.25 | 陰性 |
| 1300 | 丸亀市 | R5.12.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約150cm | 約90kg | R5.12.25 | 陰性 |
| 1301 | 小豆島町 | R5.12.26 | 死亡 | 雌 | 幼獣 | 約110cm | 約40kg | R6.1.10 | 陰性 |
| 1302 | 高松市 | R5.12.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約90kg | R6.1.10 | 陰性 |
| 1303 | さぬき市 | R5.12.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R6.1.10 | 陰性 |
| 1304 | さぬき市 | R6.1.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約25kg | R6.1.10 | 陰性 |
| 1305 | 三豊市 | R6.1.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R6.1.22 | 陰性 |
| 1306 | 高松市 | R6.1.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約23kg | R6.1.10 | 陰性 |
| 1307 | 三豊市 | R6.1.10 | 死亡 | 不明 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R6.1.15 | 陽性(45) |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---------|----|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 1308 | 高松市 | R6.1.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R6.1.15 | 陽性(46) |
| 1309 | さぬき市 | R6.1.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R6.1.15 | 陰性 |
| 1310 | さぬき市 | R6.1.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R6.1.15 | 陰性 |
| 1311 | 善通寺市 | R6.1.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R6.1.22 | 陰性 |
| 1312 | 高松市 | R6.1.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R6.1.15 | 陰性 |
| 1313 | 三豊市 | R6.1.15 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R6.1.22 | 陰性 |
| 1314 | 丸亀市 | R6.1.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約170cm | 約100kg | R6.1.22 | 陰性 |
| 1315 | 善通寺市 | R6.1.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R6.1.22 | 陰性 |
| 1316 | 高松市 | R6.1.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約103cm | 約35kg | R6.1.22 | 陰性 |
| 1317 | 高松市 | R6.1.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約106cm | 約35kg | R6.1.22 | 陰性 |
| 1318 | 高松市 | R6.1.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R6.1.22 | 陰性 |
| 1319 | 三木町 | R6.1.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約60kg | R6.1.22 | 陰性 |
| 1320 | 三豊市 | R6.1.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R6.1.30 | 陰性 |
| 1321 | 三木町 | R6.1.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R6.1.30 | 陰性 |
| 1322 | 多度津町 | R6.1.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R6.1.30 | 陰性 |
| 1323 | 多度津町 | R6.1.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R6.1.30 | 陰性 |
| 1324 | 丸亀市 | R6.1.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約40kg | R6.2.6 | 陰性 |
| 1325 | 丸亀市 | R6.1.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R6.2.6 | 陰性 |
| 1326 | 丸亀市 | R6.1.25 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約10kg | R6.2.6 | 陰性 |
| 1327 | 三豊市 | R6.1.29 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約7kg | R6.1.30 | 陽性(47) |
| 1328 | 高松市 | R6.1.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約18kg | R6.1.30 | 陽性(48) |
| 1329 | 丸亀市 | R6.1.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R6.2.6 | 陰性 |
| 1330 | 丸亀市 | R6.1.29 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R6.2.6 | 陰性 |
| 1331 | 高松市 | R6.1.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R6.2.6 | 陰性 |
| 1332 | さぬき市 | R6.2.13 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R6.2.19 | 陽性(49) |
| 1333 | 三豊市 | R6.2.29 | 死亡 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約3kg | R6.3.6 | 陰性 |
| 1334 | 三豊市 | R6.2.29 | 死亡 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約3kg | R6.3.6 | 陰性 |
| 1335 | 三豊市 | R6.2.29 | 死亡 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約3kg | R6.3.6 | 陰性 |
| 1336 | 三豊市 | R6.2.29 | 死亡 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約3kg | R6.3.6 | 陰性 |
| 1337 | 三豊市 | R6.3.14 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R6.3.15 | 陽性(50) |
| 1338 | さぬき市 | R6.3.21 | 死亡 | 不明 | 成獣 | 約40cm | 不明 | | |
| 1339 | 高松市 | R6.6.3 | 死亡 | 不明 | 幼獣 | 約60cm | 約3kg | R6.6.4 | 陰性 |
| 1340 | 高松市 | R6.6.3 | 死亡 | 不明 | 幼獣 | 約40cm | 約2kg | | |
| 1341 | 三豊市 | R6.6.20 | 死亡 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約3kg | R6.6.25 | 陰性 |
| 1342 | 高松市 | R6.7.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約50kg | R6.7.2 | 陰性 |
| 1343 | 綾川町 | R6.7.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約40kg | R6.7.16 | 陰性 |
| 1344 | 三木町 | R6.7.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R6.7.16 | 陰性 |
| 1345 | 善通寺市 | R6.7.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約112cm | 約56kg | R6.7.23 | 陰性 |
| 1346 | 坂出市 | R6.7.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約20kg | R6.7.23 | 陰性 |
| 1347 | 三豊市 | R6.7.16 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約30kg | R6.7.23 | 陰性 |
| 1348 | 高松市 | R6.7.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R6.7.23 | 陰性 |
| 1349 | 多度津町 | R6.7.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約40kg | R6.7.30 | 陰性 |
| 1350 | 小豆島町 | R6.7.22 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R6.7.23 | 陽性(51) |
| 1351 | 高松市 | R6.7.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約50kg | R6.8.6 | 陰性 |
| 1352 | 高松市 | R6.7.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約16kg | R6.8.6 | 陰性 |
| 1353 | 多度津町 | R6.8.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約55cm | 約15kg | R6.8.20 | 陰性 |
| 1354 | 多度津町 | R6.8.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約55cm | 約15kg | R6.8.20 | 陰性 |
| 1355 | 多度津町 | R6.8.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約25kg | R6.8.20 | 陰性 |
| 1356 | 坂出市 | R6.8.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約40kg | R6.8.27 | 陰性 |
| 1357 | 善通寺市 | R6.8.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約20kg | R6.8.27 | 陰性 |
| 1358 | 三豊市 | R6.8.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約80kg | R6.8.27 | 陰性 |
| 1359 | 土庄町 | R6.8.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約20kg | R6.8.20 | 陰性 |
| 1360 | 善通寺市 | R6.8.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約35kg | R6.8.27 | 陰性 |
| 1361 | 高松市 | R6.8.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R6.8.20 | 陰性 |
| 1362 | さぬき市 | R6.8.16 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約40cm | 約17kg | R6.8.20 | 陰性 |
| 1363 | 高松市 | R6.8.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約81cm | 約20kg | R6.8.20 | 陰性 |
| 1364 | 高松市 | R6.8.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約84cm | 約20kg | R6.8.20 | 陰性 |
| 1365 | 高松市 | R6.8.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約76cm | 約17kg | R6.8.20 | 陰性 |
| 1366 | 高松市 | R6.8.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約76cm | 約17kg | R6.8.20 | 陰性 |
| 1367 | 高松市 | R6.8.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約20kg | R6.8.20 | 陰性 |
| 1368 | 高松市 | R6.8.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約20kg | R6.8.20 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|---|----|--------|-------|---------|----|
| 1369 | 三豊市 | R6.8.20 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約5kg | R6.8.27 | 陰性 |
| 1370 | 高松市 | R6.8.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約25kg | R6.8.20 | 陰性 |
| 1371 | 三豊市 | R6.8.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約25kg | R6.8.27 | 陰性 |
| 1372 | 三豊市 | R6.8.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約25kg | R6.8.27 | 陰性 |
| 1373 | 三豊市 | R6.8.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約25kg | R6.8.27 | 陰性 |
| 1374 | 高松市 | R6.8.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R6.8.27 | 陰性 |
| 1375 | 丸亀市 | R6.8.19 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約80cm | 約20kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1376 | 丸亀市 | R6.8.22 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約6kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1377 | 高松市 | R6.8.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約8kg | R6.8.27 | 陰性 |
| 1378 | 高松市 | R6.8.23 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約80kg | R6.8.27 | 陰性 |
| 1379 | 高松市 | R6.8.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R6.8.27 | 陰性 |
| 1380 | 高松市 | R6.8.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約74cm | 約15kg | R6.8.27 | 陰性 |
| 1381 | 土庄町 | R6.8.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約32kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1382 | 小豆島町 | R6.8.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1383 | 小豆島町 | R6.8.25 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約10kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1384 | 土庄町 | R6.8.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約11kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1385 | 小豆島町 | R6.8.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約32kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1386 | 小豆島町 | R6.8.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約43kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1387 | 土庄町 | R6.8.26 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約73cm | 約5kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1388 | 小豆島町 | R6.8.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約41kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1389 | 小豆島町 | R6.8.27 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約6kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1390 | 土庄町 | R6.8.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約12kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1391 | 小豆島町 | R6.8.27 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約45cm | 約4kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1392 | 高松市 | R6.8.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1393 | 高松市 | R6.8.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約87cm | 約20kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1394 | 小豆島町 | R6.9.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1395 | 土庄町 | R6.9.1 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約8kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1396 | 小豆島町 | R6.9.1 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約40cm | 約6kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1397 | 小豆島町 | R6.9.2 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約3kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1398 | 小豆島町 | R6.9.2 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約53cm | 約5kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1399 | 土庄町 | R6.9.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約28kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1400 | 小豆島町 | R6.9.2 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約55cm | 約5kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1401 | 小豆島町 | R6.9.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1402 | 土庄町 | R6.9.2 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約7kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1403 | 小豆島町 | R6.9.2 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約45cm | 約2kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1404 | 善通寺市 | R6.9.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約30kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1405 | 小豆島町 | R6.9.2 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約5kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1406 | 高松市 | R6.8.31 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約132cm | 約80kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1407 | 高松市 | R6.9.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R6.9.3 | 陰性 |
| 1408 | 小豆島町 | R6.9.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約28kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1409 | 坂出市 | R6.8.31 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1410 | 高松市 | R6.9.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1411 | 高松市 | R6.9.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1412 | 高松市 | R6.9.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約25kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1413 | さぬき市 | R6.9.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約15kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1414 | 高松市 | R6.9.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1415 | さぬき市 | R6.9.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1416 | 高松市 | R6.9.6 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約65cm | 約10kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1417 | 高松市 | R6.9.6 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約86cm | 約20kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1418 | 土庄町 | R6.9.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約42kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1419 | 土庄町 | R6.9.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約29kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1420 | 高松市 | R6.9.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約76cm | 約15kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1421 | 高松市 | R6.9.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約135cm | 約80kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1422 | 高松市 | R6.9.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約89cm | 約20kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1423 | 高松市 | R6.9.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R6.9.10 | 陰性 |
| 1424 | 善通寺市 | R6.9.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1425 | まんのう町 | R6.9.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1426 | 多度津町 | R6.9.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約40kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1427 | 高松市 | R6.9.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約78cm | 約15kg | R6.9.17 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|---|----|--------|-------|----------|----|
| 1428 | 善通寺市 | R6.9.10 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約15kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1429 | まんのう町 | R6.9.10 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約74cm | 約10kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1430 | 高松市 | R6.9.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約60kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1431 | 高松市 | R6.9.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1432 | さぬき市 | R6.9.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1433 | 綾川町 | R6.9.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約92cm | 約12kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1434 | 高松市 | R6.9.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1435 | 高松市 | R6.9.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1436 | 三木町 | R6.9.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1437 | 高松市 | R6.9.11 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約5kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1438 | 高松市 | R6.9.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約35kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1439 | 土庄町 | R6.9.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約7kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1440 | 土庄町 | R6.9.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約78cm | 約16kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1441 | 丸亀市 | R6.9.16 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約80cm | 約30kg | R6.9.25 | 陰性 |
| 1442 | 丸亀市 | R6.9.16 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約80cm | 約30kg | R6.9.25 | 陰性 |
| 1443 | 高松市 | R6.9.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1444 | 高松市 | R6.9.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R6.9.17 | 陰性 |
| 1445 | 高松市 | R6.9.14 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約15kg | R6.9.25 | 陰性 |
| 1446 | 高松市 | R6.9.14 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約65cm | 約20kg | R6.9.25 | 陰性 |
| 1447 | 東かがわ市 | R6.9.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R6.9.25 | 陰性 |
| 1448 | 観音寺市 | R6.9.19 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約5kg | R6.9.25 | 陰性 |
| 1449 | 観音寺市 | R6.9.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約35kg | R6.9.25 | 陰性 |
| 1450 | 善通寺市 | R6.9.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R6.9.25 | 陰性 |
| 1451 | 綾川町 | R6.9.20 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約78cm | 約13kg | R6.10.1 | 陰性 |
| 1452 | 綾川町 | R6.9.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約111cm | 約40kg | R6.10.1 | 陰性 |
| 1453 | 高松市 | R6.9.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R6.9.25 | 陰性 |
| 1454 | 善通寺市 | R6.9.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R6.10.1 | 陰性 |
| 1455 | さぬき市 | R6.9.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R6.10.1 | 陰性 |
| 1456 | さぬき市 | R6.9.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R6.10.1 | 陰性 |
| 1457 | 綾川町 | R6.9.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約123cm | 約55kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1458 | 綾川町 | R6.9.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約121cm | 約57kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1459 | 観音寺市 | R6.9.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1460 | 綾川町 | R6.9.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約121cm | 約55kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1461 | 小豆島町 | R6.10.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約42kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1462 | 土庄町 | R6.10.1 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約6kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1463 | 土庄町 | R6.10.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約45kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1464 | 土庄町 | R6.10.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約36kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1465 | 土庄町 | R6.10.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約9kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1466 | 小豆島町 | R6.10.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約48kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1467 | 小豆島町 | R6.10.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約34kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1468 | 小豆島町 | R6.10.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約45kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1469 | 小豆島町 | R6.10.1 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約6kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1470 | 小豆島町 | R6.10.1 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約12kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1471 | 土庄町 | R6.10.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約8kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1472 | 小豆島町 | R6.10.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約66kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1473 | 高松市 | R6.10.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1474 | 高松市 | R6.10.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1475 | 高松市 | R6.10.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1476 | 丸亀市 | R6.10.6 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約30cm | 約2kg | R6.10.11 | 陰性 |
| 1477 | 丸亀市 | R6.10.6 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約40cm | 約5kg | R6.10.11 | 陰性 |
| 1478 | 高松市 | R6.10.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1479 | 高松市 | R6.10.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1480 | 高松市 | R6.10.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1481 | 高松市 | R6.10.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1482 | 高松市 | R6.10.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約35kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1483 | 高松市 | R6.10.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R6.10.8 | 陰性 |
| 1484 | 綾川町 | R6.10.5 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約80cm | 約18kg | R6.10.11 | 陰性 |
| 1485 | 綾川町 | R6.10.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約117cm | 約60kg | R6.10.11 | 陰性 |
| 1486 | 綾川町 | R6.10.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約50kg | R6.10.11 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|----|----|----|--------|-------|----------|------|
| 1487 | 綾川町 | R6.10.8 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約75cm | 約18kg | R6.10.11 | 陰性 |
| 1488 | 高松市 | R6.10.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R6.10.11 | 陰性 |
| 1489 | 綾川町 | R6.10.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約119cm | 約50kg | R6.10.11 | 陰性 |
| 1490 | 高松市 | R6.10.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約40kg | R6.10.11 | 陰性 |
| 1491 | 高松市 | R6.10.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R6.10.11 | 陰性 |
| 1492 | 高松市 | R6.10.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約87cm | 約20kg | R6.10.11 | 陰性 |
| 1493 | 観音寺市 | R6.10.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1494 | 観音寺市 | R6.10.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約60kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1495 | さぬき市 | R6.10.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R6.10.11 | 陰性 |
| 1496 | 高松市 | R6.10.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約35kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1497 | 高松市 | R6.10.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1498 | 坂出市 | R6.10.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約50kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1499 | 坂出市 | R6.10.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約50kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1500 | 丸亀市 | R6.10.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約45kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1501 | 丸亀市 | R6.10.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1502 | 高松市 | R6.10.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1503 | 高松市 | R6.10.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約35kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1504 | 高松市 | R6.10.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約76cm | 約15kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1505 | 高松市 | R6.10.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約86cm | 約25kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1506 | 高松市 | R6.10.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1507 | 高松市 | R6.10.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1508 | 高松市 | R6.10.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1509 | 高松市 | R6.10.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1510 | 高松市 | R6.10.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約40kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1511 | 高松市 | R6.10.13 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約23kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1512 | 三豊市 | R6.10.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1513 | 小豆島町 | R6.10.16 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約80kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1514 | 綾川町 | R6.10.16 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約112cm | 約55kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1515 | 三豊市 | R6.10.16 | 死亡 | 不明 | 幼獣 | 約35cm | 約1kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1516 | 多度津町 | R6.10.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約45kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1517 | 綾川町 | R6.10.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約127cm | 約55kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1518 | 小豆島町 | R6.10.18 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約60kg | R6.10.22 | 陽性52 |
| 1519 | 多度津町 | R6.10.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1520 | 綾川町 | R6.10.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約127cm | 約60kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1521 | 善通寺市 | R6.10.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約32kg | R6.10.29 | 陰性 |
| 1522 | 高松市 | R6.10.18 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約8kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1523 | 高松市 | R6.10.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約101cm | 約30kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1524 | さぬき市 | R6.10.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約50kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1525 | さぬき市 | R6.10.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1526 | さぬき市 | R6.10.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1527 | 高松市 | R6.10.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約76cm | 約20kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1528 | 高松市 | R6.10.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約79cm | 約20kg | R6.10.22 | 陰性 |
| 1529 | 善通寺市 | R6.10.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R6.10.29 | 陰性 |
| 1530 | 綾川町 | R6.10.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約114cm | 約48kg | R6.10.29 | 陰性 |
| 1531 | まんのう町 | R6.10.20 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約5kg | R6.10.29 | 陰性 |
| 1532 | 丸亀市 | R6.10.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R6.10.29 | 陰性 |
| 1533 | 丸亀市 | R6.10.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R6.10.29 | 陰性 |
| 1534 | 多度津町 | R6.10.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約150cm | 約70kg | R6.10.29 | 陰性 |
| 1535 | 善通寺市 | R6.10.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R6.10.29 | 陰性 |
| 1536 | さぬき市 | R6.10.21 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約8kg | R6.10.29 | 陰性 |
| 1537 | 高松市 | R6.10.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約20kg | R6.10.29 | 陰性 |
| 1538 | 高松市 | R6.10.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R6.10.29 | 陰性 |
| 1539 | 坂出市 | R6.10.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約15kg | R6.11.5 | 陰性 |
| 1540 | まんのう町 | R6.10.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約80kg | R6.11.5 | 陰性 |
| 1541 | 東かがわ市 | R6.10.28 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約80kg | | |
| 1542 | さぬき市 | R6.10.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約60kg | R6.10.29 | 陰性 |
| 1543 | 観音寺市 | R6.10.29 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約60kg | | |
| 1544 | 東かがわ市 | R6.10.29 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約50kg | | |
| 1545 | まんのう町 | R6.10.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約70kg | R6.11.5 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|----|---|----|--------|-------|----------|----|
| 1546 | 小豆島町 | R6.11.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約18kg | R6.11.5 | 陰性 |
| 1547 | 土庄町 | R6.11.1 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約67cm | 約10kg | R6.11.5 | 陰性 |
| 1548 | 小豆島町 | R6.11.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約60kg | R6.11.5 | 陰性 |
| 1549 | 小豆島町 | R6.10.31 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約40kg | R6.11.5 | 陰性 |
| 1550 | 土庄町 | R6.11.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約14kg | R6.11.5 | 陰性 |
| 1551 | 小豆島町 | R6.11.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約32kg | R6.11.5 | 陰性 |
| 1552 | 観音寺市 | R6.11.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約60kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1553 | 小豆島町 | R6.11.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約27kg | R6.11.5 | 陰性 |
| 1554 | 小豆島町 | R6.11.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約55kg | R6.11.5 | 陰性 |
| 1555 | 小豆島町 | R6.11.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約125cm | 約79kg | R6.11.5 | 陰性 |
| 1556 | 綾川町 | R6.11.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約25kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1557 | 綾川町 | R6.11.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約60kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1558 | 綾川町 | R6.11.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約135cm | 約60kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1559 | 綾川町 | R6.11.5 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約75cm | 約12kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1560 | 綾川町 | R6.11.5 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約82cm | 約15kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1561 | 土庄町 | R6.11.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約16kg | R6.11.12 | 陰性 |
| 1562 | 小豆島町 | R6.11.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R6.11.12 | 陰性 |
| 1563 | 小豆島町 | R6.11.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約25kg | R6.11.12 | 陰性 |
| 1564 | 高松市 | R6.11.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約82cm | 約17kg | R6.11.12 | 陰性 |
| 1565 | 高松市 | R6.11.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約20kg | R6.11.12 | 陰性 |
| 1566 | 高松市 | R6.11.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約82cm | 約17kg | R6.11.12 | 陰性 |
| 1567 | 高松市 | R6.11.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約25kg | R6.11.12 | 陰性 |
| 1568 | さぬき市 | R6.11.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R6.11.12 | 陰性 |
| 1569 | 高松市 | R6.11.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約13kg | R6.11.12 | 陰性 |
| 1570 | 三木町 | R6.11.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約30kg | R6.11.12 | 陰性 |
| 1571 | 坂出市 | R6.11.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1572 | 坂出市 | R6.11.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1573 | 土庄町 | R6.11.8 | 死亡 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約7kg | R6.11.12 | 陰性 |
| 1574 | 綾川町 | R6.11.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約138cm | 約65kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1575 | 綾川町 | R6.11.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約133cm | 約67kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1576 | 綾川町 | R6.11.12 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約97cm | 約30kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1577 | さぬき市 | R6.11.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1578 | 高松市 | R6.11.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約70kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1579 | まんのう町 | R6.11.12 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1580 | まんのう町 | R6.11.12 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約40cm | 約4kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1581 | まんのう町 | R6.11.12 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約40cm | 約4kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1582 | 土庄町 | R6.11.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約14kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1583 | 高松市 | R6.11.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約70kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1584 | まんのう町 | R6.11.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1585 | まんのう町 | R6.11.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1586 | 三豊市 | R6.11.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約80kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1587 | 三豊市 | R6.11.14 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約80cm | 約20kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1588 | 三豊市 | R6.11.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1589 | 高松市 | R6.11.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約35kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1590 | 高松市 | R6.11.13 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約10kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1591 | 高松市 | R6.11.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約35kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1592 | 高松市 | R6.11.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約35kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1593 | 高松市 | R6.11.17 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約12kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1594 | 高松市 | R6.11.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1595 | 三木町 | R6.11.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約15kg | R6.11.19 | 陰性 |
| 1596 | 高松市 | R6.11.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R6.11.26 | 陰性 |
| 1597 | 高松市 | R6.11.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約88cm | 約30kg | R6.11.26 | 陰性 |
| 1598 | 東かがわ市 | R6.11.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R6.12.3 | 陰性 |
| 1599 | 東かがわ市 | R6.11.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約50cm | 約15kg | R6.12.3 | 陰性 |
| 1600 | 東かがわ市 | R6.11.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約50cm | 約30kg | R6.12.3 | 陰性 |
| 1601 | 東かがわ市 | R6.11.29 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約6kg | R6.12.3 | 陰性 |
| 1602 | 小豆島町 | R6.12.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R6.12.3 | 陰性 |
| 1603 | 小豆島町 | R6.12.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約55kg | R6.12.3 | 陰性 |
| 1604 | 小豆島町 | R6.12.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約28kg | R6.12.3 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|----|---|----|--------|-------|----------|------|
| 1605 | 土庄町 | R6.12.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R6.12.3 | 陰性 |
| 1606 | 土庄町 | R6.12.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約29kg | R6.12.3 | 陰性 |
| 1607 | 小豆島町 | R6.12.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約70kg | R6.12.3 | 陰性 |
| 1608 | 小豆島町 | R6.12.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約23kg | R6.12.3 | 陰性 |
| 1609 | 土庄町 | R6.12.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約22kg | R6.12.3 | 陰性 |
| 1610 | 坂出市 | R6.11.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約40kg | R6.12.10 | 陰性 |
| 1611 | さぬき市 | R6.12.2 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約15kg | R6.12.3 | 陰性 |
| 1612 | 高松市 | R6.12.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約87cm | 約25kg | R6.12.3 | 陰性 |
| 1613 | 土庄町 | R6.12.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約15kg | R6.12.10 | 陰性 |
| 1614 | 小豆島町 | R6.12.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R6.12.10 | 陰性 |
| 1615 | 小豆島町 | R6.12.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約150cm | 約85kg | R6.12.10 | 陰性 |
| 1616 | 高松市 | R6.12.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約35kg | R6.12.10 | 陰性 |
| 1617 | 高松市 | R6.12.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約102cm | 約30kg | R6.12.10 | 陰性 |
| 1618 | 土庄町 | R6.12.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約13kg | R6.12.10 | 陰性 |
| 1619 | 土庄町 | R6.12.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約13kg | R6.12.10 | 陰性 |
| 1620 | 丸亀市 | R6.12.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約60kg | R6.12.10 | 陰性 |
| 1621 | まんのう町 | R6.12.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約20kg | R6.12.17 | 陰性 |
| 1622 | 高松市 | R6.12.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R6.12.10 | 陰性 |
| 1623 | 高松市 | R6.12.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R6.12.10 | 陰性 |
| 1624 | まんのう町 | R6.12.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約70kg | R6.12.17 | 陰性 |
| 1625 | 丸亀市 | R6.12.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約50kg | R6.12.17 | 陰性 |
| 1626 | 高松市 | R6.12.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R6.12.17 | 陰性 |
| 1627 | まんのう町 | R6.12.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約60kg | R6.12.17 | 陰性 |
| 1628 | まんのう町 | R6.12.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約50kg | R6.12.17 | 陰性 |
| 1629 | 高松市 | R6.12.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R6.12.17 | 陰性 |
| 1630 | 高松市 | R6.12.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R6.12.24 | 陰性 |
| 1631 | 丸亀市 | R6.12.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約90kg | R6.12.24 | 陰性 |
| 1632 | 丸亀市 | R6.12.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約60kg | R6.12.24 | 陰性 |
| 1633 | 高松市 | R6.12.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R6.12.24 | 陰性 |
| 1634 | 高松市 | R6.12.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R6.12.24 | 陰性 |
| 1635 | 高松市 | R6.12.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R6.12.24 | 陰性 |
| 1636 | 高松市 | R6.12.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R6.12.24 | 陰性 |
| 1637 | 高松市 | R6.12.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R6.12.24 | 陰性 |
| 1638 | 高松市 | R6.12.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約35kg | R6.12.24 | 陰性 |
| 1639 | 三豊市 | R7.1.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R7.1.28 | 陰性 |
| 1640 | さぬき市 | R7.1.14 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約7kg | R7.1.15 | 陰性 |
| 1641 | 三豊市 | R7.1.14 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約70kg | R7.1.15 | 陽性53 |
| 1642 | さぬき市 | R7.1.17 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約20kg | R7.1.21 | 陰性 |
| 1643 | 三豊市 | R7.1.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約70kg | R7.1.28 | 陰性 |
| 1644 | 坂出市 | R7.1.25 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約80cm | 約15kg | R7.2.4 | 陰性 |
| 1645 | 三豊市 | R7.1.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R7.2.4 | 陰性 |
| 1646 | 土庄町 | R7.2.18 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約28kg | R7.2.25 | 陰性 |
| 1647 | 小豆島町 | R7.5.2 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R7.5.13 | 陰性 |
| 1648 | 善通寺市 | R7.6.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約25kg | R7.6.10 | 陰性 |
| 1649 | 善通寺市 | R7.6.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R7.6.10 | 陰性 |
| 1650 | 多度津町 | R7.6.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約40kg | R7.6.10 | 陰性 |
| 1651 | 多度津町 | R7.6.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R7.6.10 | 陰性 |
| 1652 | 丸亀市 | R7.6.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R7.6.10 | 陰性 |
| 1653 | 丸亀市 | R7.6.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約130cm | 約80kg | R7.6.10 | 陰性 |
| 1654 | 丸亀市 | R7.6.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約125cm | 約80kg | R7.6.10 | 陰性 |
| 1655 | 三豊市 | R7.6.5 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R7.6.10 | 陰性 |
| 1656 | 多度津町 | R7.6.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R7.6.24 | 陰性 |
| 1657 | 坂出市 | R7.6.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約25kg | R7.6.24 | 陰性 |
| 1658 | 高松市 | R7.6.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約25kg | R7.6.24 | 陽性54 |
| 1659 | 綾川町 | R7.6.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約35kg | R7.6.24 | 陰性 |
| 1660 | 丸亀市 | R7.6.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約70kg | R7.6.24 | 陰性 |
| 1661 | 高松市 | R7.6.20 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約40kg | R7.6.24 | 陰性 |
| 1662 | 高松市 | R7.6.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約45kg | R7.6.24 | 陰性 |
| 1663 | 高松市 | R7.6.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約92cm | 約20kg | R7.7.1 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---------|----|---|----|--------|-------|---------|------|
| 1664 | 高松市 | R7.6.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R7.7.1 | 陰性 |
| 1665 | 高松市 | R7.6.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約40kg | R7.7.1 | 陰性 |
| 1666 | 高松市 | R7.7.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約20kg | R7.7.8 | 陰性 |
| 1667 | 多度津町 | R7.7.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約126cm | 約75kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1668 | 坂出市 | R7.7.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約35kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1669 | さぬき市 | R7.7.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約35kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1670 | 善通寺市 | R7.7.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1671 | 坂出市 | R7.7.9 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約55cm | 約8kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1672 | 綾川町 | R7.7.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約36kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1673 | 高松市 | R7.7.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約125cm | 約60kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1674 | 小豆島町 | R7.6.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約24kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1675 | 土庄町 | R7.7.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約17kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1676 | 小豆島町 | R7.6.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約75kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1677 | 小豆島町 | R7.7.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約27kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1678 | 小豆島町 | R7.7.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1679 | 土庄町 | R7.7.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1680 | 小豆島町 | R7.7.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約115cm | 約60kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1681 | 小豆島町 | R7.7.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1682 | 小豆島町 | R7.7.7 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約4kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1683 | 土庄町 | R7.7.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約26kg | R7.7.15 | 陽性55 |
| 1684 | 小豆島町 | R7.7.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約40kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1685 | 土庄町 | R7.7.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約26kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1686 | 土庄町 | R7.7.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約12kg | R7.7.29 | 陰性 |
| 1687 | 坂出市 | R7.7.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約50kg | R7.7.22 | 陰性 |
| 1688 | 高松市 | R7.7.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約35kg | R7.7.22 | 陰性 |
| 1689 | 高松市 | R7.7.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約27kg | R7.7.15 | 陰性 |
| 1690 | 高松市 | R7.7.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R7.7.22 | 陰性 |
| 1691 | 高松市 | R7.7.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約22kg | R7.7.22 | 陰性 |
| 1692 | さぬき市 | R7.7.16 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm | 約30kg | R7.7.22 | 陰性 |
| 1693 | さぬき市 | R7.7.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約40kg | R7.7.22 | 陰性 |
| 1694 | 高松市 | R7.7.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約76cm | 約27kg | R7.7.22 | 陰性 |
| 1695 | さぬき市 | R7.7.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約112cm | 約50kg | R7.7.22 | 陰性 |
| 1696 | 高松市 | R7.7.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 不明 | 約35kg | R7.7.22 | 陰性 |
| 1697 | 高松市 | R7.7.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R7.7.29 | 陰性 |
| 1698 | 善通寺市 | R7.7.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約95cm | 約30kg | R7.8.5 | 陰性 |
| 1699 | 高松市 | R7.7.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約45kg | R7.7.29 | 陰性 |
| 1700 | 多度津町 | R7.7.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R7.8.5 | 陰性 |
| 1701 | 善通寺市 | R7.7.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R7.8.5 | 陰性 |
| 1702 | 高松市 | R7.8.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約41kg | R7.8.5 | 陰性 |
| 1703 | 高松市 | R7.8.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約125cm | 約41kg | R7.8.5 | 陰性 |
| 1704 | 高松市 | R7.8.3 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約7kg | R7.8.5 | 陰性 |
| 1705 | 高松市 | R7.8.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約28kg | R7.8.5 | 陰性 |
| 1706 | さぬき市 | R7.8.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R7.8.5 | 陰性 |
| 1707 | 高松市 | R7.8.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約28kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1708 | 土庄町 | R7.7.23 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 不明 | 約29kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1709 | 土庄町 | R7.7.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約27kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1710 | 土庄町 | R7.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約77cm | 約19kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1711 | 土庄町 | R7.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約28kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1712 | 土庄町 | R7.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1713 | 土庄町 | R7.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1714 | 小豆島町 | R7.8.1 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約30cm | 約1kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1715 | 土庄町 | R7.8.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約88cm | 約19kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1716 | 小豆島町 | R7.8.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1717 | 土庄町 | R7.8.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約50cm | 約4kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1718 | 土庄町 | R7.8.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1719 | 土庄町 | R7.8.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約48kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1720 | 小豆島町 | R7.8.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約33kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1721 | 小豆島町 | R7.8.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1722 | 小豆島町 | R7.8.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約55cm | 約40kg | R7.8.12 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----|--------|-------|---------|----|
| 1723 | 高松市 | R7.8.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約118cm | 約42kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1724 | 高松市 | R7.8.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約40kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1725 | 高松市 | R7.8.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1726 | 高松市 | R7.8.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約33kg | R7.8.12 | 陰性 |
| 1727 | 善通寺市 | R7.8.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約30kg | R7.8.19 | 陰性 |
| 1728 | 善通寺市 | R7.8.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約35kg | R7.8.19 | 陰性 |
| 1729 | 丸亀市 | R7.8.13 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約40cm | 約3kg | R7.8.19 | 陰性 |
| 1730 | さぬき市 | R7.8.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約101cm | 約35kg | R7.8.19 | 陰性 |
| 1731 | 高松市 | R7.8.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約51kg | R7.8.19 | 陰性 |
| 1732 | 高松市 | R7.8.17 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約27kg | R7.8.19 | 陰性 |
| 1733 | 善通寺市 | R7.8.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約30kg | R7.9.2 | 陰性 |
| 1734 | さぬき市 | R7.8.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm | 約40kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1735 | まんのう町 | R7.8.20 | 死亡 | 雄 | 幼獣 | 約30cm | 約3kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1736 | 綾川町 | R7.8.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約30kg | R7.9.2 | 陰性 |
| 1737 | 高松市 | R7.8.20 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約7kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1738 | 高松市 | R7.8.20 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約8kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1739 | 高松市 | R7.8.21 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約4kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1740 | 高松市 | R7.8.20 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約7kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1741 | 高松市 | R7.8.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約66kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1742 | 高松市 | R7.8.22 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約65cm | 約10kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1743 | 観音寺市 | R7.8.23 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約40cm | 約3kg | R7.9.2 | 陰性 |
| 1744 | さぬき市 | R7.8.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約55cm | 約35kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1745 | 高松市 | R7.8.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約28kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1746 | 高松市 | R7.8.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約97cm | 約30kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1747 | 高松市 | R7.8.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約12kg | R7.8.26 | 陰性 |
| 1748 | 高松市 | R7.8.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R7.9.2 | 陰性 |
| 1749 | 高松市 | R7.8.28 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約8kg | R7.9.2 | 陰性 |
| 1750 | 高松市 | R7.8.31 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約8kg | R7.9.2 | 陰性 |
| 1751 | 綾川町 | R7.9.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約40kg | R7.9.9 | 陰性 |
| 1752 | 高松市 | R7.9.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約74cm | 約15kg | R7.9.2 | 陰性 |
| 1753 | 高松市 | R7.9.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約16kg | R7.9.9 | 陰性 |
| 1754 | 三豊市 | R7.9.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R7.9.9 | 陰性 |
| 1755 | 綾川町 | R7.9.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R7.9.9 | 陰性 |
| 1756 | 高松市 | R7.9.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約103cm | 約25kg | R7.9.9 | 陰性 |
| 1757 | 高松市 | R7.9.5 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約8kg | R7.9.9 | 陰性 |
| 1758 | 高松市 | R7.9.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm | 約8kg | R7.9.9 | 陰性 |
| 1759 | 高松市 | R7.9.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R7.9.9 | 陰性 |
| 1760 | 高松市 | R7.9.9 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1761 | 土庄町 | R7.9.1 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 約101cm | 約40kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1762 | 土庄町 | R7.9.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約90kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1763 | 土庄町 | R7.9.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約18kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1764 | 小豆島町 | R7.9.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約72cm | 約53kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1765 | 小豆島町 | R7.9.2 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約82cm | 約35kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1766 | 小豆島町 | R7.9.2 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約50cm | 約3kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1767 | 小豆島町 | R7.9.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約102cm | 約30kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1768 | 小豆島町 | R7.9.3 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約4kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1769 | 小豆島町 | R7.9.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約35kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1770 | 小豆島町 | R7.9.3 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約3kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1771 | 土庄町 | R7.9.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約40kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1772 | 土庄町 | R7.9.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1773 | 土庄町 | R7.9.9 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約7kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1774 | 高松市 | R7.9.9 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約10kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1775 | 高松市 | R7.8.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約38kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1776 | 多度津町 | R7.9.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約25kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1777 | さぬき市 | R7.9.11 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1778 | 高松市 | R7.9.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約35kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1779 | 高松市 | R7.9.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約15kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1780 | さぬき市 | R7.9.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約93cm | 約35kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1781 | 善通寺市 | R7.9.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約60kg | R7.9.24 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|----------|----|---|----|--------|--------|----------|----|
| 1782 | 綾川町 | R7.9.11 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約55cm | 約5kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1783 | 高松市 | R7.9.11 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約6kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1784 | 綾川町 | R7.9.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約135cm | 約70kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1785 | 高松市 | R7.9.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約150cm | 約60kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1786 | 高松市 | R7.9.12 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約10kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1787 | 高松市 | R7.9.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R7.9.16 | 陰性 |
| 1788 | 多度津町 | R7.9.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約40kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1789 | 高松市 | R7.9.15 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約10kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1790 | 高松市 | R7.9.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約35kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1791 | 高松市 | R7.9.16 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1792 | 高松市 | R7.9.14 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約45cm | 約6kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1793 | 高松市 | R7.9.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1794 | 高松市 | R7.9.17 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約55cm | 約8kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1795 | 高松市 | R7.9.17 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約10kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1796 | 高松市 | R7.9.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約96cm | 約40kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1797 | 高松市 | R7.9.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約104cm | 約50kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1798 | 高松市 | R7.9.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約30kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1799 | 多度津町 | R7.9.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約30kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1800 | 善通寺市 | R7.9.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約45kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1801 | 高松市 | R7.9.17 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約10kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1802 | 高松市 | R7.9.17 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約10kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1803 | 高松市 | R7.9.17 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約10kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1804 | 多度津町 | R7.9.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約40kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1805 | 高松市 | R7.9.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約10kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1806 | 高松市 | R7.9.18 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約10kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1807 | 綾川町 | R7.9.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約30kg | R7.9.30 | 陰性 |
| 1808 | 善通寺市 | R7.9.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約25kg | R7.9.30 | 陰性 |
| 1809 | 高松市 | R7.9.21 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約46cm | 約7kg | R7.9.24 | 陰性 |
| 1810 | 丸亀市 | R7.9.22 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約60kg | R7.9.30 | 陰性 |
| 1811 | 綾川町 | R7.9.24 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約114cm | 約35kg | R7.9.30 | 陰性 |
| 1812 | さぬき市 | R7.9.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約15kg | R7.9.30 | 陰性 |
| 1813 | 丸亀市 | R7.9.25 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約30cm | 約10kg | R7.9.30 | 陰性 |
| 1814 | 丸亀市 | R7.9.25 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約80kg | R7.9.30 | 陰性 |
| 1815 | 高松市 | R7.9.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約85cm | 約30kg | R7.9.30 | 陰性 |
| 1816 | 高松市 | R7.9.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約23kg | R7.9.30 | 陰性 |
| 1817 | 善通寺市 | R7.9.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約125cm | 約40kg | R7.10.7 | 陰性 |
| 1818 | 丸亀市 | R7.10.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約140cm | 約120kg | R7.10.7 | 陰性 |
| 1819 | 土庄町 | R7.10.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約9kg | R7.10.7 | 陰性 |
| 1820 | 小豆島町 | R7.10.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約45kg | R7.10.7 | 陰性 |
| 1821 | 小豆島町 | R7.10.1 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約9kg | R7.10.7 | 陰性 |
| 1822 | 小豆島町 | R7.10.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約60kg | R7.10.7 | 陰性 |
| 1823 | 小豆島町 | R7.10.2 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R7.10.7 | 陰性 |
| 1824 | 土庄町 | R7.10.2 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約6kg | R7.10.7 | 陰性 |
| 1825 | 小豆島町 | R7.10.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約15kg | R7.10.7 | 陰性 |
| 1826 | 高松市 | R7.10.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R7.10.7 | 陰性 |
| 1827 | 坂出市 | R7.10.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約73cm | 約18kg | R7.10.21 | 陰性 |
| 1828 | 高松市 | R7.10.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約60kg | R7.10.15 | 陰性 |
| 1829 | 高松市 | R7.10.9 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約45cm | 約10kg | R7.10.15 | 陰性 |
| 1830 | 高松市 | R7.10.9 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約40cm | 約8kg | R7.10.15 | 陰性 |
| 1831 | 高松市 | R7.10.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約45kg | R7.10.15 | 陰性 |
| 1832 | 高松市 | R7.10.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R7.10.15 | 陰性 |
| 1833 | 高松市 | R7.10.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約10kg | R7.10.15 | 陰性 |
| 1834 | 高松市 | R7.10.13 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約110kg | R7.10.15 | 陰性 |
| 1835 | 高松市 | R7.10.13 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R7.10.15 | 陰性 |
| 1836 | 綾川町 | R7.10.15 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約130cm | 約60kg | R7.10.21 | 陰性 |
| 1837 | 坂出市 | R7.10.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約35kg | R7.10.21 | 陰性 |
| 1838 | 坂出市 | R7.10.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約13kg | R7.10.21 | 陰性 |
| 1839 | 土庄町 | R7.10.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約11kg | R7.10.21 | 陰性 |
| 1840 | 小豆島町 | R7.10.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R7.10.21 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|----|----|----|--------|-------|----------|----|
| 1841 | 小豆島町 | R7.10.8 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約95cm | 約37kg | R7.10.21 | 陰性 |
| 1842 | 小豆島町 | R7.10.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約45kg | R7.10.21 | 陰性 |
| 1843 | 土庄町 | R7.10.10 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約45kg | R7.10.21 | 陰性 |
| 1844 | 小豆島町 | R7.10.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R7.10.21 | 陰性 |
| 1845 | 高松市 | R7.10.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約103cm | 約40kg | R7.10.21 | 陰性 |
| 1846 | 高松市 | R7.10.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約35kg | R7.10.21 | 陰性 |
| 1847 | 丸亀市 | R7.10.19 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約80kg | R7.10.28 | 陰性 |
| 1848 | さぬき市 | R7.10.22 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約80cm | 約10kg | R7.10.28 | 陰性 |
| 1849 | 高松市 | R7.10.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約35kg | R7.10.28 | 陰性 |
| 1850 | 高松市 | R7.10.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約45kg | R7.10.28 | 陰性 |
| 1851 | 高松市 | R7.10.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R7.10.28 | 陰性 |
| 1852 | 綾川町 | R7.10.21 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約40kg | R7.10.28 | 陰性 |
| 1853 | 綾川町 | R7.10.22 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約85cm | 約10kg | R7.10.28 | 陰性 |
| 1854 | 高松市 | R7.10.23 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約90cm | 約20kg | R7.10.28 | 陰性 |
| 1855 | 高松市 | R7.10.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約30kg | R7.10.28 | 陰性 |
| 1856 | 丸亀市 | R7.10.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1857 | 丸亀市 | R7.10.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1858 | 高松市 | R7.10.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約35kg | R7.10.28 | 陰性 |
| 1859 | 三豊市 | R7.10.27 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1860 | 高松市 | R7.10.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約9kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1861 | 高松市 | R7.10.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約10kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1862 | 高松市 | R7.10.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約118cm | 約40kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1863 | 丸亀市 | R7.10.28 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1864 | 丸亀市 | R7.10.28 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1865 | まんのう町 | R7.10.29 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm | 約20kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1866 | まんのう町 | R7.10.29 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1867 | 観音寺市 | R7.10.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約85cm | 約65kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1868 | 高松市 | R7.10.30 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 約90cm | 約40kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1869 | 三豊市 | R7.10.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約50kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1870 | 三豊市 | R7.10.28 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約50kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1871 | 三豊市 | R7.10.29 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 不明 | 約60kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1872 | 三豊市 | R7.10.30 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 不明 | 約70kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1873 | 三豊市 | R7.10.30 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約50kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1874 | 綾川町 | R7.10.31 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約133cm | 約67kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1875 | 三木町 | R7.11.1 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1876 | さぬき市 | R7.11.4 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R7.11.5 | 陰性 |
| 1877 | 観音寺市 | R7.11.1 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約40cm | 約10kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1878 | さぬき市 | R7.11.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1879 | 三豊市 | R7.11.1 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約70kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1880 | まんのう町 | R7.11.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約25kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1881 | 綾川町 | R7.11.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約140cm | 約70kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1882 | 綾川町 | R7.11.5 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約83cm | 約20kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1883 | 善通寺市 | R7.11.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約130cm | 約60kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1884 | 高松市 | R7.11.6 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約68cm | 約6kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1885 | 坂出市 | R7.11.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約71cm | 約18kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1886 | 坂出市 | R7.11.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約75cm | 約22kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1887 | 綾川町 | R7.11.6 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約97cm | 約18kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1888 | 三豊市 | R7.11.6 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約60kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1889 | 高松市 | R7.11.7 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約20kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1890 | 高松市 | R7.11.7 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約12kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1891 | 高松市 | R7.11.7 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約13kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1892 | 高松市 | R7.11.8 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約70cm | 約8kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1893 | 高松市 | R7.11.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1894 | 坂出市 | R7.11.10 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約70cm | 約15kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1895 | 東かがわ市 | R7.11.11 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R7.11.11 | 陰性 |
| 1896 | 高松市 | R7.11.12 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約105cm | 約42kg | R7.11.17 | 陰性 |
| 1897 | 綾川町 | R7.11.12 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約134cm | 約60kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1898 | 綾川町 | R7.11.14 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約89cm | 約25kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1899 | 高松市 | R7.11.14 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 約60cm | 約10kg | R7.11.17 | 陰性 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|----|----|----|--------|-------|----------|------|
| 1900 | 高松市 | R7.11.15 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約25kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1901 | まんのう町 | R7.11.16 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約60kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1902 | 綾川町 | R7.11.17 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約140cm | 約60kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1903 | 土庄町 | R7.11.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1904 | 土庄町 | R7.11.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約15kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1905 | 土庄町 | R7.11.4 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約29kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1906 | 小豆島町 | R7.11.4 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約65cm | 約6kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1907 | 小豆島町 | R7.11.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約17kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1908 | 小豆島町 | R7.11.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約75cm | 約20kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1909 | 小豆島町 | R7.11.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約35kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1910 | 小豆島町 | R7.11.5 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約15kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1911 | 土庄町 | R7.11.9 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約65cm | 約8kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1912 | 小豆島町 | R7.11.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約115cm | 約50kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1913 | 小豆島町 | R7.11.10 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1914 | 土庄町 | R7.11.11 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約105cm | 約40kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1915 | 土庄町 | R7.11.16 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約9kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1916 | 綾川町 | R7.11.20 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約136cm | 約70kg | R7.12.2 | 陰性 |
| 1917 | 観音寺市 | R7.11.21 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 約60cm | 約12kg | R7.12.2 | 陰性 |
| 1918 | 高松市 | R7.11.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約20kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1919 | 高松市 | R7.11.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約60cm | 約15kg | R7.11.25 | 陰性 |
| 1920 | 高松市 | R7.11.23 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約18kg | R7.12.2 | 陰性 |
| 1921 | 綾川町 | R7.11.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約90cm | 約20kg | R7.12.2 | 陰性 |
| 1922 | 観音寺市 | R7.11.24 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約45kg | R7.12.2 | 陰性 |
| 1923 | まんのう町 | R7.11.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約20kg | R7.12.2 | 陰性 |
| 1924 | 観音寺市 | R7.11.27 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約10kg | R7.12.2 | 陰性 |
| 1925 | まんのう町 | R7.11.27 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約65cm | 約25kg | R7.12.2 | 陰性 |
| 1926 | 高松市 | R7.11.26 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約40kg | R7.12.2 | 陰性 |
| 1927 | 綾川町 | R7.11.27 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 約108cm | 約50kg | R7.12.2 | 陰性 |
| 1928 | 綾川町 | R7.11.27 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約83cm | 約25kg | R7.12.2 | 陰性 |
| 1929 | 坂出市 | R7.11.30 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約75cm | 約20kg | R7.12.8 | 陰性 |
| 1930 | 高松市 | R7.11.30 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約110cm | 約80kg | R7.12.2 | 陰性 |
| 1931 | 三豊市 | R7.11.23 | 捕獲 | 雌 | 不明 | 不明 | 約60kg | R7.12.8 | 陰性 |
| 1932 | 三豊市 | R7.11.30 | 捕獲 | 雌 | 不明 | 不明 | 約80kg | R7.12.8 | 陰性 |
| 1933 | 高松市 | R7.12.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約120cm | 約45kg | R7.12.8 | 陰性 |
| 1934 | 高松市 | R7.12.3 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約123cm | 約50kg | R7.12.8 | 陰性 |
| 1935 | 高松市 | R7.12.7 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約120cm | 約60kg | R7.12.8 | 陰性 |
| 1936 | 高松市 | R7.12.5 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約60kg | R7.12.16 | 陰性 |
| 1937 | さぬき市 | R7.12.8 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約70cm | 約15kg | R7.12.16 | 陰性 |
| 1938 | まんのう町 | R7.11.30 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約70kg | R7.12.23 | 陰性 |
| 1939 | まんのう町 | R7.12.8 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約50cm | 約10kg | R7.12.23 | 陰性 |
| 1940 | 三豊市 | R7.12.16 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約110cm | 約60kg | R7.12.23 | 陰性 |
| 1941 | 綾川町 | R7.12.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約136cm | 約75kg | R7.12.23 | 陰性 |
| 1942 | まんのう町 | R7.12.14 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 約60cm | 約10kg | R7.12.23 | 陰性 |
| 1943 | 東かがわ市 | R7.12.25 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約60cm | 約30kg | R8.1.6 | 陰性 |
| 1944 | さぬき市 | R8.1.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約70kg | R8.1.6 | 陰性 |
| 1945 | さぬき市 | R8.1.3 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約80cm | 約15kg | R8.1.6 | 陰性 |
| 1946 | 三豊市 | R8.1.3 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 不明 | 不明 | R8.1.28 | 陰性 |
| 1947 | 三豊市 | R8.1.7 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 不明 | 不明 | R8.1.28 | 陰性 |
| 1948 | 三豊市 | R8.1.14 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約15kg | R8.1.28 | 陽性56 |
| 1949 | 東かがわ市 | R8.1.18 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約80cm | 約30kg | R8.1.20 | 陰性 |
| 1950 | まんのう町 | R8.1.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約100cm | 約80kg | R8.1.28 | 陰性 |
| 1951 | 三豊市 | R8.1.19 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 不明 | 約25kg | R8.1.28 | 陽性57 |
| 1952 | 東かがわ市 | R8.1.21 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R8.1.28 | 陰性 |
| 1953 | 東かがわ市 | R8.1.22 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 約100cm | 約50kg | R8.1.28 | 陰性 |
| 1954 | 三豊市 | R8.1.26 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 約70cm | 約30kg | R8.2.3 | 陰性 |