


1. 屋島湾の海水温 (午前9時)

2月17日の屋島湾の海水温は 9.3℃で、昨年度より1.4℃高く、平年値より1.0℃高くなっています。

2. 摘採の状況

水温は気温の上昇に伴い徐々に上昇し、昨年度より高くなっています。ほぼ全ての漁場で状態の悪い網を整理中もしくは網揚げ作業中であり、早い漁場では網揚げが終了した。

東讃:伸びはかなり悪く、色艶もかなり浅い。引田は98%、津田は20%状態の悪い網を整理中。牟礼は40%、庵治は70%網揚げ。庵治は2月22日網揚げ終了予定。東讃は網揚げ終了。

高松:香西は7回目、直島は8回目を摘採。伸びはかなり悪く、色艶もかなり浅い。瀬戸内は25%、香西は50%、直島は50%網揚げ。下笠居は2月20日に網揚げ終了予定。

小豆:伸びはかなり悪く、色艶もかなり浅い。四海は状態の悪い網を30%整理中。

土庄中央は30%、唐櫃は50%、大部は80%、北浦、内海は90%網揚げ。

大部、内海は2月20日に網揚げ終了予定。

中讃:伸びはやや悪く、色艶もやや浅い。与島は状態の悪い網を3%整理中。

丸亀は状態の悪い網を20%整理中で2月12日より網揚げ開始。

3. 栄養塩及びプランクトン

採水日：令和8年2月17日

① 栄養塩

(分析機関：香川県水産試験場、単位： $\mu\text{g at/l}$)

漁場		三 態 窒 素										
		12/9	12/16	12/26	1/6	1/13	1/20	1/27	2/3	2/10	2/17	2/24
引田	本年度	3.0	3.7	5.8	2.4	1.1	0.8	0.5	1.4	0.6	1.1	
	前年度	3.7	4.0	2.4	2.6	2.6	1.4	0.5	2.4	0.8	0.6	0.8
東讃	本年度	2.5	2.1	3.0	1.0	0.5	0.4	0.4	0.8	0.5	0.2	
	前年度	4.4	2.2	1.2	2.0	1.1	1.9	0.4	1.7	0.1	1.3	0.1
津田	本年度	2.1	2.6	3.4	0.8	0.5	0.3	欠測	0.2	0.4	欠測	
	前年度	6.1	3.7	1.4	2.4	1.8	2.0	2.2	欠測	0.3	0.3	0.1
志度湾	本年度	2.4	2.1	欠測	1.1	0.9	0.3	0.5	0.1	0.2	0.2	
	前年度	4.2	3.1	0.4	2.1	1.9	2.2	1.6	1.0	0.5	0.6	0.1
庵治	本年度	2.4	2.2	2.9	1.6	0.7	0.9	0.8	0.4	0.3	0.3	
	前年度	3.8	3.0	0.7	2.0	2.5	2.6	2.9	1.3	0.8	0.5	0.1
瀬戸内	本年度	3.2	3.1	3.0	1.0	0.3	0.7	2.2	0.2	0.1	0.2	
	前年度	3.3	3.1	1.9	2.2	3.0	2.3	1.6	1.0	0.4	0.6	0.2
香西	本年度	2.3	2.9	3.3	0.8	0.6	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2	
	前年度	3.1	2.7	1.8	2.0	2.5	3.4	2.1	1.4	0.1	0.5	1.0
下笠居	本年度	1.4	1.6	2.2	0.6	0.4	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2	
	前年度	2.4	1.7	1.2	2.1	2.2	2.0	0.8	0.5	0.0	0.1	0.0
直島	本年度	2.2	2.1	2.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	
	前年度	3.5	3.1	1.6	2.7	1.7	4.8	1.1	0.6	0.3	0.2	0.2
土庄	本年度	2.1	1.7	5.9	0.8	0.6	0.3	0.2	欠測	欠測	0.1	
	前年度	3.8	3.0	0.7	3.3	欠測	3.2	1.2	0.4	0.1	0.8	0.3
四海	本年度	2.1	2.3	3.0	0.8	0.4	0.3	0.6	0.2	0.1	0.2	
	前年度	5.0	3.5	1.3	2.0	2.0	2.2	1.5	0.4	0.4	0.2	欠測
唐櫃	本年度	1.7	1.9	3.0	0.6	0.3	0.2	0.5	0.1	0.1	0.2	
	前年度	3.3	2.3	0.9	1.5	1.4	1.9	0.7	0.3	1.1	0.1	0.3
北浦	本年度	2.4	2.3	3.0	0.9	0.6	0.6	0.3	0.2	0.1	0.2	
	前年度	4.8	3.0	1.8	1.6	1.5	2.2	1.2	0.4	0.1	0.1	0.1
大部	本年度	2.2	2.4	3.0	1.5	0.9	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	
	前年度	4.5	3.4	1.1	4.4	2.9	2.0	1.3	0.9	2.7	0.7	0.6
内海	本年度	1.8	2.3	2.7	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0.2	0.3	
	前年度	4.4	3.9	2.0	3.1	2.3	1.9	2.2	1.1	1.4	0.8	1.1
与島	本年度	4.7	2.2	3.8	0.7	0.4	0.7	0.7	0.2	0.3	0.7	
	前年度	3.4	3.5	2.0	4.3	3.9	0.6	1.3	1.9	1.7	0.9	2.0
丸亀市	本年度	0.3	0.8	1.4	1.4	0.6	0.7	0.6	欠測	欠測	欠測	
	前年度	2.3	0.5	2.3	1.4	2.4	0.7	0.0	0.4	0.2	0.1	0.1
箱浦	本年度	0.5	0.5	0.6	0.2	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2	0.2	
	前年度	1.5	0.6	1.6	1.1	1.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
宇多津	本年度	欠測	2.0	欠測	1.9	欠測	欠測	欠測	欠測	0.3	欠測	
	前年度	2.4	2.2	欠測	欠測	欠測	0.1	欠測	欠測	欠測	0.1	0.4
平均	本年度	2.2	2.2	3.1	1.0	0.6	0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.0
	前年度	3.8	2.8	1.5	2.4	2.2	2.1	1.3	0.9	0.6	0.5	0.4

※三態窒素：アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、 $3\mu\text{g at/l}$ 以下になると色落ちの原因となる。

(調査結果)

本年度第18回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、 $0.1\sim 1.1\mu\text{g at/l}$ 。全漁場における平均は $0.3\mu\text{g at/l}$ で、前年度($0.5\mu\text{g at/l}$)より低い結果となっています。

② 植物プランクトン

(分析機関：香川県赤潮研究所、 単位：個/ℓ)

漁 場	植 物 プ ラ ン ク ト ン 数						備 考	
	コ シ ノ デ ィ ス カ ス				ユ ー カ ン ピ ア		珪藻優占種第1位	
	2月17日		前年同時期		2月17日	前年同時期		
	ワレシ-	全数	ワレシ-	全数				
引 田	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	13,150
東 讃	0	0	0	0	2,025	0	グイナルディア	8,475
津 田	欠測	欠測	0	0	欠測	100	欠測	欠測
志 度 湾	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	37,900
庵 治	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	58,250
高松市瀬戸内	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	56,600
香 西	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	26,400
下 笠 居	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	57,200
直 島	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	38,700
土 庄	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	29,500
四 海	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	34,800
唐 櫃	0	100	0	0	0	0	グイナルディア	38,800
北 浦	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	41,000
大 部	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	36,900
内 海	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	55,900
与 島	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	12,700
丸 亀 市	欠測	欠測	0	0	欠測	0	欠測	欠測
箱 浦	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	38,000
宇 多 津	欠測	欠測	0	0	欠測	0	欠測	欠測

(調査結果)

i) コシノディスカス ワイレシー
全漁場で検出されていません。

ii) ユーカンピア
東讃の2,025個/ℓ、1漁場のみで検出されています。

iii) 珪藻優占種
グイナルディアが主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、2月24日(火)に予定します。

ノリ養殖漁場米養塩調査結果 第18回(令和8年2月17日)

