


ノリ養殖情報

(令和8年度：第2報 8年10月20日)

香川県漁業協同組合連合会

指導課 (TEL 087-825-0351)

1. 屋島湾の海水温 (午前9時)



10月20日の屋島湾の海水温は 24.5℃で、昨年度より1.1℃低く、平年値より1.6℃高くなっています。

2. 育苗について

県内の海水温は平年値より高めの状態が続いており、育苗の開始は水温の降下待ちとなっています。漁場ごとの水温を十分に把握して、育苗の開始時期を検討してください。

東讃: 引田、東讃、鴨庄、牟礼、庵治は種網確保、育苗開始は未定

高松: 香西、下笠居、直島は種網確保。瀬戸内は種網確保完了が未定。直島は10月25日頃、下笠居は10月下旬頃、瀬戸内は10月末頃に育苗開始予定。香西は育苗開始が未定。

小豆: 大部、北浦、唐櫃、内海は種網確保。土庄中央は種網をほぼ確保。四海は10月23日以降種網確保完了予定。内海は10月24～25日に育苗開始予定。四海、土庄中央、大部、北浦、唐櫃は育苗開始が未定。

中讃: 中讃西部、宇多津は種網を確保。与島は種網をほぼ確保。与島、中讃西部、宇田津は育苗開始が未定。

3. 栄養塩及びプランクトン

採水日:令和8年10月20日

① 栄養塩

(分析機関:香川県水産試験場、単位: $\mu\text{g at/l}$)

漁場		三 態 窒 素										
		10/13	10/20	10/27	11/4	11/10	11/17	11/24	12/1	12/8	12/15	12/22
引田	本年度	4.6	1.7									
	前年度	3.1	欠測	3.9	2.1	1.8	2.7	1.9	1.8	3.0	3.7	5.8
東讃	本年度	4.3	3.8									
	前年度	2.7	1.5	1.3	0.7	1.4	0.7	1.3	1.4	2.5	2.1	3.0
津田	本年度	9.7	7.0									
	前年度	2.7	5.3	1.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.1	2.1	2.6	3.4
志度湾	本年度	7.6	5.1									
	前年度	4.1	2.2	1.1	0.7	1.1	1.1	1.0	1.2	2.4	2.1	欠測
庵治	本年度	7.5	6.4									
	前年度	4.8	2.5	1.4	0.9	1.3	1.0	1.2	1.5	2.4	2.2	2.9
瀬戸内	本年度	9.0	11.3									
	前年度	5.4	3.8	3.6	1.0	1.7	1.4	2.0	1.8	3.2	3.1	3.0
香西	本年度	7.9	5.6									
	前年度	5.2	2.7	3.3	1.1	1.6	1.2	1.2	1.9	2.3	2.9	3.3
下笠居	本年度	5.3	6.5									
	前年度	5.0	4.7	4.1	1.5	0.9	1.0	1.9	1.7	1.4	1.6	2.2
直島	本年度	9.3	7.8									
	前年度	7.5	5.4	3.8	1.7	3.0	2.1	2.9	1.6	2.2	2.1	2.5
土庄	本年度	4.9	3.2									
	前年度	3.0	5.0	3.4	1.1	1.1	0.7	1.4	1.4	2.1	1.7	5.9
四海	本年度	9.6	7.1									
	前年度	6.0	5.2	1.6	0.8	1.0	0.5	1.1	1.9	2.1	2.3	3.0
唐櫃	本年度	9.6	8.5									
	前年度	4.1	4.4	2.5	1.0	0.8	0.3	1.0	1.2	1.7	1.9	3.0
北浦	本年度	10.1	6.9									
	前年度	5.9	5.1	2.3	0.7	1.8	1.1	1.7	1.6	2.4	2.3	3.0
大部	本年度	7.8	4.1									
	前年度	3.4	3.3	2.1	0.6	0.9	0.6	1.5	1.3	2.2	2.4	3.0
内海	本年度	5.5	2.5									
	前年度	2.3	2.1	1.2	0.7	0.7	0.8	1.1	1.0	1.8	2.3	2.7
与島	本年度	1.0	4.6									
	前年度	1.8	5.5	1.0	5.5	1.9	1.9	1.4	2.0	4.7	2.2	3.8
丸亀市	本年度	欠測	3.1									
	前年度	1.7	2.5	欠測	1.3	1.1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.8	1.4
箱浦	本年度	0.8	1.5									
	前年度	0.7	0.7	2.4	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6
宇多津	本年度	欠測	7.5									
	前年度	28.9	欠測	1.2	2.7	9.8	0.7	0.3	1.6	欠測	2.0	欠測
平均	本年度	6.7	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前年度	3.9	3.6	2.4	1.3	1.3	1.1	1.4	1.4	2.2	2.2	3.1

※三態窒素: アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、 $3 \mu\text{g at/l}$ 以下になると色落ちの原因となる。

(調査結果)

本年度第2回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、 $1.5 \sim 11.3 \mu\text{g at/l}$ 。全漁場における平均は $5.4 \mu\text{g at/l}$ で、前年度($3.6 \mu\text{g at/l}$)より高い結果となっています。

② 植物プランクトン

(分析機関：香川県赤潮研究所、単位：個/ℓ)

漁 場	植 物 プ ラ ン ク ト ン 数						備 考	
	コ シ ノ デ ィ ス カ ス				ユ ー カ ン ピ ア		珪藻優占種第1位	
	10月20日		前年同時期		10月20日	前年同時期		
	ワイレシー	全数	ワイレシー	全数				
引 田	80	480	欠測	欠測	0	欠測	ベレロケア	90,000
東 讃	60	140	1,200	1,350	0	0	ベレロケア	117,000
津 田	0	110	1,175	1,600	0	0	キートセロス	8,000
志 度 湾	190	390	2,100	2,625	0	175	レプトシリンドラス	50,000
庵 治	330	480	2,300	3,575	0	0	キートセロス	10,000
高松市瀬戸内	190	230	2,525	3,100	0	0	ブレウロシグマ	2,000
香 西	110	230	3,250	3,900	0	0	キートセロス	8,000
下 笠 居	110	250	1,975	4,525	0	0	ブレウロシグマ	2,000
直 島	190	410	3,625	5,050	0	1,450	ヘミアウルス	5,000
土 庄	10	250	2,575	3,950	0	0	ギナルディア	6,000
四 海	40	220	3,400	5,225	0	725	キートセロス	35,000
唐 櫃	90	490	2,375	3,575	0	575	キートセロス	9,000
北 浦	0	140	1,750	3,750	0	0	ベレロケア	86,000
大 部	0	440	1,575	3,275	0	1,100	ベレロケア	177,000
内 海	70	650	450	1,075	0	525	キートセロス	167,000
与 島	0	150	500	1,925	0	0	ベレロケア	6,000
丸 亀 市	10	440	2,225	5,750	0	0	キートセロス	16,000
箱 浦	20	870	1,950	4,525	0	0	キートセロス	33,000
宇 多 津	0	280	欠測	欠測	0	欠測	コシノディスカス	280

(調査結果)

i) コシノディスカス ワイレシー

庵治の330個/ℓを最高に14漁場で検出されています。

ii) ユーカンピア

全漁場で検出されていません。

iii) 珪藻優占種

キートセロス、ベレロケアが主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、10月27日(火)に予定します。

八戸養殖漁場栄養塩調査結果 第2回(令和8年10月20日)

