別表　赤かび病の発生に好適な気象条件の出現状況

令和8年（2026）

月日	アメダス高松						
	気温（℃）			平均湿度（%）	降水量（mm）	子のう胞子の飛散に好適	多発生に好適
	平均	最高	最低				
3月15日	8.8	14.5	3.3	62	0.0		
3月16日	9.9	16.0	4.0	55	0.0	－	－
3月17日	10.6	15.6	5.9	57	0.0	－	－
3月18日	9.3	12.1	5.6	79	2.0	－	－
3月19日	11.7	15.8	7.4	76	8.0	－	－
3月20日	10.5	16.9	3.8	61	0.0	－	－
3月21日	10.1	15.0	4.5	49	0.0	－	－
3月22日	9.3	14.3	3.9	73	4.5	－	－
3月23日	13.0	19.3	9.8	75	1.0	－	－
3月24日	11.8	17.0	5.7	56	0.0	－	－
3月25日	10.9	11.7	9.8	86	25.0	－	－
3月26日	13.1	17.9	9.9	77	1.5	－	－
3月27日	12.6	19.9	6.2	66	0.0	－	－
3月28日	14.5	21.9	7.6	62	0.0	－	－
3月29日	15.0	20.0	9.4	65	0.0	－	－
3月30日	16.3	23.4	10.2	71	2.0	●	－
3月31日	18.4	25.0	14.3	72	3.0	●	－
4月1日	12.6	14.3	11.4	87	14.5	－	－
4月2日	14.0	17.6	11.2	69	1.0	○	－
4月3日	14.7	21.0	8.5	67	0.0	－	－
4月4日	17.7	21.8	13.8	75	1.5	●	－
4月5日	18.3	22.3	14.7	68	0.0	●	－
4月6日	17.4	22.5	12.4	66	0.0	－	－
4月7日	13.3	16.4	9.5	62	0.5	－	－
4月8日	11.2	16.6	5.3	50	0.0	－	－
4月9日	12.1	17.0	6.8	74	4.0	－	－
4月10日	17.6	22.9	13.1	89	10.0	●	－
4月11日	19.6	24.8	15.5	55	0.0	●	－
4月12日	18.0	21.5	14.2	53	0.0	－	－
4月13日	17.2	21.9	14.0	56	0.0	－	－
4月14日	17.8	22.4	14.3	73	0.0	●	－
4月15日	16.2	17.7	15.2	93	21.0	●	－
4月16日	17.9	23.3	13.4	59	0.0	●	－
4月17日	17.2	21.4	11.9	66	0.0	●	－
4月18日	18.9	23.5	14.9	67	0.0	－	－
4月19日	18.5	21.6	16.0	70	0.0	●	－
4月20日	19.9	25.4	15.2	68	0.0	●	－
4月21日	18.1	23.1	12.4	48	0.5	●	－
4月22日	15.5	19.8	10.1	51	0.0	●	－
4月23日	13.4	15.8	11.9	93	68.0	○	－
4月24日	15.8	19.7	13.3	72	0.0	●	－
4月25日	17.0	21.8	12.4	60	0.0	●	－
4月26日	16.4	20.3	14.0	81	52.0	●	－
4月27日	18.4	23.9	14.2	78	6.0	●	－
4月28日	19.9	25.7	14.1	66	0.0	●	－
4月29日	18.6	21.0	15.3	59	0.0	●	－
4月30日	13.8	15.3	12.2	91	18.0	○	－
5月1日	16.3	20.3	14.0	73	1.5	●	－
5月2日	20.1	26.0	13.3	51	0.0	●	－
5月3日	17.5	19.5	15.8	83	9.0	●	－
5月4日	17.5	21.0	13.2	58	0.0	●	－
5月5日	15.9	22.0	9.7	55	0.0	－	－
5月6日	16.5	22.1	11.1	74	0.0	－	－
5月7日	19.7	25.5	13.0	70	0.0	－	－
5月8日	20.5	25.1	16.8	58	0.0	－	－
5月9日	18.5	23.7	13.5	42	0.0	－	－
5月10日	18.1	23.9	11.4	54	0.0	－	－
5月11日	19.6	24.9	13.3	61	0.0	－	－
5月12日	20.1	25.9	15.0	67	0.0	－	－
5月13日	22.0	27.6	17.6	59	0.0	－	－
5月14日	22.3	28.6	16.5	55	0.0	－	－
5月15日	21.3	27.1	16.4	60	0.0	－	－
5月16日	22.4	29.8	16.3	57	0.0	－	－
5月17日	23.8	31.9	16.9	42	0.0	－	－
5月18日	23.3	30.5	16.6	53	0.0	－	－
5月19日	23.2	28.9	17.5	66	0.0	－	－
5月20日	23.3	28.3	19.2	77	0.0	●	－
5月21日	23.1	26.1	20.7	92	36.0	●	◎
5月22日	22.1	25.8	19.9	70	0.0	●	－
5月23日	21.8	25.7	18.7	75	0.0	●	－
5月24日	23.4	27.8	19.6	68	0.0	●	－
5月25日	24.2	29.6	19.3	69	0.0	－	－
5月26日	24.7	30.2	19.5	67	0.0	●	－
5月27日	22.6	25.6	20.4	84	7.0	●	◎
5月28日	23.4	28.2	20.2	84	0.0	●	◎
5月29日	25.2	29.1	21.6	60	0.0	●	－
5月30日	24.1	30.9	17.0	50	0.0	－	－
5月31日	25.0	30.7	21.5	54	0.0	－	－

注1）赤かび病の多発年は出穂期以降の平均気温が18～20℃を越え、湿度も80%以上が3日以上続く場合、あるいは降雨又は濃霧頻度が高い（日照時間が少ない）場合である。また、子のう胞子の飛散が盛んになるのは、日最高気温で15℃以上、日最低気温が10℃以上で、湿度80%以上か降雨直後とされている。【農林水産省植物防疫課】

注２）上記を参考に、以下の基準によって胞子飛散や発病のしやすさの目安を表示する。

○：子のう胞子の飛散に好適：最高気温が15℃以上で最低気温が10℃以上、かつ、前日または当日に降雨あり。

●：子のう胞子の飛散がさらに好適：平均気温が15℃以上で最低気温が10℃以上、かつ、前日または当日に降雨あり。

◎：多発生に好適：平均気温が18℃以上で、前日または当日に降雨があり、平均湿度が80%以上。