

おいでまい基準田の生育状況（令和6年9月3日現在）

生育指標と比較して、概ね草丈が低く、茎数はやや少なく、葉色は同等の傾向が見られます。

地 区 (田植日)	栽植密度 (株/㎡)	基肥資材・施用量 (/10a)	穂肥① 資材・施用日・ 施用量(/10a)	穂肥② 資材・施用日・ 施用量(/10a)	総施用量 (kg/10a)			田 干 し	田 植 30 日 後 頃			出穂18日前頃		出穂期 (葉色)
					N	P	K		草丈 (cm)	茎数 (本)	葉色	草丈 (cm)	葉色	
坂出・宇多津 (6/20)	30×22cm 15.2株	スーパーブレンドLP40 20kg(側条施肥)	スーパーブレンドLP40 15kg(7/25)	—	4.9	4.9	4.9	7/21 ～7/29	49.5	24.9/株 378/㎡	36.6	71.9	36.1	8/27 (32.6)
綾 川 (6/15)	30×23cm 14.5株	おいでまい一発 30kg(側条施肥)	—	—	5.4	3.0	3.6	注2)	44.8	25.9/株 376/㎡	42.0	65.7	32.3	8/26 (33.2)
丸 亀 (6/28)	30×22cm 15.2株	おいでまい一発 44kg(手振り)	—	—	7.9	4.4	5.3	田干しは未実施。 間断湛水を継続。	41.4	31.6/株 480/㎡	32.8	61.2	31.9	8/31 (36.4)
多度津 (6/29)	30×20cm 16.7株	おいでまい一発 40kg(側条施肥)	—	—	7.2	4.0	4.8	7/24 ～7/31	39.8	35.3/株 590/㎡	35.5	65.6	32.4	8/31 (35.2)
善通寺 (6/15)	30×22cm 15.2株	タキポリン3号 40kg(側条施肥)	朝日BB488 28kg(8/5)	—	9.1	8.2	6.2	7/16 ～7/25	50.7	29.7/株 450/㎡	38.6	78.5	32.0	8/24 (34.6)
琴 平 (6/22)	30×23.5cm 14.1株	硫加燐安402 30kg(側条施肥)	硫加燐安402 15kg(8/14)	—	6.3	4.5	5.4	7/20 ～7/25	58.5	51.2/株 717/㎡	35.5	80.2	27.8	8/28 (32.7)
まんのう (6/16)	30×19cm 17.5株	プロコートSB588 40kg(手振り)	—	—	10.0	3.2	3.2	7/23 ～7/26	40.1	23.3/株 412/㎡	40.7	79.0	36.5	8/26 (30.9)
生育指標等 内陸部(6/20) 平野部(6/25) 海岸部(6/30)	株間 18～22cm	速効性肥料 (側条施肥)	速効性肥料 (出穂18日前)	速効性肥料 (出穂10日前)	7.5	—	—	(6/20植) 7/20～7/29	40	30/株	35	75	32	6/20植:8/28 6/25植:8/31 6/30植:9/2 (32)
		ツーショット (側条施肥)	ツーショット (出穂18日前)	—	6.5	—	—	(6/25植) 7/23～8/1						
		ワンショット (側条施肥)	—	—	6.0	—	—	(6/30植) 7/25～8/3						
農業試験場 作況試験 (6/20)	30×18cm 18.5株	硫加燐安402 36kg	硫加燐安402 18kg(8/9)	硫加燐安402 11kg(8/16)	9.1	6.5	7.8	7/20 ～8/5	52.5	26.9/株 497/㎡	—	—	—	8/26

注1) 葉色は葉緑素計SPADで測定

注2) 麦稈すき込みによるガス発生、スクミリンゴガイの被害により、田植後1か月間は湛水できなかった。7月12日から湛水を開始。