

(10) ポインセチア

※ポインセチアは農薬登録上、花き類・観葉植物のグループではなく、樹木類のグループに属する。

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 コナジラミ類	<p>1. 苗による持込みに注意する。</p> <p>2. ハウスの開口部に防虫ネット（1mm目合以下）をはり、成虫の飛来を軽減する。</p> <p>3. 圃場内及び周辺の雑草処理を徹底する。</p> <p>4. 被害植物や雑草は除去後に土中に埋没するか、ビニール等で密封し、半月程度放置する。</p> <p>5. 栽培休止期に施設を密封し、ハウス内温度が50℃にまで達すれば、コナジラミ類を死滅させることができる。</p> <p>6. 侵入防止対策のとれているハウスでは、黄色粘着トラップを吊るすことにより、密度を下げるができる。</p> <p>〈薬剤使用の特記事項〉</p> <p>1. アプロード水和剤はオンシツコナジラミ及びタバココナジラミ類の幼虫のみに登録がある。</p> <p>2. アドマイヤーフロアブルは施設栽培でのみ使用する。</p> <p>3. モレスタン水和剤は苞葉着色後の使用は避ける。</p>	発 生 初 期	3A 4A 15 16 21A UN	ト レ ボ ン 乳 剤 ア ド マ イ ヤ ー フ ロ ア ブ ル ノ ー モ ル ト 乳 剤 ア プ ロ ー ド 水 和 剤 サ ン マ イ ト フ ロ ア ブ ル モ レ ス タ ン 水 和 剤