

(19) プリムラ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 灰色かび病 <i>Botrytis cinerea</i>	1. 被害花弁、被害茎葉は早期に処分する。 2. 育苗は清潔な環境下で行う。 3. ハウス内で育苗する場合は、室内が過湿にならないように注意する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. サンヨールは開花前までに使用する。	発 病 初 期	1 —	ト ッ プ ジ ン M ズ ル サ ン ヨ ー ル
2 オンシツコナジラミ	1. 防虫ネット（1mm目合以下）をはり、成虫の飛び込みを軽減する。	発 生 初 期		
3 アザミウマ類	1. 防虫ネット（1mm目合以下）をはり、成虫の飛び込みを軽減する。	発 生 初 期	1B	ト ク チ オ ン 乳 剤
4 キンケクチブトゾウムシ	1. 圃場周辺の雑草樹木から隔離して栽培する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. トクチオン乳剤は成虫、ガゼット粒剤は幼虫と成虫に登録がある。	発 生 初 期	1A 1B	ガ ゼ ッ ト 粒 剤 ト ク チ オ ン 乳 剤