

(1) ば ら

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 根頭がんしゅ病 <i>Rhizobium radiobacter</i> <i>R. rhizogenes</i>	1. 無病苗を選ぶ。 2. 定植時には、根に傷をつけないよう注意する。 3. 蒸気消毒を行う。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. 消毒方法はⅢ-14. 土壌病害虫の防除の項参照。	植 付 前	-	ガ ス タ ー ド 微 粒 剤 バ ス ア ミ ド 微 粒 剤
		定 植 時 又 は 定 植 時	-	エ コ ア ー ク
2 べと病 <i>Peronospora sparsa</i>	1. 休眠期におけるせん定の際には、病梢を残さないように切除するとともに、株元に落ちた病葉を集めて処分する。 2. 施設内湿度を暖房と換気によって下げる。 3. 夕方の灌水や薬剤散布を避ける。 4. 窒素質肥料の過用を避ける。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. バラは薬害が出やすいので、すべての薬剤は高温時の散布を避ける。 2. 特に、10月上旬からの防除が大切である。	発 病 前	M3 M3	エ ム ダ イ フ ェ ー 水 和 剤 ジ マ ン ダ イ セ ン 水 和 剤
3 うどんこ病 <i>Podosphaera pannosa</i> <i>Erysiphe simulans</i> var. <i>simulans</i>	1. 耐病性品種を選ぶ。 2. 窒素質肥料の過用を避け、カリ質肥料を不足しないようにする。 3. 露地では5～6月、9～10月に発生が多い。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. サンヨールはアブラムシ類、ハダニ類にも登録がある。 2. ダコニール1000は着色期以降は使用しない。	発 病 前	1	ト ッ プ ジ ン M 水 和 剤
			3 3 3 9 19 19 - M5 M10	ル ビ ゲ ン 水 和 剤 サ プ ロ ー ル 乳 剤 サ ル バ ト ー レ M E フ ル ピ カ フ ロ ア ブ ル ポ リ オ キ シ ン A L 水 溶 剤 ポ リ オ キ シ ン A L 乳 剤 サ ン ヨ ー ル ダ コ ニ ー ル 1 0 0 0 モ レ ス タ ン 水 和 剤
4 灰色かび病 <i>Botrytis cinerea</i>	1. 施設内湿度を暖房と換気によって下げる。 2. 病花や病枝を早めに除去し、処分する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. サンヨールはアブラムシ類、ハダニ類にも登録がある。	萌 芽 前 か ら 7 日 お き	M3 M3 -	エ ム ダ イ フ ェ ー 水 和 剤 ジ マ ン ダ イ セ ン 水 和 剤 サ ン ヨ ー ル
5 黒星病 <i>Diplocarpon rosae</i>	1. 病枝を切除したり、枯葉を集めて処分する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. 予防的に散布する。 2. ダコニール1000は着色期以降は使用しない。	萌 芽 期 か ら 枝 の 伸 長 期	3 3 M5 -	サ プ ロ ー ル 乳 剤 サ ル バ ト ー レ M E ダ コ ニ ー ル 1 0 0 0 サ ン ヨ ー ル
6 アブラムシ類	1. シルバーマルチ、シルバーストライブマルチ、シルバーテープを使用する。 2. ハウス開口部に防虫ネット（1mm目合以下）をはり、成虫の飛来を軽減する。	発 生 初 期	1B 1B 1B 1B 1B 1B 3A 3A 4A 4A 4A 4A -	ス ミ チ オ ン 乳 剤 ト ク チ オ ン 乳 剤 オ ル ト ラ ン 水 和 剤 オ ル ト ラ ン 粒 剤 ジ ェ イ エ ー ス 水 溶 剤 ジ ェ イ エ ー ス 粒 剤 ア デ ィ オ ン フ ロ ア ブ ル マ プ リ ッ ク 水 和 剤 2 0 ア ド マ イ ヤ ー フ ロ ア ブ ル モ ス ビ ラ ン 顆 粒 水 溶 剤 ベ ス ト ガ ー ド 水 溶 剤 ダ ン ト ツ 水 溶 剤 オ レ ー ト 液 剤
		ハ ウ ス 内 防 除 (く ん 煙)	4A	モ ス ビ ラ ン ジ ェ ッ ト

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

ばら

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
7 ハダニ類	1. ハウス開口部にビニールによる折り返し（ダニ返し）をする。 2. 圃場内の収穫終了後の株や周辺雑草は発生源となるので、これらの処分や除草に努める。 3. 作物残さや雑草は除去後に土中に埋めるか、ビニール等で密封し、半月程度放置する。	発 生 初 期	1B 3A 6 10B -	ト ク チ オ ン 乳 剤 マ ブ リ ッ ク 水 和 剤 2 0 コ ロ マ イ ト 水 和 剤 バ ロ ッ ク フ ロ ア ブ ル ペ ン タ ッ ク 水 和 剤
		開 花 前	19	ダ ニ カ ッ ト 乳 剤 2 0
		ハ ウ ス 内 防 除 (く ん 煙)	3A	テ ル ス タ ー ジ ェ ッ ト
8 ミカンキイロアザミウマ	1. 外部から苗を購入する際には虫の有無に注意する。 2. ハウス開口部に防虫ネット（1mm目合以下）をはり、成虫の飛来を軽減する。 3. 被害植物や雑草は除去後に土中に埋めるか、ビニール等で密封し、半月程度放置する。 4. 圃場周辺の雑草処理を徹底する。 5. 侵入防止対策を実施しているハウスでは、青色粘着トラップを吊すことにより、密度を下げるができる。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. 密度が高くなると防除効果が劣るので、低密度時の散布を心がける。 2. 開花後は密度が急増するので注意する。	発 生 初 期	4A 4A 4A 15	モ ス ピ ラ ン 顆 粒 水 溶 剤 ベ ス ト ガ ー ド 水 溶 剤 ダ ン ト ツ 水 溶 剤 カ ス ケ ー ド 乳 剤

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する