

(21) ひまわり

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 苗立枯病 <i>Rhizoctonia solani</i>	1. 発病圃からの採種は避ける。 2. 前作に発生した圃場には作付を避ける。 3. 排水を図り、被害株は早めに処分する。 (薬剤使用の特記事項) 1. ユニフォーム粒剤は立枯病 (リゾクトニア菌) に登録がある。	定 植 時 期 生 育 期 発 病 初 期	11・4 M4	(混) ユニフォーム粒剤 オーソサイド水和剤 80
2 空洞病 <i>Pectobacterium carotovorum</i>	1. 排水不良畑は排水をよくする。 2. 灌水や管理作業時に植物体を傷つけないようにていねいに扱う。	発 病 初 期	M1 M1	ドイツボルドー A ボ ル ド ー
3 べと病 <i>Plasmopara halstedii</i>	1. 日射、通風をよくする。 2. 多湿条件で多発しやすいので湿度管理に注意する。	発 病 初 期	M4	オーソサイド水和剤 80
4 黒斑病 <i>Alternaria helianthi</i>	1. 排水不良畑は排水をよくする。	発 病 初 期	M4	オーソサイド水和剤 80
5 灰色かび病 <i>Botrytis cinerea</i>	1. 排水不良畑は排水をよくする。	発 病 初 期	10・1	ゲ ッ タ ー 水 和 剤
6 斑点病 <i>Cercospora pachypus</i>	1. 排水不良畑は排水をよくする。	発 病 初 期	10・1	ゲ ッ タ ー 水 和 剤