

(2) 宿根かすみそう

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 立枯病 <i>Fusarium moniliforme</i>	1. 発病株は早めに除去する。 2. 排水をよくする。 3. 無病苗を導入する。 <b>〈薬剤使用の特記事項〉</b> 1. 消毒方法はⅢ-14. 土壌病害虫の防除の項参照。	定 植 前	8B	ク ロ ー ル ピ ク リ ン
2 うどんこ病 <i>Oidium sp.</i>	1. 発病株を本圃に持ち込まない。 2. 発病株は早く除去する。 3. 採花後は残さを処分する。 4. 無病圃場の親株から採苗する。 <b>〈薬剤使用の特記事項〉</b> 1. サンヨールはハダニ類にも登録がある。	発 病 初 期	9 -	フ ル ピ カ フ ロ ア ブ ル サ ン ヨ ー ル
3 アブラムシ類	1. 圃場内やその周辺に繁茂する雑草は除去する。 2. シルバーマルチ、シルバーストライプマルチ、シルバーテープを使用する。 3. ハウス開口部に防虫ネット（1mm目合以下）をはり、成虫の飛来を軽減する。	発 生 初 期	4A	モ ス ピ ラ ン 顆 粒 水 溶 剤
4 ヨトウムシ	1. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。 2. 防虫ネット（4mm目合以下）で被覆し、成虫の飛来、産卵を防止する。	若 齢 幼 虫 期	3A 3A 3A	ア デ ィ オ ン フ ロ ア ブ ル ス カ ウ ト フ ロ ア ブ ル ト レ ボ ン 乳 剤
5 シロイチモジヨトウ	1. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。 2. 防虫ネット（4mm目合以下）で被覆し、成虫の飛来、産卵を防止する。	若 齢 幼 虫 期	3A 3A 15 15	ト レ ボ ン 乳 剤 ト レ ボ ン E W カ ス ケ ー ド 乳 剤 ア タ ブ ロ ン 乳 剤
6 ハダニ類	1. ハウス開口部にビニールによる折り返し（ダニ返し）をする。 2. 圃場内の収穫終了後の株や周辺雑草は発生源となるので、これらの処分や除草に努める。 3. 作物残さや雑草は除去後に土中に埋めるか、ビニール等で密封し、半月程度放置する。			