

# (6) トルコギキョウ

| 防除法<br>病害虫名                                                             | 防除のポイント                                                                                                                                                                                                                                     | 薬 剤 防 除         |                                        |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             | 防除時期            | RACコード                                 | 薬 剤                                                                                    |
| 1 灰色かび病<br><i>Botrytis cinerea</i>                                      | 1. 被害葉は早く除去する。<br>2. 施設栽培では換気をよくし、加湿にならないようにする。                                                                                                                                                                                             | 発 病 初 期         | 9<br>ー<br>19<br>10・1                   | フルピカフロアブル<br>サンヨール<br>ポリオキシンAL水溶剤<br>(混)ゲッター水和剤                                        |
| 2 炭疽病<br><i>Colletotrichum fioriniae</i><br><i>Glomerella cingulata</i> | 1. 発病部位、発病株を取り除き、圃場外へ持ち出して処分する。<br>2. 栽植密度を適正にし、通風をよくして施設内の換気を十分に図る。                                                                                                                                                                        | 発 病 初 期         | M3                                     | ジマンダイセン水和剤                                                                             |
| 3 立枯病<br><i>Fusarium oxysporum</i><br><i>Fusarium sp.</i>               | 1. 連作を避ける。<br>2. 高うねにし、排水を良好にする。<br>3. 病株は早期に処分する。<br>4. 太陽熱消毒をする。                                                                                                                                                                          | 定 植 前 日         | 1                                      | ベンレート水和剤                                                                               |
| 4 アブラムシ類<br>(モザイク病<br>BBWV-2<br>BYMV<br>YoMV)                           | 1. 施設内やその周辺の雑草は発生源となるので除去する。<br>2. シルバーマルチ、シルバーストライプマルチ、シルバーテープを使用する。<br>3. ハウス開口部に防虫ネット(1mm目合以下)をはり、成虫の飛来を軽減する。                                                                                                                            | ハウス内防除<br>(くん煙) | 4A                                     | モスピランジェット                                                                              |
| 5 アザミウマ類<br>(ネギアザミウマ)<br>(えそ輪紋病<br>IYSV<br>LNRV)                        | 1. ハウス開口部に防虫ネット(1mm目合以下)をはり、成虫の飛来を軽減する。<br>2. 被害植物や雑草は除去後、土中に埋めるか、ビニール等で密封し、半月程度放置する。<br>3. 周辺雑草及びハウス内の雑草処理を徹底する。<br>4. 侵入防止対策のとれているハウスでは、青色粘着トラップを吊るすことにより、密度を下げるができる。<br><b>〈薬剤使用の特記事項〉</b><br>1. アデイオンフロアブル、テルスターフロアブルはヒラズハナアザミウマに登録がある。 | 発 生 初 期         | 1B<br>1B<br>1B<br>3A<br>3A<br>3A<br>3A | オルトラン粒剤<br>ジェイエース粒剤<br>オルトラン水和剤<br>アデイオンフロアブル<br>スカウトフロアブル<br>テルスターフロアブル<br>マブリック水和剤20 |
| 6 ミカンキイロアザミウマ                                                           | 1. 外部から苗を購入する際には虫の有無に注意する。<br>2. ハウスの開口部に防虫ネット(1mm目合以下)をはり、成虫の飛来を防止する。<br>3. 被害植物や雑草は除去後に土中に埋めるか、ビニール等で密封し、半月程度放置する。<br>4. 圃場周辺の雑草処理を徹底する。<br>5. 侵入防止対策を実施しているハウスでは、青色粘着トラップを吊るすことにより、密度を下げるができる。<br>6. 余分な花は開花前に摘み取る。                      | 発 生 初 期         | 4A<br>13                               | モスピランジェット<br>コテツフロアブル                                                                  |
| 7 ハスモンヨトウ                                                               | 1. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。<br>2. ハウス開口部を防虫ネット(4mm目合以下)で被覆すれば、飛来、産卵を防止できる。<br>3. 圃場周辺の雑草を除去しておく。                                                                                                                                                  | 発 生 初 期         | 3A                                     | トレボン乳剤                                                                                 |
| 8 シロイチモジヨトウ                                                             | 1. 幼虫は見つけしだい捕殺する。<br>2. ハウス開口部を防虫ネット(4mm目合以下)で被覆すれば、飛来、産卵を防止できる。<br>3. 圃場周辺の雑草を除去しておく。                                                                                                                                                      | 発 生 初 期         | 18                                     | ロムダンフロアブル                                                                              |
| 9 ハダニ類                                                                  | 1. 圃場内や周辺の雑草は作付け前に除草しておく。<br>2. 収穫残さは速やかに処分する。                                                                                                                                                                                              | 発 生 初 期         | 21A<br>21A                             | ダニトロンフロアブル<br>ピラニカEW                                                                   |

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する