

(7) ゆり

| 防除法 病害虫名 | 防除のポイント | 薬 剤 防 除 | | |
|---|---|---------|--|---|
| | | 防除時期 | RACコード | 薬 剤 |
| 1 苗立枯病 | 1. 圃場の排水を良好にする。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. 土壌消毒方法はⅢ-14. 土壌病害虫の防除の項参照。 2. ガスタード微粒剤、バスアミド微粒剤は苗立枯病（リゾクトニア菌）に登録がある。 | 土 壌 消 毒 | — — | ガ ス タ ー ド 微 粒 剤 バ ス ア ミ ド 微 粒 剤 |
| 2 葉枯病 <i>Botrytis elliptica</i> <i>Pestalotiopsis</i> sp. | 1. 病葉は早期に摘み取り、処分する。 2. 施設栽培では換気をよくし、加湿にならないようにする。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. ダコニールは着色期以降は使用しない。 | 発 病 初 期 | 1 9 19 29 M1 M5 | ト ッ プ ジ ン M 水 和 剤 フ ル ピ カ フ ロ ア ブ ル ポ リ オ キ シ ン A L 水 溶 剤 フ ロ ン サ イ ド 水 和 剤 I C ボ ル ド ー 6 6 D ダ コ ニ ー ル 1 0 0 0 |
| 3 鱗茎さび症 | 1. 健全な種球を使用する。 | 植 付 前 | 29 | フ ロ ン サ イ ド 水 和 剤 |
| 4 軟腐病 <i>Pectobacterium carotovorum</i> | 1. 圃場の排水を良好にする。 | 発 病 初 期 | 24・M1 24・M1 | (混) カ ス ミ ン ボ ル ド ー (混) カ ッ パ ー シ ン 水 和 剤 |
| 5 アブラムシ類 (ウイルス病 CMV LMOV など) | 1. 病株は早期に抜き取り、処分する。 2. 繁殖用の種球は無病株から取る。 3. シルバーマルチ、シルバーストライプマルチ、シルバーテープを使用する。 | 発 生 初 期 | 1B 1B 1B 1B 3A 4A 4A | オ ル ト ラ ン 粒 剤 オ ル ト ラ ン 水 和 剤 ジ ェ イ エ ー ス 粒 剤 ジ ェ イ エ ー ス 水 溶 剤 ト レ ボ ン 乳 剤 ア ド マ イ ヤ ー 1 粒 剤 ア ド マ イ ヤ ー フ ロ ア ブ ル |
| 6 ネダニ | 1. 健全な種球を使用する。 2. 酸性土壌を矯正する。 3. 排水をよくする。 4. 未熟堆肥は発生を多くするので、完熟堆肥を使用する。 5. 種球が堆肥にふれないようにする。 | 定 植 時 | 1B | ジ メ ト エ ー ト 粒 剤 |