

(1) あずき

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 さび病 <i>Uromyces phaseoli</i> var. <i>azukicola</i>	1. 連作を避ける。 2. 被害茎葉は集めて土中深く埋める。	発 生 初 期	M3	ジ マ ン ダ イ セ ン 水 和 剤
2 灰色かび病 <i>Botrytis cinerea</i>	1. 被害茎葉は集めて土中深く埋める。 (薬剤使用の特記事項) 1. ゲッター水とファンタジスタ顆粒水和剤は、菌核病と炭疽病にも登録がある。	発 病 前 か ら	10・1	(混) ゲ ッ タ ー 水 和 剤
		発 生 初 期	11	フ ァ ン タ ジ ス タ 顆 粒 水 和 剤
3 フキノメイガ (アズキノメイガ)	1. 被害茎を早めに抜き取る。 2. 冬期に被害茎を集めて圃場に持ち出し、処分する。 3. 圃場周辺の雑草処理を徹底する。 (薬剤使用の特記事項) 1. フキノメイガの成虫は6月中下旬、7月下旬～8月上旬、8月下旬の3回発生する。 2. スミチオン、トレボンはカメムシ類にも登録がある。 3. トレボンはハスモンヨトウにも登録がある。 4. アグロスリンとトレボンはノメイガ類で登録がある。	成虫発生最盛期	1B 1B 1B 1B 3A 3A 3A 3A 3A	サ イ ア ノ ッ ク ス 乳 剤 ス ミ チ オ ン 乳 剤 エ ル サ ン 乳 剤 ト ク チ オ ン 乳 剤 ア デ イ オ ン 乳 剤 ア グ ロ ス リ ン 乳 剤 ト レ ボ ン 乳 剤 ト レ ボ ン 粉 剤 D L
4 アブラムシ類 (モザイク病) AMV CMV BCMV BYMV	1. 無病種子を用いる。 2. シルバーテープをはる。 (薬剤使用の特記事項) 1. AMV、CMV、BCMV、BYMVは虫媒伝染する。	発 生 初 期	1B 1B 1B 1B 3A 3A 3A 3A 4A	ス ミ チ オ ン 乳 剤 マ ラ ソ ン 乳 剤 マ ラ ソ ン 粉 剤 3 エ ル サ ン 乳 剤 ア デ イ オ ン 乳 剤 ア グ ロ ス リ ン 乳 剤 ト レ ボ ン 乳 剤 ダ ン ト ツ 水 溶 剤
5 ハダニ類	1. 発生源になる周辺雑草や作物残さ等を除去する。	発 生 初 期	6 10A 13 21A 21A 21A	コ ロ マ イ ト 乳 剤 ニ ッ ソ ラ ン 水 和 剤 コ テ ツ フ ロ ア ブ ル ダ ニ ト ロ ン フ ロ ア ブ ル ピ ラ ニ カ E W サ ン マ イ ト フ ロ ア ブ ル
6 タネバエ	1. 有機物の多用を避ける。 2. 早播きを避ける。 3. 排水を良好にする。	播 種 時	1B	カ ル ホ ス 粉 剤
7 ネキリムシ類	1. 圃場内や周辺雑草を除去する。 2. 株に被害があったときは、株元の土を浅く掘り起こして幼虫を捕殺する。	播 種 時	1B	カ ル ホ ス 粉 剤

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する