

(1) う め

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 縮葉病 <i>Taphrina mume</i>	1. 早期に罹病葉を摘み取り、土中に埋める。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. 縮葉病対象に石灰硫黄合剤を12月上中旬に散布した園地では、黒星病の発生が少なくなる。	発 芽 前	—	石 灰 硫 黄 合 剤
2 黒星病 <i>Cladosporium carpophilum</i>	1. 罹病した枝をせん定時に切り取り、処分する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. 水和硫黄剤（イオウフロアブル、クムラス、コロナフロアブル、サルファーズル）は28℃以上の高温時には使用しない。 2. ストロビードライフロアブルはうどんこ病にも登録がある。 3. フロンサイドSCの注意事項 ・ 散布後7日以内の入園はしない。 ・ 発芽期までの使用とする。	4 月中下旬 5 月上中旬 5月下旬 ～6月中旬	1 1 3 3 3 3 3 11 29 M2 M2 M2 M3 M4 M7 M9 11・7	ト ッ プ ジ ン M 水 和 剤 ベ ン レ ー ト 水 和 剤 オ ー シ ャ イ ン 水 和 剤 オ ー シ ャ イ ン フ ロ ア ブ ル オ ン リ ー ワ ン フ ロ ア ブ ル ス コ ア 顆 粒 水 和 剤 マ ネ ー ジ D F ス ト ロ ビ ー ド ラ イ フ ロ ア ブ ル フ ロ ン サ イ ド S C イ オ ウ フ ロ ア ブ ル ク ム ラ ス コ ロ ナ フ ロ ア ブ ル サ ル フ ザ ー ズ ル ペ ン コ ゼ ブ フ ロ ア ブ ル オ ー ソ サ イ ド 水 和 剤 8 0 ベ ル ク ー ト 水 和 剤 デ ラ ン フ ロ ア ブ ル (混) ナ リ ア W D G
3 灰星病 <i>Monilinia fructicola</i> <i>M. laxa</i> <i>M. mumeicola</i>	1. ももの灰星病に準じる。	開 花 初 め	1 3 3 3 M7	ト ッ プ ジ ン M 水 和 剤 オ ー シ ャ イ ン 水 和 剤 オ ー シ ャ イ ン フ ロ ア ブ ル オ ン リ ー ワ ン フ ロ ア ブ ル ベ ル ク ー ト 水 和 剤
4 環紋葉枯病 <i>Grovesinia pruni</i>	1. 園内の通風をよくする。	収 穫 後 (7 ～ 8 月)	1 11 M7	ト ッ プ ジ ン M 水 和 剤 ス ト ロ ビ ー ド ラ イ フ ロ ア ブ ル ベ ル ク ー ト 水 和 剤
5 灰色かび病 <i>Botrytis cinerea</i>	〈薬剤使用の特記事項〉 1. ストロビードライフロアブルはうどんこ病にも登録がある。	落 弁 期	3 11 M7 3・11	オ ー シ ャ イ ン 水 和 剤 ス ト ロ ビ ー ド ラ イ フ ロ ア ブ ル ベ ル ク ー ト 水 和 剤 (混) ナ テ ィ ー ボ フ ロ ア ブ ル
6 葉炭疽病 (炭疽病) <i>Glomerella cingulata</i> <i>Colletotrichum fioriniae</i>	〈薬剤使用の特記事項〉 1. トップジンM水和剤は葉炭疽病で登録がある。	収 穫 後 (7 ～ 8 月)	1	ト ッ プ ジ ン M 水 和 剤
7 かいよう病 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> <i>Erwinia</i> sp.	1. 過剰施肥や肥料不足は発病を助長するので、適正な肥培管理をする。 2. 防風対策をする。 3. 罹病した枝はせん定時に除去し、処分する。	発 芽 前 (休 眠 前)	M1 M1 M1	I C ボ ル ド ー 6 6 D Z ボ ル ド ー ム ッ シ ュ ボ ル ド ー D F
		4 ～ 5 月	24 25 25 31 41・25	カ ス ミ ン 液 剤 ア グ レ プ ト 水 和 剤 マ イ シ ン 2 0 水 和 剤 ス タ ー ナ 水 和 剤 (混) ア グ リ マ イ シ ン ー 1 0 0
8 すず斑病 <i>Peltaster</i> sp.	1. 園内の通風、排水を良好にする。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. ストロビードライフロアブルはうどんこ病にも登録がある。	5月中旬 ～6月上旬	1 3 3 3 3 3 11 M3 M4 M7 M9	ベ ン レ ー ト 水 和 剤 オ ー シ ャ イ ン 水 和 剤 オ ー シ ャ イ ン フ ロ ア ブ ル オ ン リ ー ワ ン フ ロ ア ブ ル ス コ ア 顆 粒 水 和 剤 ス ト ロ ビ ー ド ラ イ フ ロ ア ブ ル ペ ン コ ゼ ブ フ ロ ア ブ ル オ ー ソ サ イ ド 水 和 剤 8 0 ベ ル ク ー ト 水 和 剤 デ ラ ン フ ロ ア ブ ル

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
9 白紋羽病 <i>Rosellinia necatrix</i>	1. 作物がない場合、禾本科の作物を3～4年栽培し、石灰などを施して有機物の分解を促進させる。 2. 前作物の罹病根は集めて処分する。 3. 小面積の場合は、焼土法を行うのもよい。 4. 栽植に当たっては、発病のおそれがあるところでは植穴に粗大有機物などを埋めな 〈薬剤使用の特記事項〉 1. フロンサイドSCは休眠期に使用してもよいが、使用回数に注意する。 2. フジワンは樹幹部周辺の土壌を木の大きさに応じて掘りあげて根を露出させ、病患部を削りとり、更に腐敗根を取り除いて薬剤を罹病根部に適量塗り付け、残りの薬剤を掘りあげた土壌に混和しながら埋め戻す。 3. フジワンを重症樹に対しては、所定範囲内の多めの薬量を処理し、結果させないよう配慮する。	休 眠 期	29	フ ロ ン サ イ ド S C
		病 樹 の 治 療	6	フ ジ ワ ン 粒 剤
10 切り口及び傷口のゆ 合促進		せん定整枝時、 病患部削り取り 直後及び病枝切 除後	1	ト ッ プ ジ ン M ペ ー ス ト
11 ウメシロカイガラム シ	1. 冬期に、ワラ、ブラシなどでカイガラムシをすり落とす。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. アプロードは、定着直後の幼虫に散布する。	1 2 月	UNM	ス プ レ ー オ イ ル
		9 月 上 旬	4C 16	ト ラ ン ス フ ォ ー ム フ ロ ア ブ ル ア プ ロ ード フ ロ ア ブ ル
		収 穫 後	16	ア プ ロ ード 水 和 剤
12 アブラムシ類	1. 下草、周辺雑草を処分する。	3月下旬 ～4月下旬	1A 3A 3A 3A 3A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4C 29	オ リ オ ン 水 和 剤 4 0 ア デ ィ オ ン 水 和 剤 ア グ ロ ス リ ン 水 和 剤 ス カ ウ ト フ ロ ア ブ ル ロ デ ィ ー 水 和 剤 ア ド マ イ ヤ ー 水 和 剤 ア ド マ イ ヤ ー 顆 粒 水 和 剤 モ ス ピ ラ ン 顆 粒 水 溶 剤 バ リ ア ード 顆 粒 水 和 剤 ダ ン ト ツ 水 溶 剤 ア ル バ リ ン 顆 粒 水 溶 剤 ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤 ト ラ ン ス フ ォ ー ム フ ロ ア ブ ル ウ ラ ラ D F
13 ハダニ類	1. 下草、周辺雑草を処分する。 2. コテツフロアブルは、オウトウハダニでの登録である。	発 生 期	10A 13 20D 23 25A 33	ニ ッ ソ ラ ン 水 和 剤 コ テ ツ フ ロ ア ブ ル マ イ ト コ ー ネ フ ロ ア ブ ル ダ ニ ゲ ッ タ ー フ ロ ア ブ ル ダ ニ サ ラ バ フ ロ ア ブ ル ダ ニ オ ー テ フ ロ ア ブ ル
14 コスカシバ	1. 秋期に虫糞の出ているところを小槌でたたき、若齢幼虫を圧殺する。 2. 4月に加害部分を小刀で削り、幼虫を捕殺する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. ガットキラー乳剤、ラビキラー乳剤は樹幹部及び主枝に散布する。あらかじめ、虫糞、粗皮等を取り除いてから散布すると効果的である。	発 芽 前	1B 1B・1B	ガ ッ ト キ ラ ー 乳 剤 (混) ラ ビ キ ラ ー 乳 剤
15 ケムシ類 オビカレハ (ウメケムシ)	1. せん定時に卵がついている枝を切り取る。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. マブリックEWは、オビカレハにのみ登録がある。	4 月 上 旬 4 月 下 旬 ～5月上旬	3A 3A 11A 11A 11A	マ ブ リ ッ ク E W ロ デ ィ ー 水 和 剤 デ ル フ ィ ン 顆 粒 水 和 剤 エ ス マ ル ク D F フ ァ イ ブ ス タ ー 顆 粒 水 和 剤

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する