

(6) ブルーベリー

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 灰色かび病 <i>Botrytis cinerea</i>	1. 落花後果実に付着した花弁はできるだけ除去する。 2. 圃地の排水を図る。 3. 枝が過繁茂にならないような適正な施肥をこころがける。	開 花 期	11 M4 NC	ストロビードライフロアブル オーソサイド水和剤 80 カリグリーン
2 斑点病 <i>Pestalotiopsis</i> sp.	1. 樹勢を強くし、日当りや通風を良好にする。 2. 病葉を集めて処分する。	発 病 前 か ら	1 11 M4 M4・M1	ベンレート水和剤 ストロビードライフロアブル オーソサイド水和剤 80 (混)オキシラン水和剤
3 すず点病 <i>Zygophiala jamaicensis</i>		発 病 前 か ら	M4	オーソサイド水和剤 80
4 白紋羽病 <i>Rosellinia necatrix</i>	1. 前作物の罹病根は集めて処分する。 2. 小面積の場合は、焼土法を行うのもよい。 3. 栽植に当たっては、発病のおそれがあるところは植穴に粗大有機物などの埋没をしない。	作物が被害を受けた場合	29	フロンサイドSC
5 切り口及び傷口のゆ 合促進		せん定整枝時、 病患部削り取り 直後及び病枝切 除後	1	トップジンMペースト
6 アブラムシ類		発 生 初 期	4A -	ダントツ水溶剤 オレート液剤
7 オウトウショウジョウ バエ	<b>〈薬剤使用の特記事項〉</b> 1. 本種を対象に防除している園地では、ケムシ類、イラガ類の発生が少なくなる。	完 熟 直 前 か ら	3A 3A 4A 4A 5	スカウトフロアブル アディオフロアブル モスピラン顆粒水溶剤 ダントツ水溶剤 ディアナWDG
8 カイガラムシ類	1. 冬期に、ワラ、ブラシなどでカイガラムシをすり落とす。			
9 イラガ類	1. 冬期に繭を除去する。	発 生 初 期	11A	デルフィン顆粒水和剤
10 ケムシ類	<b>〈薬剤使用の特記事項〉</b> 1. サイアノックスはドクガとマイマイガで登録がある。	発 生 初 期	1B 11A 11A 11A	サイアノックス水和剤 デルフィン顆粒水和剤 エスマルクDF ファイブスター顆粒水和剤
11 ハマキムシ類	1. 新梢を糸で束ねて食害するので、見つけ次第除去する。	発 生 初 期	5	ディアナWDG

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する