

(21) オクラ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 立枯病 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>vasinfectum</i>	1. 連作を避け、無病地を選ぶ。			
2 苗立枯病 <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Pythium ultimum</i> var. <i>ultimum</i> <i>Pythium</i> sp.	1. 連作を避け、無病地を選ぶ。 2. 多湿にならないように換気や排水を良好にする。 3. 未分解有機物は施用しない。 〈薬剤使用の特記事項〉 ●は種時及び子葉展開時 1. リゾレックス水和剤は、リゾクトニア属菌による苗立枯病にのみ登録がある。 ●は種時～発芽初期 1. タチガレン液剤は、ピシウム属菌による苗立枯病にのみ登録がある。 2. タチガレン液剤は、希釈液を乾燥した土壌に灌注すると薬害(生育抑制)を生じるおそれがあるので、播種前に十分な灌水を行う。 3. タチガレン液剤は、播種直後に灌注すると薬害が発生する場合がありますので注意が必要である。	播 種 前	11・4	ユ ニ フ ォ ー ム 粒 剤
		播 種 時 及 び 子 葉 展 開 時	14	リ ゾ レ ッ ク ス 水 和 剤
		播 種 後 か ら 2 ～ 3 葉 期 まで	M4	オ ー ソ サ イ ド 水 和 剤 8 0
		播 種 時 ～ 発 芽 初 期	32	タ チ ガ レ ン 液 剤
3 疫病 <i>Phytophthora nicotianae</i>	1. 圃場の排水を良好にする。 2. マルチ栽培を行う。 3. 連作を避ける。 4. 発病株は速やかに抜き取り、処分する。 5. 土面接触果は発病しやすいので切り取る。 6. センチュウ類の発生は本病の多発をまねくので、植え付け前に防除を行う。	発 生 初 期	11・4	ユ ニ フ ォ ー ム 粒 剤
4 黒斑病 (果実黒斑病) <i>Alternaria alternata</i>	1. 多湿にならないように換気や排水を良好にする。 2. 老葉は早めに取り除く。	発 病 前 か ら	2 3	ロ ブ ラ ー ル 水 和 剤 ト リ フ ミ ン 水 和 剤
5 葉すす病 <i>Pseudocercospora abelmoschi</i>	1. 多湿にならないように換気や排水を良好にする。 2. 適切な摘葉を行なって草勢の維持に努める。 3. 摘葉した葉は放置せず、圃場外に持ち出して処分する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. 本病対象に防除を実施しているところでは、黒斑病、褐斑病の発生が少ない。	発 生 初 期	1 1 3 11	ト ッ プ ジ ン M 水 和 剤 ベ ン レ ー ト 水 和 剤 ト リ フ ミ ン 水 和 剤 フ ァ ン タ ジ ス タ 顆 粒 水 和 剤
6 灰色かび病 <i>Botrytis cinerea</i>	1. 収穫残さを処分する。 2. マルチを行う。	発 生 初 期	2 7 11	ロ ブ ラ ー ル 水 和 剤 ア フ ェ ッ ト フ ロ ア ブ ル フ ァ ン タ ジ ス タ 顆 粒 水 和 剤
7 うどんこ病 <i>Leveillula taurica</i>	1. 下位の老葉や発病葉は速やかに除去する。 2. 日照、通風をよくする。 3. 草勢を維持し、適切な施肥管理を行う。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. モレスタン水和剤はハダニ類にも登録がある。	発 生 初 期	3 7 11 M10	ト リ フ ミ ン 水 和 剤 ア フ ェ ッ ト フ ロ ア ブ ル ア ミ ス タ ー 2 0 フ ロ ア ブ ル モ レ ス タ ン 水 和 剤
8 葉枯細菌病 <i>Pseudomonas cichorii</i> <i>P. syringae</i> <i>P. viridiflava</i>	1. 多湿にならないように換気や排水を良好にする。	発 生 初 期	24・M1 24・M1	(混)カスミンボルドー (混)銅パーシン水和剤
9 ハスモンヨトウ	1. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。 2. 施設栽培では飛び込み軽減のため、開口部を防虫ネット(4mm目合以下)で被覆する。	若 齢 幼 虫 期	3A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 13 15 18 28 28 30 UN	ア デ イ オ ン 乳 剤 バ シ レ ッ ク ス 水 和 剤 ゼ ン タ ー リ 顆 粒 水 和 剤 デ ル フ ィ ン 顆 粒 水 和 剤 フ ロ ー バ ッ ク D F エ コ マ ス タ ー B T サ ブ リ ナ フ ロ ア ブ ル コ テ ツ フ ロ ア ブ ル ア タ ブ ロ ン 乳 剤 マ ト リ ッ ク フ ロ ア ブ ル プ レ バ ソ ン フ ロ ア ブ ル 5 フ ェ ニ ッ ク ス 顆 粒 水 和 剤 グ レ ー シ ア 乳 剤 プ レ オ フ ロ ア ブ ル

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

オクラ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
10 オオタバコガ	1. 施設栽培では飛び込み軽減のため、開口部を防虫ネット（4mm目合以下）で被覆する。	若 齢 幼 虫 期	6 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 13 15 28 30 UN	ア フ ァ ー ム 乳 剤 ト ア ロ ー フ ロ ア ブ ル C T ゼ ン タ ー リ 顆 粒 水 和 剤 デ ル フ ィ ン 顆 粒 水 和 剤 エ ス マ ル ク D F フ ロ ー バ ッ ク D F エ コ マ ス タ ー B T チ ュ ー ン ア ッ プ 顆 粒 水 和 剤 サ ブ リ ナ フ ロ ア ブ ル ジ ャ ッ ク ポ ッ ト 顆 粒 水 和 剤 コ テ ツ フ ロ ア ブ ル ア タ ブ ロ ン 乳 剤 プ レ バ ソ ン フ ロ ア ブ ル 5 グ レ ー シ ア 乳 剤 プ レ オ フ ロ ア ブ ル
11 アブラムシ類	1. 周辺雑草を防除する。 2. 圃場周辺にシルバーテープをはる。 3. シルバーマルチをする。 4. 施設栽培では飛び込み軽減のため、開口部を防虫ネット（1mm目合以下）で被覆する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. アドマイヤーフロアブルは施設栽培のみの登録である。 2. アドマイヤーフロアブルはアザミウマ類にも登録がある。	発 生 初 期	1B 1B 1B 3A 3A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 9B 29	オ ル ト ラ ン 水 和 剤 オ ル ト ラ ン 粒 剤 ジ ェ イ エ ー ス 水 溶 剤 ア デ イ オ ン 乳 剤 ト レ ボ ン 乳 剤 ア ド マ イ ヤ ー フ ロ ア ブ ル モ ス ピ ラ ン 顆 粒 水 溶 剤 ダ ン ト ツ 水 溶 剤 ア ル バ リ ン 顆 粒 水 溶 剤 ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤 ス タ ー ク ル 粒 剤 ア ル バ リ ン 粒 剤 コ ル ト 顆 粒 水 和 剤 ウ ラ ラ D F
12 コナジラミ類	1. 圃場内や周辺雑草を防除する。	発 生 初 期	9B	コ ル ト 顆 粒 水 和 剤
13 カメムシ類	1. 圃場内や周辺雑草を防除する。	発 生 初 期	3A 3A	ア デ イ オ ン 乳 剤 ト レ ボ ン 乳 剤
14 ネコブセンチュウ	1. 水田に転換可能な畑では、2～3年に1回の割合で水田に戻す。 2. 苗からの持ち込みを防止するため、センチュウ類や病害のおそれのない用土で育苗する。	播 種 前	1B	ネ マ ト リ ン エ ー ス 粒 剤
15 ネキリムシ類	1. 圃場内や周辺雑草を防除する。	播 種 時 ～ 生 育 初 期	3A	ガ ー ド ベ イ ト A