

(7) キャベツ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 株腐病 <i>Thanatephorus cucumeris</i>	1. 床土は排水のよい無病のもの使う。 2. 苗床の温度変化に注意し、急激な温度変化を避ける。 3. 換気をよくし、床内を乾かす。 4. 被害葉を除去し、処分する。	定 植 前	29	フ ロ ン サ イ ド S C
		発 生 初 期	1	ト ッ プ ジ ン M 水 和 剤
			2	ロ ブ ラ ー ル 水 和 剤
			7	モ ン カ ッ ト フ ロ ア ブ ル 4 0
			7	ア フ ェ ッ ト フ ロ ア ブ ル
			7	カ ン タ ス ド ラ イ フ ロ ア ブ ル
			7	パ レ ー ド 2 0 フ ロ ア ブ ル
			7	ネ ク ス タ ー フ ロ ア ブ ル
			7	カ ナ メ フ ロ ア ブ ル
			11	ア ミ ス タ ー 2 0 フ ロ ア ブ ル
			11	フ ァ ン タ ジ ス タ 顆 粒 水 和 剤
			12	セ イ ビ ア ー フ ロ ア ブ ル 2 0
			14	リ ゾ レ ッ ク ス 水 和 剤
			7・M5	(混) ベ ジ セ イ バ ー
2 萎黄病 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	1. 抵抗性品種を導入する。 2. 連作を避ける。 3. 発病株は早期に処分する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. 消毒方法はⅢ-14. 土壌病害虫の防除の項参照。	定 植 前	-	ガ ス タ ー ド 微 粒 剤
			-	バ ス ア ミ ド 微 粒 剤
3 黒腐病 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>	1. 連作すると多発するので、アブラナ科以外の作物と最低2年輪作する。 2. 発病株を除去し、収穫後の残茎葉は集めて土中に埋める。 3. 排水を良好にする。 4. 病原細菌は害虫(キスジノミハムシ、ヨトウムシ類等)の加害傷口から侵入するので、害虫を防除する。 〈薬剤使用の特記事項〉 ●初発から3~4回 1. 苗床では初発から2~3回散布する。 2. ベジキパー水和剤、マスターピース水和剤は夏場は冷蔵庫保存(10℃以下)する。	定 植 時	P2	オ リ ゼ メ ー ト 粒 剤
		初 発 か ら 3 ~ 4 回	25	ア グ レ プ ト 水 和 剤
			U18	バ リ ダ シ ン 液 剤 5
			M1	コ サ イ ド 3 0 0 0
			M1	ド イ ツ ボ ル ド ー A
			M1	Z ボ ル ド ー
			M1	ク プ ロ シ ー ル ド
			M1	オ キ シ ン ド ー 水 和 剤 8 0
			M1	キ ノ ン ド ー 水 和 剤 4 0
			M1	キ ノ ン ド ー フ ロ ア ブ ル
			M1	キ ノ ン ド ー 顆 粒 水 和 剤
			M1	ド キ リ ン フ ロ ア ブ ル
			M1	ヨ ネ ポ ン 水 和 剤
			24・M1	(混) カ ス ミ ン ボ ル ド ー
			24・M1	(混) カ ッ パ ー シ ン 水 和 剤
			31・24	(混) カ セ ッ ト 水 和 剤
			40・M1	(混) フ ェ ス テ ィ バ ル C 水 和 剤
- (生)	(生) ベ ジ キ ー パ ー 水 和 剤			
- (生)	(生) マ ス タ ピ ー ス 水 和 剤			
4 菌核病 <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	1. 発病株は早期に発見し、菌核ができる前に抜き取って圃場外で処分する。 2. 夏期に湛水可能な圃地は高温時に20日以上湛水すると菌核が死滅するので、有効である。	播 種 ま た は 定 植 前	29	フ ロ ン サ イ ド S C
		発 病 前 か ら	1	ト ッ プ ジ ン M 水 和 剤
			1	ベ ン レ ー ト 水 和 剤
			2	ロ ブ ラ ー ル 水 和 剤
			2	ス ミ レ ッ ク ス 水 和 剤
			3	オ ン リ ー ワ ン フ ロ ア ブ ル
			7	カ ン タ ス ド ラ イ フ ロ ア ブ ル
			7	ア フ ェ ッ ト フ ロ ア ブ ル
			7	パ レ ー ド 2 0 フ ロ ア ブ ル
			7	オ ル フ ィ ン フ ロ ア ブ ル
			7	ネ ク ス タ ー フ ロ ア ブ ル
			7	カ ナ メ フ ロ ア ブ ル
			11	ア ミ ス タ ー 2 0 フ ロ ア ブ ル
			12	セ イ ビ ア ー フ ロ ア ブ ル 2 0
10・1	(混) ニ マ イ バ ー 水 和 剤			
1・M5	(混) ダ コ レ ー ト 水 和 剤			
11・7	(混) シ グ ナ ム W D G			
7・M5	(混) ベ ジ セ イ バ ー			

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する

キャベツ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
5 ベと病 <i>Hyaloperonospora brassicae</i>	1. 窒素質肥料の過用や肥料不足を起こさないよう、適正施用をする。 2. リン酸が少なく、カリの多い畑に発病が多い。 3. 排水を良好にする。 4. 発病株は早期に処分する。 5. 収穫後の病茎葉は集めて土中に埋める。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. シトラーノフロアブルは黒腐病にも登録がある。	初発から3～4回	21 21 M1 M3 M3 M3 M5 M3・4 4・M5 11・7 7・M5 40・M3 40・M5 45・40 M1・M5	ライメイフロアブル ランマンフロアブル ヨネボン水和剤 ジマンダイセン水和剤 ペンコゼブ水和剤 ペンコゼブフロアブル ダコニール1000 (混)リドミルゴールドMZ (混)フォリオゴールド (混)シグナムWDG (混)ベジセイバー (混)カンパネラ水和剤 (混)プロポーズ顆粒水和剤 (混)ザンプロDMフロアブル (混)シトラーノフロアブル
		発生前～発生初期	49・40	(混)オロンディスウルトラSC
6 軟腐病 <i>Pectobacterium carotovorum</i>	1. 抵抗性品種を用いる。 2. 4～5年輪作にし、イネ科、マメ科の作物を作る。 3. 排水を良好にする。 4. 窒素質肥料の過剰施肥を避け、適正施肥をする。 5. 収穫後の病茎葉は集めて土中に埋める。 6. 早播きの場合は防虫ネットで被覆する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. 病原細菌は害虫(キスジノミハムシ、ヨトウムシ類等)の加害傷口から侵入するので、害虫を防除する。	本葉9～10枚のころから2～3回	31 U18 M1 M1 M1 M1 31・24 24・M1 24・M1	スターナ水和剤 バリダシン液剤5Zボルドー オキシンドー水和剤80 ドネリンフロアブル ヨネボン水和剤 (混)カセット水和剤 (混)カスミンボルドー (混)カッパーシン水和剤
7 根こぶ病 <i>Plasmodiophora brassicae</i>	1. 苗床は無病な土を使用する。 2. 前年発生したところでは連作を避け、アブラナ科以外の作物との3年以上の輪作をする。 3. 石灰窒素を施用し、土壌の酸度を6以上に矯正する。 4. 圃場の排水を良好にし、低湿地や排水不良地での作付けを避ける。 5. 発病株は根部を含めて完全に除去する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. 土壌消毒方法はⅢ-14. 土壌病害虫の防除の項参照。 2. ランマンフロアブルは活着のための散水時に使用できる。	土 壌 消 毒	— — — —	N C S ガスタード微粒剤 バスアミド微粒剤 (混)ディ・トラベックス油剤
		は種前(苗床)	21	オラクル粉剤
		播種直後または播種直後及び定植前日～当日	—(生)	(生)フィールドキーパー水和剤
		播種または定植前	29 29 36 36 M5	フロンサイド粉剤 フロンサイドSC ネビリュウ ネビジン粉剤 ダコソイル
		定植前	21 21	オラクル顆粒水和剤 オラクル粉剤
		定植前日～当日	21	ランマンフロアブル
8 黒斑病	1. 発病株を除去し、収穫後の残茎葉は集めて土中に埋める。 2. 排水を良好にする 3. 適切な肥培管理を行う。	発 生 初 期	7 11 11 11・7	カンタスドライフロアブル アミスター20フロアブル ファンタジスタ顆粒水和剤 (混)シグナムWDG
9 ふち腐れ、心腐れ症	1. 過乾過湿を避ける。 2. 窒素質、カリ質肥料の過剰施用を避ける。 3. 石灰質肥料を基肥に十分施用する。 4. 本葉7～8枚時に石灰を含んだ葉面散布剤に展着剤を加えて散布する。 5. アグリメイトを結球するまでに新葉、結球部によくかかるように7～10日間隔で3～4回葉面散布する。			

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する

キャベツ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
10 モンシロチョウ (アオムシ)	1. 育苗床では防虫ネット（4mm目合以下） で被覆する。 2. 幼虫は見つけしだい捕殺する。 （薬剤使用の特記事項） ●若齢幼虫期 1. モスピランSL液剤、顆粒水溶剤はコナ ガにも登録がある。	播種覆土後～ 育苗期後半	28・4A	（混）ミネクトデュオ粒剤
		育苗期後半	4A 4A	ア ク タ ラ 粒 剤 5 ダ ン ト ツ 粒 剤
		定 植 時	4A	モ ス ピ ラ ン 粒 剤
		育苗期後半 ～定植当日	28 28 28 28・4A 28・4A	ブ レ バ ソ ン 粒 剤 ブ レ バ ソ ン フ ロ ア ブ ル 5 ベ リ マ ー ク S C ヨ ー バ ル フ ロ ア ブ ル （ 混 ） ア ベ イ ル 粒 剤 （ 混 ） ジ ユ リ ボ フ ロ ア ブ ル
		定植3日前 ～定植当日	4A・5	（混）ガードナーフロアブル
		定植前日～ 定植当日	4A	モ ス ピ ラ ン 粒 剤
		定植前日～ 定植時	28・4A 4A 4A	（混）キックオフ顆粒水和剤 アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤
		定 植 時	1B 1B 4A 4A 4A 28・4A	オ ル ト ラ ン 粒 剤 ジ ェ イ エ ー ス 粒 剤 ダ ン ト ツ 粒 剤 ア ル バ リ ン 粒 剤 ス タ ー ク ル 粒 剤 （ 混 ） ミ ネ ク ト デ ュ オ 粒 剤
		若 齢 幼 虫 期	1A 1B 1B 4A 4A 4E 5 6 6 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 13 14 15 15 15 18 21A 21A 22A 22A 22B 28 28 28 28 30 30 34 28・4A 6・15 21A・22B UN	ラ ン ネ ー ト 4 5 D F オ ル ト ラ ン 水 和 剤 ジ ェ イ エ ー ス 水 溶 剤 モ ス ピ ラ ン S L 液 剤 モ ス ピ ラ ン 顆 粒 水 溶 剤 フ ィ ー ル ド マ ス ト フ ロ ア ブ ル ス ピ ノ エ ー ス 顆 粒 水 和 剤 ア フ ェ ー ム 乳 剤 ア ニ キ 乳 剤 ト ア ロ ー 水 和 剤 C T ト ア ロ ー フ ロ ア ブ ル C T バ シ レ ッ ク ス 水 和 剤 ゼ ン タ ー リ 顆 粒 水 和 剤 デ ル フ ィ ン 顆 粒 水 和 剤 エ ス マ ル ク D F フ ロ ー バ ッ ク D F エ コ マ ス タ ー B T チ ュ ー ン ア ッ プ 顆 粒 水 和 剤 サ ブ リ ナ フ ロ ア ブ ル ジ ャ ッ ク ボ ッ ト 顆 粒 水 和 剤 コ テ ツ フ ロ ア ブ ル リ ー フ ガ ー ド 顆 粒 水 和 剤 マ ッ チ 乳 剤 カ ス ケ ー ド 乳 剤 ア タ ブ ロ ン 乳 剤 ロ ム ダ ン フ ロ ア ブ ル ハ チ ハ チ 乳 剤 ハ チ ハ チ フ ロ ア ブ ル ト ル ネ ー ド エ ー ス D F フ ェ イ ン ト リ ム D F ア ク セ ル フ ロ ア ブ ル フ ェ ニ ッ ク ス 顆 粒 水 和 剤 ブ レ バ ソ ン フ ロ ア ブ ル 5 ヨ ー バ ル フ ロ ア ブ ル ベ ネ ビ ア O D グ レ ー シ ア 乳 剤 ブ ロ フ レ ア S C フ ェ イ ン セ ー プ フ ロ ア ブ ル （ 混 ） ジ ユ リ ボ フ ロ ア ブ ル （ 混 ） ア フ ェ ー ム エ ク セ ラ 顆 粒 水 和 剤 （ 混 ） ア ク セ ル キ ン グ フ ロ ア ブ ル ブ レ オ フ ロ ア ブ ル

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する

キャベツ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
11 ヨトウムシ	1. 育苗床では防虫ネット（4mm目合以下）で被覆する。 2. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。	育苗期後半 ～定植当日	28 28 28・4A	プレバソンフロアブル5 ベリマークSC （混）ジュリボフロアブル
		定植時	1B 1B	オルトラン粒剤 ジェイエース粒剤
12 タマナギンウワバ	1. 育苗床では防虫ネット（4mm目合以下）で被覆する。 2. 幼虫は見つけしだい捕殺する。	若齢幼虫期	1A 1B 1B 5 6 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 13 15 15 22A 22A 22B 28 28 28 28 30 30 6・15 21A・22B UN	ランネット45DF オルトラン水和剤 ジェイエース水溶剤 スピノエース顆粒水和剤 アファーム乳剤 アニキ乳剤 エコマスターBT コテツフロアブル アタブロン乳剤 トルネードエースDF ファイントリムDF アクセルフロアブル フェニックス顆粒水和剤 プレバソンフロアブル5 ヨールフロアブル ベネビアOD プロフレアSC グレーシア乳剤 （混）アファームエクセラ顆粒水和剤 （混）アクセルキングフロアブル プレオフロアブル
		育苗期後半 ～定植当日	28	ベリマークSC

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

キャベツ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
13 ハスモンヨトウ	1. 育苗床では防虫ネット（4mm目合以下）で被覆する。 2. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。	育苗期後半 ～定植当日	28 28 28 28・4A 28・4A	プレバソンフロアブル5 ベリマークSC ヨールフロアブル (混)ジュリボフロアブル (混)アベイル粒剤
		定植3日前 ～定植当日	4A・5	(混)ガードナーフロアブル
		若齢幼虫期	1A 1A 4E 6 6 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 13 15 15 18 22A 22A 22B 22B 28 28 28 28 30 30 28・4A 6・15 21A・22B UN	デナボン5%ベイト ランネット45DF フィールドマストフロアブル アフアーム乳剤 アニキ乳剤 バシレックス水和剤 ゼンターリ顆粒水和剤 デルフィン顆粒水和剤 フローバックDF エコマスターBT サブリーナフロアブル ジャックポット顆粒水和剤 コテツフロアブル アタブロン乳剤 ノーモルト乳剤 ファルコンフロアブル トルネードエースDF ファイントリムDF アクセルベイト アクセルフロアブル フェニックス顆粒水和剤 プレバソンフロアブル5 ヨールフロアブル ベネビアOD ブローレアSC グレーシア乳剤 (混)ジュリボフロアブル (混)アフアームエクセラ顆粒水和剤 (混)アクセルキングフロアブル ブレオフロアブル
14 オオタバコガ	1. 育苗床では防虫ネット（4mm目合以下）で被覆する。 2. 幼虫は見つけしだい捕殺する。	若齢幼虫期	6 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 13 18 22B 28 28 28 28 30 30 21A・22B UN	アニキ乳剤 トアローフロアブルCT ゼンターリ顆粒水和剤 デルフィン顆粒水和剤 エスマルクDF フローバックDF エコマスターBT チューンアップ顆粒水和剤 サブリーナフロアブル ジャックポット顆粒水和剤 コテツフロアブル ファルコンフロアブル アクセルフロアブル フェニックス顆粒水和剤 プレバソンフロアブル5 ヨールフロアブル ベネビアOD ブローレアSC (混)アクセルキングフロアブル ブレオフロアブル
			育苗期後半 ～定植当日	28
15 シロイチモジヨトウ	1. 育苗床では防虫ネット（4mm目合以下）で被覆する。 2. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。	発生初期	5 6 11A 13 18 22A 28 28 30 UN	スピノエース顆粒水和剤 アニキ乳剤 ゼンターリ顆粒水和剤 コテツフロアブル ロムダンフロアブル トルネードエースDF ヨールフロアブル ベネビアOD ブローレアSC ブレオフロアブル

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する

キャベツ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
16 コナガ	1. 紫外線反射資材を用いると、成虫の飛来を軽減することができる。 2. 育苗床では防虫ネット（2mm目合以下）で被覆する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. コナガ対象に使用する場合には、基幹防除剤として発生初期に使用する。 2. コナガは、薬剤抵抗性が発達しやすいので、作用性の異なる他の薬剤と輪番で一時期一回の使用とする。	播種前または播種時	4A	ア ク タ ラ 粒 剤 5
		播種覆土後～育苗期後半	28・4A	(混) ミネクトデュオ粒剤
		育苗期後半	4A 4A	ア ク タ ラ 粒 剤 5 ダ ン ト ツ 粒 剤
		育苗期後半～定植当日	28 28 4A・28	ヨ ー バ ル フ ロ ア ブ ル ベ リ マ ー ク S C (混) ア ベ イ ル 粒 剤
		定植3日前～定植当日	4A・5	(混) ガードナーフロアブル
		定植時	1B 1B 4A 4A 4A 4A 28・4A	オ ル ト ラ ン 粒 剤 ジ ュ イ エ ー ス 粒 剤 モ ス ピ ラ ン 粒 剤 ア ル バ リ ン 粒 剤 ス タ ー ク ル 粒 剤 ダ ン ト ツ 粒 剤 (混) ミネクトデュオ粒剤
		定植前日～定植時	4A 4A	ア ル バ リ ン 顆 粒 水 溶 剤 ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤
		若齢幼虫期	1B 1B 4E 5 6 6 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 13 14 14 14 15 15 15 15 21A 22A 22A 28 28 30 30 34 6・15 21A・22B UN	ト ク チ オ ン 乳 剤 ト ク チ オ ン 粉 剤 フ ィ ー ル ド マ ス ト フ ロ ア ブ ル ス ピ ノ エ ー ス 顆 粒 水 和 剤 ア フ ェ ー ム 乳 剤 ア ニ キ 乳 剤 ト ア ロ ー 水 和 剤 C T ト ア ロ ー フ ロ ア ブ ル C T バ シ レ ッ ク ス 水 和 剤 ゼ ン タ ー リ 顆 粒 水 和 剤 デ ル フ ィ ン 顆 粒 水 和 剤 エ ス マ ル ク D F フ ロ ー バ ッ ク D F エ コ マ ス タ ー B T チ ュ ー ン ア ッ プ 顆 粒 水 和 剤 サ ブ リ ナ フ ロ ア ブ ル ジ ャ ッ ク ポ ッ ト 顆 粒 水 和 剤 コ テ ツ フ ロ ア ブ ル パ ダ ン S G 水 溶 剤 エ ビ セ ク ト 水 和 剤 リ ー フ ガ ー ド 顆 粒 水 和 剤 ノ ー モ ル ト 乳 剤 マ ツ チ 乳 剤 カ ス ケ ー ド 乳 剤 ア タ ブ ロ ン 乳 剤 ハ チ ハ チ 乳 剤 ト ル ネ ー ド エ ー ス D F フ ェ イ ン ト リ ム D F ヨ ー バ ル フ ロ ア ブ ル ベ ネ ビ ア O D グ レ ー シ ア 乳 剤 ブ ロ フ レ ア S C フ ェ イ ン セ ー プ フ ロ ア ブ ル (混) ア フ ェ ー ム エ ク セ ラ 顆 粒 水 和 剤 (混) ア ク セ ル キ ン グ フ ロ ア ブ ル プ レ オ フ ロ ア ブ ル

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

キャベツ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
17 ネキリムシ類	1. 被害株周辺土中の幼虫が潜む穴を見つけ、捕殺する。 2. 作付け前の圃場の除草処理を徹底する。	播種または 定植時 (植付時)	1B 1B 1B	カルホス粉剤 カルモック ネキリエースK
		育苗期後半	4A	ダントツ粒剤
		育苗期後半 ～定植当日	28 28 28	プレバソンフロアブル5 ヨバルフロアブル ベリマークSC
		定植時	1B	オルトラン粒剤
		生育初期	3A	ガードベイトA
		定植直後～ 発生初期	1A 3A 22B	デナボン5%ベイト アデイオン乳剤 アクセルベイト
		18 ハイマダラノメイガ	1. 秋播栽培では早播きしない。 2. 育苗床では防虫ネット(2mm目合以下)で被覆する。	播種時
播種時～定植前	2B			プリンス粒剤
育苗期後半	4A 4A			ダントツ粒剤 アクタラ粒剤5
育苗期後半 ～定植当日	28 28 28 28・4A			ベリマークSC ヨバルフロアブル プレバソン粒剤 (混)ジュリボフロアブル
定植3日前 ～定植当日	4A・5			(混)ガードナーフロアブル
定植前日 ～定植時	4A 4A			アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤
定植時	4A 4A 4A 4A 28・4A			ダントツ粒剤 アクタラ粒剤5 アルバリン粒剤 スタークル粒剤 (混)ミネクトデュオ粒剤
発生初期	4E 5 6 6 11A 11A 11A 11A 11A 13 14 14 15 21A 21A 22A 22A 28 28 28 28 30 30 28・4A 6・15 21A・22B UN			フィールドマストフロアブル スピノエース顆粒水和剤 アフアーム乳剤 アニキ乳剤 エスマルクDF フローバックDF エコマスタートBT チューンアップ顆粒水和剤 コテツフロアブル パダンSG水溶剤 リーフガード顆粒水和剤 マツチ乳剤 ハチハチ乳剤 ハチハチフロアブル トルネードエースDF ファイントリムDF フェニックス顆粒水和剤 プレバソンフロアブル5 ベネビアOD ヨバルフロアブル ブロフレアSC グレーシア乳剤 (混)ジュリボフロアブル (混)アフアームエクセラ顆粒水和剤 (混)アクセルキングフロアブル プレオフロアブル

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する

キャベツ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
19 アブラムシ類	1. 紫外線反射資材を用いると、成虫の飛来を軽減することができる。 2. 育苗床では防虫ネット（1mm目合以下）で被覆する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. ハチハチ乳剤、ハチハチフロアブルはアザミウマ類にも登録がある。	播 種 時	4A	ダ ン ト ツ 粒 剤
		播 種 覆 土 後 ～ 育 苗 期 後 半	28・4A	(混) ミネクトデュオ粒剤
		育 苗 期	4A	ア ル バ リ ン 粒 剤
			4A	ス タ ー ク ル 粒 剤
			4A	ダ ン ト ツ 粒 剤
		育 苗 期 後 半	4A	ア ク タ ラ 粒 剤 5
			4A	ア ク タ ラ 顆 粒 水 溶 剤
			4A	
		育 苗 期 後 半 ～ 定 植 当 日	28	ベ リ マ ー ク S C
			28・4A	(混) ジュリボフロアブル
		定 植 3 日 前 ～ 定 植 当 日	4A・5	(混) ガードナーフロアブル
		定 植 前 日 ～ 定 植 時	4A	ア ル バ リ ン 顆 粒 水 溶 剤
			4A 28・4A	ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤 (混) キックオフ顆粒水和剤
		定 植 時	1B	オ ル ト ラ ン 粒 剤
1B	ジ ェ イ エ ー ス 粒 剤			
4A	ア ド マ イ ヤ ー 1 粒 剤			
4A	ダ ン ト ツ 粒 剤			
4A	ア ク タ ラ 粒 剤 5			
4A	モ ス ピ ラ ン 粒 剤			
4A	ア ル バ リ ン 粒 剤			
4A	ス タ ー ク ル 粒 剤			
28・4A	(混) ミネクトデュオ粒剤			
発 生 初 期	1A	ラ ン ネ ー ト 4 5 D F		
	1B	オ ル ト ラ ン 水 和 剤		
	1B	ジ ェ イ エ ー ス 水 溶 剤		
	3A	ア デ イ オ ン 乳 剤		
	3A	ア グ ロ ス リ ン 水 和 剤		
	3A	サ イ ハ ロ ン 水 和 剤		
	3A	サ イ ハ ロ ン 乳 剤		
	3A	ス カ ウ ト 乳 剤		
	3A	ス カ ウ ト フ ロ ア ブ ル		
	3A	テ ル ス タ ー 水 和 剤		
	3A	マ ブ リ ッ ク 水 和 剤 2 0		
	3A	ト レ ボ ン 乳 剤		
	3A	ト レ ボ ン E W		
	4A	ア ド マ イ ヤ ー フ ロ ア ブ ル		
	4A	ア ド マ イ ヤ ー 顆 粒 水 和 剤		
	4A	モ ス ピ ラ ン S L 液 剤		
	4A	モ ス ピ ラ ン 顆 粒 水 溶 剤		
	4A	ア ク タ ラ 顆 粒 水 溶 剤		
	4A	ダ ン ト ツ 水 溶 剤		
	4A	ア ル バ リ ン 顆 粒 水 溶 剤		
	4A	ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤		
	4C	ト ラ ン ス フ ォ ー ム フ ロ ア ブ ル		
	9B	コ ル ト 顆 粒 水 和 剤		
	9D	セ フ ィ ー ナ D C		
	14	リ ー フ ガ ー ド 顆 粒 水 和 剤		
	21A	ハ チ ハ チ 乳 剤		
	21A	ハ チ ハ チ フ ロ ア ブ ル		
23	モ ベ ン ト フ ロ ア ブ ル			
3A・1B	ハ ク サ ッ プ 水 和 剤			
3A・15	(混) ビリーブ水和剤			
28・4A	(混) ジュリボフロアブル			
21A・22B	(混) アクセルキングフロアブル			

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する

キャベツ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
20 アザミウマ類	〈薬剤使用の特記事項〉 ●播種時 1. ダントツ粒剤はネギアザミウマでの登録である。 ●発生初期 1. アクセルキングフロアブル、トランスフォームフロアブル、コルト顆粒水和剤はネギアザミウマでの登録である。	播 種 時	4A	ダ ン ト ツ 粒 剤
		育 苗 期 後 半 ～ 定 植 当 日	28 28	ベ リ マ ー ク S C ヨ ー バ ル フ ロ ア ブ ル
		定 植 3 日 前 ～ 定 植 当 日	4A・5	(混) ガ ー ド ナ ー フ ロ ア ブ ル
		定 植 時	1B	オ ル ト ラ ン 粒 剤
		発 生 初 期	1B 4C 9B 15 28 30 34 34 21A・22B	オ ル ト ラ ン 水 和 剤 ト ラ ン ス フ ォ ー ム フ ロ ア ブ ル コ ル ト 顆 粒 水 和 剤 カ ス ケ ー ド 乳 剤 ヨ ー バ ル フ ロ ア ブ ル グ レ ー シ ア 乳 剤 フ ァ イ ン セ ー プ フ ロ ア ブ ル ア ベ ン ジ ャ ー フ ロ ア ブ ル (混) ア ク セ ル キ ン グ フ ロ ア ブ ル
21 コオロギ ダンゴムシ	1. 圃場内及び周辺の雑草や残さ処理を徹底する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. アクセルベイトはコオロギ類に登録がある。	発 生 初 期	1A 22B	デ ナ ポ ン 5 % ベ イ ト ア ク セ ル ベ イ ト
22 ナメクジ類	1. 見つけしだい摘除する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. ナメクリーン3はカタツムリ類での登録である。	発 生 初 期	14 14 - -	パ ダ ン S G 水 溶 剤 リ ー フ ガ ー ド 顆 粒 水 和 剤 ナ メ ク リ ー ン 3 マ イ キ ラ ー L