

(19) 茎ブロッコリー

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 アブラムシ類	1. 周辺雑草を防除する。 2. 育苗床では防虫ネット（1mm目合以下）で被覆する。 3. 周囲にシルバーテープをはる。	発 生 初 期	4A	モスピラン顆粒水溶剤
2 ハスモンヨトウ	1. 育苗床では防虫ネット（4mm目合以下）で被覆する。 2. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。	若 齢 幼 虫 期	11A 11A 11A 11A 11A UN	バシレックス水和剤 ゼンターリ顆粒水和剤 デルフィン顆粒水和剤 フローバックDF サブリーナフロアブル プレオフロアブル
3 シロイチモジヨトウ	1. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。 2. 苗床では飛び込み軽減のため、防虫ネット（4mm目合以下）で被覆する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. 老齢幼虫には薬剤の効果が劣るので、圃場をよく見回り、若齢期に防除する。	若 齢 幼 虫 期	30	プロフレアSC
4 モンシロチョウ (アオムシ)	1. 育苗床では防虫ネット（4mm目合以下）で被覆する。 2. 幼虫は見つけしだい捕殺する。 3. 本種対象にノーモルト乳剤、コテツフロアブルで防除を実施しているところでは、ハスモンヨトウの発生が少ない。	若 齢 幼 虫 期	3A 11A 11A 11A 11A 11A 13 15	アデイオン乳剤 バシレックス水和剤 ゼンターリ顆粒水和剤 デルフィン顆粒水和剤 フローバックDF サブリーナフロアブル コテツフロアブル ノーモルト乳剤