

## (38) し そ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 青枯病 <i>Ralstonia solanacearum</i>	1. 無病地を選ぶ。 2. 排水不良地には栽培しない。 3. 定植時に苗に傷みが生じないように注意する。 4. 発病株は見つけしだい除去し、圃場外へ持ち出し、埋設等で処分する。 <b>〈薬剤使用の特記事項〉</b> 1. 土壌消毒方法はⅢ-14. 土壌病害虫の防除の項参照。	土 壌 消 毒	— —	ガ ス タ ー ド 微 粒 剤 バ ス ア ミ ド 微 粒 剤
2 さび病 <i>Coleosporium plectranthi</i>	1. 肥料切れは発病を助長するので施肥管理に注意し、肥料切れにならないようにする。	発 生 初 期	3 3 3	ト リ フ ミ ン 水 和 剤 ラ リ ー 乳 剤 オ ン リ ー ワ ン フ ロ ア ブ ル
3 斑点病 <i>Corynespora cassiicola</i>	1. 密植を避け、株間の湿度上昇を避ける。 2. 窒素過多に注意する。 3. 灌水を控える。 <b>〈薬剤使用の特記事項〉</b> 1. ダコニール1000は斑点病による株枯症に効果がある。	発 生 初 期	11 M1 M5	ス ト ロ ビ ー フ ロ ア ブ ル キ ノ ン ド ー 水 和 剤 4 0 ダ コ ニ ー ル 1 0 0 0
4 アブラムシ類	1. 周辺雑草を防除する。 2. 周囲にシルバーテープをはる。 3. シルバーマルチをする。	発 生 初 期	3A 3A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4C 29 —	ア デ ィ オ ン 乳 剤 ア グ ロ ス リ ン 乳 剤 ア ド マ イ ヤ ー フ ロ ア ブ ル モ ス ピ ラ ン 顆 粒 水 溶 剤 ア ク タ ラ 顆 粒 水 溶 剤 ア ル バ リ ン 顆 粒 水 溶 剤 ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤 ト ラ ン ス フ ォ ー ム フ ロ ア ブ ル ウ ラ ラ D F エ コ ピ タ 液 剤
5 ハスモンヨトウ	1. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。 <b>〈薬剤使用の特記事項〉</b> 1. アファーム乳剤はヨトウムシにも登録がある。	若 齢 幼 虫 期	6 15 18 28 UN	ア フ ァ ー ム 乳 剤 カ ス ケ ー ド 乳 剤 マ ト リ ッ ク フ ロ ア ブ ル フ ェ ニ ッ ク ス 顆 粒 水 和 剤 プ レ オ フ ロ ア ブ ル
6 ハダニ類	1. 周辺雑草を除去する。 2. 収穫残さは速やかに処分する。 <b>〈薬剤使用の特記事項〉</b> 1. カネマイトフロアブルはカンザワハダニに登録がある。 2. コロマイト乳剤はサビダニ類、チャノホコリダニにも登録がある。 3. スターマイトフロアブルはチャノホコリダニにも登録がある。	発 生 初 期	6 6 10A 20B 20D 21A 25A UN	ア フ ァ ー ム 乳 剤 コ ロ マ イ ト 乳 剤 ニ ッ ソ ラ ン 水 和 剤 カ ネ マ イ ト フ ロ ア ブ ル マ イ ト コ ー ネ フ ロ ア ブ ル ダ ニ ト ロ ン フ ロ ア ブ ル ス タ ー マ イ ト フ ロ ア ブ ル モ レ ス タ ン 水 和 剤
7 アザミウマ類	1. 周辺雑草を防除する。 2. 育苗床は飛び込み軽減のため、防虫ネット（1mm目合以下）で被覆する。 3. 周囲にシルバーテープをはる。 4. 苗で本圃に持ち込まない。	発 生 初 期	3A 5 14 34	ア デ ィ オ ン 乳 剤 ス ピ ノ エ ー ス 顆 粒 水 和 剤 パ ダ ン S G 水 溶 剤 フ ァ イ ン セ ー プ フ ロ ア ブ ル
8 ネコブセンチュウ	1. 水田に転換可能な畑では、2～3年に1回の割合で水田に戻す。 2. 苗からの持ち込みを防止するため、センチュウ類や病害のおそれのない用土で育苗する。 3. 施設では、夏期約1か月間の太陽熱利用による消毒を行う。	定 植 前	1B	ラ グ ビ ー M C 粒 剤

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する