

(39) しそ(花穂)

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 さび病 <i>Coleosporium plectranthi</i>	1. 肥料切れは発病を助長するので施肥管理に注意し、肥料切れにならないようにする。	発 生 初 期	3	ラ リ ー 乳 剤
2 アブラムシ類	1. 周辺雑草を防除する。 2. 育苗床は飛び込み軽減のため、防虫ネット(1mm目合以下)で被覆する。 3. 周囲にシルバーテープをはる。	発 生 初 期	4A 4A 4A	アドマイヤーフロアブル アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤
3 アザミウマ類	1. 周辺雑草を防除する。 2. 育苗床は飛び込み軽減のため、防虫ネット(1mm目合以下)で被覆する。 3. 周囲にシルバーテープをはる。 4. 苗で本圃に持ち込まない。	発 生 初 期	5	スピノエース顆粒水和剤
4 ハダニ類	1. 周辺雑草を除去する。 2. 収穫残さは速やかに処分する。 〈薬剤使用の特記事項〉 1. スターマイトフロアブルはチャノホコリダニにも登録がある。	発 生 初 期	6 10A 20D 25A	コロマイト乳剤 ニッソラン水和剤 マイトコーネフロアブル スターマイトフロアブル
5 ハスモンヨトウ	1. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。	若 齢 幼 虫 期	15 UN	カスケード乳剤 プレオフロアブル
6 ネコブセンチュウ	1. 水田に転換可能な畑では、2~3年に1回の割合で水田に戻す。 2. 苗からの持ち込みを防止するため、センチュウ類や病害のおそれのない用土で育苗する。 3. 施設では、夏期約1か月間の太陽熱利用による消毒を行う。	定 植 前	1B	ラグビーMC粒剤

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する