

(40) バジル

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 灰色かび病 <i>Botrytis cinerea</i>	1. 排水をよくし、過繁茂にならないようにする。 2. ハウス栽培では過湿にならないように換気を良好にする。 3. 発病株は除去し、処分する。	発 生 初 期	11	ストロビーフロアブル
2 菌核病 <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	1. 発病株は早期に発見し、菌核ができる前に抜き取って処分する。 2. 夏期に湛水可能な圃地は高温時に20日以上湛水すると菌核が死滅するので、有効である。	発 生 初 期	2	ロブラール水和剤
3 ベと病 <i>Peronospora belbahrii</i>	1. 排水を良好にする。 2. 密植にならないようにする。 3. 被害葉は早めに処分する。	発 生 初 期	21 40	ランマンフロアブル レーバスフロアブル
4 アブラムシ類	1. 周辺雑草を防除する。 2. 育苗床は飛び込み軽減のため、防虫ネット（1mm目合以下）で被覆する。 3. 周囲にシルバーテープをはる。	発 生 初 期	3A 4A 4A 4A 4A	アグロスリン乳剤 アドマイヤーフロアブル モスピラン顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤
5 アザミウマ類	1. 周辺雑草を防除する。 2. 育苗床は飛び込み軽減のため、防虫ネット（1mm目合以下）で被覆する。 3. 周囲にシルバーテープをはる。 4. 苗で本圃に持ち込まない。	発 生 初 期	5	スピノエース顆粒水和剤
6 ハモグリバエ類	1. 圃場内や圃場周辺雑草を防除する。	発 生 初 期	17	トリガード液剤
7 ハスモンヨトウ	1. 育苗床は飛び込み軽減のため、防虫ネット（4mm目合以下）で被覆する。 2. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。	発 生 初 期	15 UN	カスケード乳剤 プレオフロアブル
8 ヨトウムシ類	1. 育苗床は飛び込み軽減のため、防虫ネット（4mm目合以下）で被覆する。 2. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。			
9 ハダニ類	1. 周辺雑草を除去する。 2. 収穫残さは速やかに処分する。	発 生 初 期	6	コロマイト乳剤

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する