

(41) う ど

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 黒斑病 <i>Alternaria panax</i> <i>Alternaria</i> sp.	1. 肥料切れは発病を助長するので、肥培管理に注意する。 2. 被害茎葉は集めて処分する。	根 株 養 成 期 (発病前から)	2 M1 M5	ロ プ ラ ー ル 水 和 剤 ド イ ツ ボ ル ド ー A ダ コ ニ ー ル 1 0 0 0
2 疫病 <i>Phytophthora</i> <i>cactorum</i>	1. 高畦にして排水を図る。 2. 敷きわらなどを行い、雨のはね返りを防ぐ。	伏 せ 込 み 時 (発病前から)	4・M1	(混)リドミル銅水和剤
3 白絹病 <i>Sclerotium rolfsii</i>	1. 連作を避ける。 2. 排水を良好にする。 3. 被害株は抜き取り、処分する。 4. 圃場を1か月間湛水し、菌核を死滅させる。	根 株 養 成 畑 定 植 前 (発病前から)	14	リゾレックス粉剤
		発 病 前 から	14	リゾレックス水和剤
4 菌核病 <i>Sclerotinia</i> <i>sclerotiorum</i>	1. 発病株は早期に発見し、菌核ができる前に抜き取って処分する。	伏 せ 込 み 時	2	ロ プ ラ ー ル 水 和 剤
5 アブラムシ類	1. 周辺雑草を防除する。 2. 周囲にシルバーテープをはる。 3. シルバーマルチをする。	根 株 養 成 期 (発生初期)	3A 3A 4A	ト レ ボ ン E W ト レ ボ ン 乳 剤 ア ド マ イ ヤ ー フ ロ ア ブ ル
6 ヨトウムシ	1. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。	根 株 養 成 期 (若齢幼虫期)	1B	ス ミ チ オ ン 乳 剤
7 センノカミキリ	1. 樹勢を衰弱させないよう栽培管理に注意する。 2. 枯死株を処分する。	根 株 養 成 期 (発生前)	1B	ス ミ チ オ ン 乳 剤
		成 虫 飛 来 初 期 ～ 盛 期	1B	カ ル ホ ス 粉 剤
8 シクラメンホコリダニ	1. 苗で本圃に持ち込まない。 2. 雑草からの移動もあるので、雑草処理を徹底する。	根 株 養 成 期 (発生初期)	13	コ テ ツ フ ロ ア ブ ル