

(45) モロヘイヤ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 軟腐病	1. 窒素質肥料の多用は避ける。 2. 排水を良好にする。	発 病 初 期	NC・M1	(混)ジーフライン水和剤
2 灰色かび病 <i>Botrytis cinerea</i>	1. 排水をよくし、過繁茂にならないように 施肥整枝を行なう。 2. 茎葉残さは圃場外で処分する。	発 病 初 期	11	アミスター20フロアブル
3 アブラムシ類	1. 周辺雑草を防除する。 2. 圃場周囲にシルバーテープをはる。	発 生 初 期	1B	スミチオン乳剤
4 コナジラミ類	1. 苗で本圃に持ち込まない。 2. 圃場内及び周辺雑草を防除する。	発 生 初 期	4A 4A	モスピラン顆粒水溶剤 ベストガード水溶剤
5 アザミウマ類	1. 周辺雑草を防除する。	発 生 初 期	1B 3A 4A 4A 4A 5 13	スミチオン乳剤 トレボン乳剤 アドマイヤーフロアブル アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤 スピノエース顆粒水和剤 コテツフロアブル
6 ハスモンヨトウ	1. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。	発 生 初 期	6 15 28	アフターム乳剤 カスケード乳剤 プレバソnfフロアブル5
7 ハダニ類	1. 圃場内や圃場周辺雑草を防除する。 2. 収穫残さは速やかに処分する。	発 生 初 期	6 21A 25A	コロマイト乳剤 ダニトロンフロアブル ダニサラバフロアブル

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する