

(1) はとむぎ

| 防除法 病害虫名 | 防除のポイント | 薬 剤 防 除 | | |
|---|---|---|--------------|---------------------------------|
| | | 防除時期 | RACコード | 薬 剤 |
| 1 葉枯病 <i>Curvularia tomato</i> <i>Curvularia senegalensis</i> <i>Curvularia ovoides</i> <i>Pseudocochliobolus nisikadoi</i> | 1. 無病種子を用い、連作を避ける。 2. やむを得ず連作するときは、前作の被害茎葉を処分する。 3. 有機質肥料を増施し、深耕する。 4. 窒素肥料を分施し、リン、カリ、苦土肥料を多く施用する。 | 播 種 前 (種子湿粉衣) (種子浸漬) | M3・1 M3・1 | (混) ホーマイ水和剤 (混) ベンレートT水和剤 20 |
| | | 発 病 初 期 | 2 | ロ プ ラ ー ル 水 和 剤 |
| 2 アワノメイガ | 1. 定植までに畦畔の草刈りを行う。 | 5月下旬～6月 7月中旬 ～8月上旬 8月下旬 ～9月下旬 | 14 14 | パ ダ ン 粒 剤 4 パ ダ ン S G 水 溶 剤 |
| 3 イネヨトウ | 1. 定植までに畦畔の草刈りを行う。 | 4月中旬 ～6月下旬 7月 8月下旬 ～9月下旬 | 14 | パ ダ ン 粒 剤 4 |